

rig. Bladene næsten glatte, 3-10mm brede. 3-6 spredtstillede aks på 4-11cm. Småaksene 3-3½mm, gulgrønne, 2-blomstrede, uden stak. 0-600m. VII-IX. Indslæbt.

Paspalum paspalodes (Michx) Scribner Tvillingaks. 10-50cm. Flerårig med udløbere. Blade og skeder ofte randhårede. 2 ret oprette aks sammen på 2-7cm med en smal, affladet akse. 0-600m. VII-IX.

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze Kvellergræs. 5-30cm. Med lange, rodslående udløbere. Stråene liggende til opstigende. Bladene 5-9mm brede. Spredte eller delvist knippeformede, leddelte, bleggrønne aks. Om. VII-IX. Forvildet.

Setaria. Skærmaks.

- | | | |
|--|-------|--------------|
| 1. Børsterne med nedadrettede modhager, så de hænger i | | 2. |
| " " opadrettede " , hænger ikke i | | 3. |
| 2. Bladskeden foroven ca. 1mm langt randhåret | | verticillata |
| Bladskedens rand foroven glat | | adhaerens |
| 3. Dusken mellembudt, dens akse kort stivhåret | | decipiens |
| " ej " , " " også blødhåret | | viridis |

Setaria verticillata (L.) Beauv. Kransskærmaks. 20-60cm. Dusken mellembudt forneden. Børsterne ikke eller svagt røde. Småaksene 2-2,3mm. 0-800m. V-X.

S. adhaerens (Forsskål) Chiov. Burrenskærmaks. Småaksene 1,7-2mm.

S. decipiens Nyman (S. ambigua) Kortbørstet skærmaks. 20-50cm. Aksen synlig mellem kransene (helt dækket hos viridis). De fleste børster kun 3-4mm (alle 5-10mm hos viridis). VI-X.

S. viridis (L.) Beauv. Grønt skærmaks. 0-1600m. VI-X.

Pennisetum villosum R.Br. Dungræs. 50-70cm. Flerårig. Bladene flade eller indrullede. Dusken 3-10x2-4cm, hvidlig eller lilla-broget. Hvert småaks med et svøb af 3-7cm lange børster, der er fjerformede nederst. VI-VIII. Forvildet.

P. ciliare (L.) Link (Cenchrus c.) Randhåret dungræs. 25-60cm. Ofte med udløbere. Dusken 5-10cm, valseformet. 2-3 småaks sammen på 2-5,5mm, omgivne af et svøb af randhårede børster på 8-15mm. 0-600m. V-X.

Imperata cylindrica (L.) Beauv. Sølvgræs. 50-120cm. Bladene indtil 50cm, indrullede og stift oprette. Dusken indtil 20cm, tæt og cylindrisk, hvidulden af de låne yderavner. Småaksene tobloms-trede, 4-6mm. 0-300m. V-VII. Klitlavninger og flodbredder.

Saccharum spontaneum L. Vildt sukkerrør. 1½-2½m. Bladene ½-1½cm brede, glatte og ru, ofte indrullede. Toppen lancetformet, 20-50cm, uldhåret. Småaksene 3½-7mm, deres akse med hår på 2-3 x småakset. Inderavnen uden stak. Om. IX-XI.

S. ravennae (L.) Murray (Erianthus r.) Sølvør. 1-4m. Bladene indtil 1cm brede, men ofte indrullede, til sidst ofte rødlig med hvide ribber. Toppen 30-50cm, hvidulden og lappet. Småakshårene af småaksets længde. Inderavnen med stak. Om. VII-X.

Sorghum halepense (L.) Pers. Vild durra. 40-140cm. Opret flerårig med udløbere. Bladene 1-2cm brede, ofte med hvid midterribbe. Toppen stor og rødbrun med udstående grene. Småaksene 4½-6mm. Stakken 10-16mm eller manglende. 0-600m. VII-X.

Chrysopogon gryllus (L.) Trin. Gyldent skæggræs. 30-100cm. Flerårig. Hårformet skedehinde. Toppen åben og udspærret, med gyldent og lillabrogede småaks i grupper på 3 med det midterste siddende og med en stak på 3-4cm. 0-1000m. VI-VII.

Dichanthium ischaemum (L.) Roberty Almindeligt skæggræs. 15-60cm. Tættuet flerårig. 3-15 fingerformede aks på 3-7cm med tiltrykte småaks. Bladene krummede og teglstensrøde om sommeren. Stakken 10-15mm. 0-1300m. VI-XI.