REJSEFLORA

FOR

PELOPONNES

Denne rejseflora er udarbejdet på grundlag af en artsliste fra Arne Strids notater til Flora Hellenica samt ved hjælp af Arne Strids Mountain Flora of Greece. Artslisten er desværre ikke fuldstændig, og i Bjærgfloraen har jeg fundet en 33 arter, der ikke var med på listen, hvilket igen ud fra denne floras udsagn om, at den dækker 1/3 af alle de græske arter, burde medføre, at en 60-70 lavlandsarter ikke er kommet med.

Højdeangivelserne og blomstringstiderne stammer dels fra Bjærgfloraen og dels fra Pignattis Flora d'Italia og fra Jahn og Schönfelders Kretaflora. For familierne Pinaceae til Caryophyllaceae har jeg kunnet overføre dem direkte fra Flora Hellenica bind 1.

For bjærgarterne har jeg nu og da angivet udbredelsen efter bjærgområder ud fra Bjærgfloraen. Følgende forkortelser er anvendte: TA (Taygetos), PR (Parnon), ME (Melanon), OL (Oligyrtos), KY (Kyllænæ = Killini), KH (Khelmos = Aroania Oros), ER (Erymanthos), PN (Panakhaikon).

Som billedsupplement til floraen kan jeg nævne følgende bøger:
Kit Tan & G. Iatrou: Endemic Plants of Greece, The Peloponnese - Gads Forlag. Ca. 600 kr. i 2001. Pæne farvetegninger af de endemiske græske arter fra halvøen.

W. Strasser: Pflanzen des Peloponnes (40 DM i 1997). Indeholder middelmådige stregtegninger af ca. 1800 arter ordnede efter blomsterfarve. Orkideer, buske og træer for sig. Fås også med engelsk tekst: Plants of the Peloponnese (40 DM i 1999).

Mogens Thornberg

SELAGINELLACEAE

Selaginella denticulata (L.) Link Tandet dværgulvefod. 5-15cm. Spinkle, krybende, flade, gaffelgrenede, toradede skud med 4 rækker blade: 2 større og udbredte og 2 små og rygstillede. Sporeaksene uskarpt afgrænsede. 0-1500m. IV-VIII.

ISOETACEAE

Isoetes histrix Bory Sandbrasenføde. 5-10cm. Stænglen en tyk knold med forhornede, vedvarende bladgrunde i form af skinnende, sorte skæl med 3 tænder. Landplante med bløde, hvidliggrønne blade. 0-1000m. III-V.

EQUISETACEAE

Equisetum ramosissimum Desf. Grenpadderokke. 10-100cm. Stænglerne mørkegrønne, ru og hårde, uregelmæssigt grenede. Sidegrenenes skeder med trådformede tandspidser, ofte let oppustede. 0-1500m.

E. palustre L. Kærpadderokke. Sidegrenenes skeder med ca. 5 trekantede, sortspidsede tænder.

E. arvense L. Agerpadderokke. Sidegrenenes skeder med ca. 4 sylformede og m.m. vingede tænder.

E. telmateia Ehrh. Elfenbenspadderokke. 0-600m. III-V.

FILICES

1. Sporerne anbragte på et særligt, omdannet bladafsnit ..... 2.
   " i sporehobe på bladundersiden 3.
2. Bladpladen udelt og helrandet ..... Ophioglossum
   " fjersnitdelt Botrychium
3. Bladet helt ..... Phyllitis
   " 1-4 x delt 4.
4. Sporehobene dækkede af tætsiddende skæl ..... 5.
   " synlige eller dækkede af bladranden 6.
5. Bladet 1 x delt ..... Ceterach
   " 2 x " Notholaena
6. De sporebærende blade tydeligt forskellige fra de golde; alle 1 x fjersnitdelte ..... Blechnum
   Sporebærende og golde blade højst lidt forskellige 7.
7. Sporehobene randstillede, m.m. dækkede af bladranden ..... 8.
   " ikke dækkede af nogen ombøjet bladrand 11.
8. Bladstilkens øvre del lys ..... 9.
   " " " mørk 10.
9. Bladene 1 x delte ..... Pteris
   " 3-4 x delte Pteridium
10. Bladstilken m.m. skælklædt, rødbrun ..... Cheilanthes
    " uden skæl, sortagtig Adiantum
11. Sporehobene aflange ..... 12.
    " runde 14.
12. Enårig. Uden slør ..... Anogramma
    Flerårig. Med slør 13.
13. Sløret helrandet. Mindre bregner ..... Asplenium
    " med frynset rand. Større bregne Athyrium
14. Bladene 1 x delte ..... Polypodium
    " 2-4 x delte 15.
15. Sporehobene uden slør ..... Gymnocarpium
    " med " 16.
16. Sløret skjoldformet og midtfæstnet ..... Polystichum
    " ikke skjoldformet 17.
17. Sløret hætteformet, fæstnet på den ene side ... Cystopteris
    " nyreformet Dryopteris

Ophioglossum vulgatum L. Alm. slangetunge. Med 1 blad på oftest over 3½cm. 16-40 par sporehuse. Maskerne med løse ribbeender. 0-2000m. V-mVIII.

O. lusitanicum L. Netåret slangetunge. 1-3 blade sammen på

12-40mm. 5-10 par sporehuse. Maskerne uden løse ribbeender. 0-300m. XII-I(-IV).

Botrychium lunaria (L.) Swartz Alm. månerude. 1700-2600m. KY,KH.

Notholaena vellea (Aiton) Desv. (Cosentinia v., Cheilanthes catanensis) Filtet skælbregne. 8-25cm. Stilken gulbrun og tætskællet. Bladet tæt gulskællet på begge sider. 0-500m. III-IX.

Cheilanthes persica (Bory) Mett. Håret skælbregne. 5-25cm. Lille, stivløvet, tueformet, mørkegrøn bregne. Den ombøjede bladrand med lange frynser, der dækker undersiden. 400-1800m. III-IX.

C. acrostica (Balbis) Tod. Frynset skælbregne. 3-25cm. Som foregående, men den ombøjede bladrand uregelmæssigt kortfrynset. 0-950m. II-IX.

Pteris vittata L. Kamvingebregne. Bladet 1 x delt; afsnittene indsnævrede ved grunden. Stilken indtil 10cm, pladen 17-85cm med 10-55 par afsnit, der aftager i størrelse nedad. 0-350m. VII-X.

Adiantum capillus-veneris L. Venushår. 10-55cm. Bladene 2-3 x delte med vifteformede, fortil bugtede, 1-3cm brede afsnit. 0-1050m. VI-IX.

Anogramma leptophylla (L.) Link Nøgenbregne. 5-15cm. Lille, tyndbladet, enårig bregne. De golde og sporebærende blade lidt forskellige, 2-3 x delte. Sporehobene til sidst sammenflydende. 0-950m. III-IV.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Ørnebregne. 0-1800m. V-IX.

Asplenium. Radeløv.

1. Bladene 1-3 x gaffeldelte ..... septentrionale
" 1-3 x fjersnitdelte 2.
2. Bladene 1 x fjersnitdelte ..... 3.
" 2-3 x fjersnitdelte 5.
3. Bladstilken tæt kirtelhåret ..... petrarchae
" uden kirtelhår 4.
4. Bladskaftet grønt ..... viride
" mørkt rødbrunt trichomanes
5. Bladstilken og -skaftet grønne ..... ruta-muraria
" " " rød- eller sortbrune 6.
6. Nedre bladafsnit ½-4cm, ikke længere end de midterste obovatum
Nedre bladafsnit 3-8cm, ca. 1/3 længere end de midterste 7.
7. Bladene stærkt skinnende. De yderste flige udtrukne onopteris
" skinnende. Fligene ikke udtrukne adiantum-nigrum

Asplenium petrarchae (Guérin) DC. Håret radeløv. 3-15cm. Bladstilk og -skaft rødligsorte med grøn spids. Pladen lysegrøn, tynd, kirtelhåret på begge sider. 0-400m. III-X.

A. trichomanes L. Rundfinnet radeløv. III-IX. 3 underarter:
ssp. inexpectans Lovis: Bladpladen brat afsluttet foroven. Yderste afsnit bredt og tydeligt. Mest på kalk. 1400-2250m.TA,PR,ER.
ssp. trichomanes: Bladpladen jævnt tilspidset. Afsnittene rundagtige; de øvre adskilte og skævt påsatte. Mest kalksky. ME,KH.
ssp. quadrivalens D.E.Meyer: Bladpladen jævnt tilspidset. Afsnittene aflange og parallelsidede; de øvre tætstillede. Mest på kalk. 0-1500m.

A. viride L. (A. trichomanes-ramosum) Grønt radeløv. KH.

A. ruta-muraria L. Murrude. 1450-2300m. VI-X.

A. septentrionale (L.) Hoffm. Nordisk radeløv. 1300-2150m.VI-IX.

A. obovatum Viv. Ægbladet radeløv. 10-30cm. Fligene ægformet trekantede, kun snitdelte i den inderste halvdel, med butte og næppe brodspidsede tænder. 0-1000m. III-X.

Asplenium adiantum-nigrum L. Sort radeløv. 500-1800m. TA,PR,KH.

A. onopteris L. Fjerradeløv. 20-50cm. De yderste bladflige noget haleformet udtrukne. De nedre flige med krumme sideribber. V-VIII.

Ceterach officinarum DC. Miltbregne. 5-15cm. Tæt roset. Bladene læderagtige og mørkegrønne ovenpå, rustfiltede nedenunder, 1 x delte med butte flige, der kun er lidt længere end brede. V-VI.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman Hjortetunge. 20-60cm. Bladet smalt lancetformet, stedsegrønt, udelt, med hjærteformet grund med nedadrettede lapper. 700-2100m. VIII-XII. TA,PR.

Athyrium filix-femina (L.) Roth Fjerbregne. 0-1800m. TA,PR,KY.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Bægerbregne. 800-2500m.

Polystichum. Skjoldbregne. De yderste afsnit m.m. seglformede. Bladtænderne brodspidsede.

P. lonchitis (L.) Roth Krumfinnet skjoldbregne. 15-60cm. Bladet stift, overvintrende, med 15-50 par seglformede flige. 1 x fjersnitdelt. 1000-2700m. VII-IX. TA,KH.

P. aculeatum (L.) Roth Alm. skjoldbregne. 30-90cm. Bladene 2(3) x delte. Minder om en Mangeløv, men med m.m. seglformede flige. De nederste flige 1/2-1/3 kortere end de midterste. 2-ordens fligene nedløbende. 1000-2100m. VII-VIII. TA,PR,KH.

P. setiferum (Forsskål) Woynar Blød skjoldbregne. 30-120cm. Ligner aculeatum, men de nederste flige kun lidt kortere end de midterste. 2-ordens fligene tydeligt stilkede. 450-2000m. VI-VIII.

Dryopteris. Mangeløv.

1. Inderste 2-ordens afsnit siddende ..... filix-mas
" " " stilkede 2.
2. Bladet smalt lancetformet, bredest lige under midten villarii
" bredere, bredest ved grunden 3.
3. Fligspidserne med lange, smalle, spidse tænder .. submontana
" " trekantet-spidse tænder pallida

Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Alm. mangeløv. 600-2200m. KH.

D. villarii (Bell.) Woynar Klippemangeløv. 15-40cm. Bladstilken oftest højst 1/3 x pladen, tæt kirtlet og skællet. Bladpladen mørkegrøn, tæt dækket af citronduftende kirtler. VII-IX.

D. pallida (Bory) C.Chr. Blegt mangeløv. 15-60cm. Bladstilken oftest mindt 2/3 x pladen, svagt kirtlet og tæt skællet. Bladpladen lysegrøn, svagt kirtlet. 200-1700m. VII-IX.

D. submontana (FJ.& Jermy) FJ. Melet mangeløv. 20-60cm. Bladstilken mest ca. ½ x pladen eller lidt længere, tæt kirtlet og skællet. Bladpladen mørkegrøn, tæt dækket af citronduftende kirtler og lidt klæbrig. 1400-2000m. VI-X. TA,PR.

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. Kalkegebregne. Ligner Tredelt egebregne, men mørkgrøn. Nederste bladfligs største sideflig med 10-20 par lapper. 0-1600m. VI-IX.

Blechnum spicant (L.) Roth Kambregne. 0-2000m. VI-IX. TA.

Polypodium australe Fée (P. cambricum) Sydlig engelsød. 20-30cm. Jordstænglens skæl 5-13mm. Bladene 0,8-2 x så lange som brede, med trekantet omrids. 0-800m. II-VI.

P. vulgare L. Alm. engelsød. 10-30cm. Jordstænglens skæl 3-6mm. Bladpladen 1½-4 x så lang som bred, med lancetformet omrids. 1200-2100m. III-IX. TA,KH.

MARSILEACEAE

Marsilea aegyptiaca Willd. Smalbladet kløverbregne. 5-6(-9)cm. Sumpplante med firkløverblade. 2 slags blade: nogle med 2-5mm

lange, smalt kileformede småblade; andre med 10mm lange, brede småblade. 3mm store, terningformede sporefrugter på 5mm stilke.

PINACEAE

Abies cephalonica Loudon Græsk ædelgran. -30m. Kvistene gulbrune og glatte. Nålene m.m. alsidigt rettede, spidse eller tilspidsede, m.m. brodspidsede. 600-1800m. TA,PR,ME,KY,KH,ER,PN.

A. borisii-regis Mattf. (A. alba x cephalonica) -30m. Årskvistene gulbrune, mest kort brundunede. Nålene m.m. toradede, forskellige, selv på samme kvist, udrandede, butte eller spidse. KY,PR.

Pinus. Fyr.

1. Nålene i knipper på 5 ..... peuce
   " " " " 2 2.
2. 1.års kviste gullige til brunlige ..... 3.
   " " grå til grågrønne 5.
3. Nålene 0,7-1,0mm brede, i tætte duske ..... brutia
   " 1,3-1,7mm " , ikke så tætstillede 4.
4. Nålene 6½-8cm ..... heldreichii
   " 8-12cm nigra
5. Nålene 0,7-1,0mm brede ..... halepensis
   " 1,0-1,5mm " pinea

Pinus nigra Arnold ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe Østrigsk fyr. -30m. Nålene 8-12cm, noget stive. Knopperne bredt ægformede, med harpiks. Barken skaller af i kanelfarvede eller gullige pletter. Koglen 5-9cm, ægformet, gulbrun. 600-2150m. TA,PR,KY,KH.

P. heldreichii Christ (P. leucodermis) -20m. Nålene 6½-8cm x 1,4-1,7mm. Kvistene først blegbrune, senere gråligt eller blegt gulligbrune. Stammen med grå bark, skaller af i små, rudeformede flager på gamle træer. 1300-2300m. ?

P. halepensis Miller Gråfyr. -20m. Barken jævn og grålig i mange år, skaller af i grålige flager. Knopperne uden harpiks. Koglerne bliver siddende i mange år, stilkede. 0-1000m.

P. brutia Ten. Som foregående, men barken skaller af i rødbrune og ofte grålige skæl. Kvistene først gullig- til rødligbrune, senere brune eller brungrå. 0-1100m. SØ-spidsen.

P. pinea L. Pinje. 8-25m høj med parasolformet krone. Stammen gråligbrun, orangerødt afskallende. Nålene 10-20cm. Koglen 8-14 x 10cm, skinnende brun.

P. peuce Griseb. Silkefyr. -20m. Barken grå og furet. Kvistene grønlige og glatte. Nålene 6-8½cm x 0,7-1,1mm, trekantede. ?

CUPRESSACEAE

Cupressus sempervirens L. Ægte cypres. -25m. Ofte med søjleformet vækst, men ikke altid. Kvistene trinde eller lidt firkantede, 1-1½mm tykke. Koglen kuglerund, 2-4cm, bestående af 8-14 skjoldformede skæl.

Juniperus. Ene. Bærformet frugt.

1. Bladene nåleformede ..... 2.
   " skælformede 4.
2. Nålene med 1 lys stribe på oversiden ..... communis
   " " 2 lyse striber på oversiden 3.
3. Nålene nedløbende, 2,8-3,5mm brede ..... drupacea
   " ikke nedløbende, 1,4-2,5mm brede oxycedrus
4. Skælbladene smalt hindekantede. Bærret ej blådugget phoenicea
   " ikke hindekantede. Bærret blådugget foetidissima

Juniperus drupacea Labill. Blommeene. -20m. Kegleformet træ. Tvebo. Frugten stor, 13-21mm bred, noget ægformet, rødbrun og blådugget som moden. 700-1500m. Udbredt på Parnon.

Juniperus communis L. Alm. ene. 2 underarter:
ssp. nana (Willd.) Syme: Nålene opaddrejede, spidse, indtil ca. 13mm, 4-8(-9) x så lange som brede. 1350-2800m. TA,PR,KH.
ssp. hemisphaerica (C.Presl) Nyman: Nålene udspærrede, tilspidsede, 10-15x1,1-1,6mm, (8-)9-14 x så lange som brede. ME,KH.

Juniperus oxycedrus L. Stikkende ene. Busk eller træ til 10m. Det umodne bær gulliggrønt, det modne rødligbrunt. 2 underarter:
ssp. oxycedrus: Nålene tilsmalnede fra midten eller derover, 1½-2 mm brede. Modne bær m.m. skinnende. 200-2000m. TA,PR,ME.
ssp. macrocarpa (Sm.) Ball: Nålene tilsmalnede fra grunden, 2-2½ mm brede. Modne bær mat. 0-300m. Mest ved sandkyster.

J. phoenicea L. Skælene. 1-4(-8)m. Skælbladene i 6 rækker på trinde kviste, butte eller svagt spidse, med en aflang, furet kirtel på ryggen. Modne bær mørkerødt. 0-700m.

J. foetidissima Willd. Stinkene. Træ indtil 10m. Kvistene firkantede. Skælbladene modsatte, mest ukirtlede, men kølede, tilspidsede, stinkende ved knusning. 800-2300m. TA,PR,OL,KY,ER.

TAXACEAE

Taxus baccata L. Taks. 800-1800m.

EPHEDRACEAE

Ephedra. Ledris. Udpræget padderokkelignende buske med små akselstillede blomsterstande i nøgler. Bladene stærkt reducerede til korte skeder på få mm.

E. campylopoda C.A.Meyer (E. foeminea) Hængende ledris. -4m. Liggende eller hængende. Ældre kviste med hvid marv. Kvistene bøjelige og skøre, 1-2mm tykke, mørkegrønne eller noget blågrønne. Frugten 8-9mm. 0-700m.

E. major Host ssp. procera (Fischer & Meyer) Markgraf (E. nebrodensis ssp. pr.) Tyndt ledris. -2m. Opret eller opstigende. Ældre kviste med rød- eller sortebrun marv. Kvistene stive, tyndere end hos foregående. Frugten 5-7mm. 0-2000m. PR,KY.

SALICACEAE

Salix. Pil.

1. Nogle eller alle blade helt eller næsten modsatte ..... 2.
   Alle blade spredte 3.
2. Bladgrunden afskåret eller øret ..... amplexicaulis
   " kileformet eller lidt afrundet purpurea
3. Ihvertfald nogle større blades stilke med 1-4 kirtler ... 4.
   Bladstilkene uden kirtler 5.
4. Bladundersiden tæt silkehåret ..... alba
   " glat eller svagt silkehåret rubens
5. Større blade linjeformede, 6-16 x så lange som br. elaeagnos
   " " lancet- til omvendt ægformede cinerea

Salix alba L. Hvidpil. 0-1200m. Udbredt.

S. rubens Schrank Grøn pil. 100-1300m. Plantet og forvildet.

S. cinerea L. Gråpil. 300-1500m.

S. elaeagnos Scop. Lavendelpil. -6m. Bladene indtil 12x2cm, med indrullet og kirteltandet rand, som unge tæt hvidfiltede på begge sider, senere med glat overside. Flodlejer. 500-1600m.

S. purpurea L. Purpurpil. Bladstilken indtil 8mm. Mest med få modsatte bladpar. Flodlejer. 700-1300m.

S. amplexicaulis Bory -3m. Ligner den foregående og har ligesom den opadtil savtakkede og nedadtil helrandede blade. Bladstilken indtil 3mm. Bladene overvejende modsatte, de større 3-5cm. -1700m.

Populus. Poppel.

1. Langskudsbladenes undersider tæt filtede ..... 2.
" " ikke " 3.
2. Langskudsbladene håndlappede, undersiden hvidfiltet ... alba
" uregelmæssigt takkede, und. gråf. canescens
3. Bladene rundagtige, uden gennemskinnelig rand ..... tremula
" rude- til trekantet-ægf., med gennemskinnelig rand 4.
4. Kvistene længderibbede, m.m. kantede ..... canadensis
" uden længderibber, m.m. trinde 5.
5. Stammens bark askegrå til sort ..... nigra
" " hvidlig thevestina

Populus alba L. Sølvpoppel. 0-800m.

P. canescens (Aiton) Sm. Gråpoppel. Plantet.

P. tremula L. Bævreasp. 600-1500m. PN.

P. nigra L. Sortpoppel. 0-800m.

P. thevestina Moench Ligner den foregående. Bladene æg-rudeformede, svagt tandede til helrandede, med afrundet eller kileformet grund. Plantet nær Navplio.

P. canadensis Moench Landevejspoppel. Nogle blade med 1-2 kirtler ved bladgrunden. Plantet og sjældent forvildet.

JUGLANDACEAE

Juglans regia L. Valnød. 200-1150m. Både vild og plantet.

BETULACEAE

Alnus glutinosa (L.) Gaertner Rødæl. 0-1500m. NV.

CORYLACEAE

Carpinus betulus L. Avnbøg. Bladene 5½-8½cm. Hunblomsternes svøb trelappet. 500-1400m. ?

C. orientalis Miller Småbladet avnbøg. 1-5(-20)m. Bladene som hos betulus, men mindre, 2½-4cm lange. Hunblomsternes svøb trekantet-ægformet. 200-1400m. IV-V.

Ostrya carpinifolia Scop. Humlebøg. 5-10m. Bladene som Avnbøgs, men oversidens ribber ikke fordybede. Hunraklerne ligner forlængede humlekopper. Bladene 5-8cm med 13-19 par sideribber (10-14 hos Avnbøg). 200-1400m. IV-V.

Corylus avellana L. Hassel. Bladene 5-10cm. 400-1400m.

C. maxima Miller Storfrugtet hassel, Lambertsnød. Bladene 7-14 cm, ofte lidt lappede. Hasen rørformet, ca. 2 x nødden og indsnøret over denne. Sjældent dyrket.

CUPULIFERAE

Castanea sativa Miller Ægte kastanje. Bladene 18-22cm, lancetformede, skarpt savtakkede med brodspidsede tænder. Mest 400-900m.

Quercus. Eg.

1. Bladene stedsegrønne og læderagtige ..... 2.
" løvfældende, ikke " 3.
2. Bladundersiden hurtigt glat ..... coccifera
" filtet ilex
3. Bladlapperne brodspidsede ..... macrolepis
" ikke brodspidsede 4.
4. Akselbladene bliver siddende i mindst 2 år ..... cerris
" hurtigt affaldende 5.
5. Kvistenes og bladenes filt gullig. Bladgrunden øret frainetto
" " " " hvidlig eller grå. Bladgrunden m.m. afrundet pubescens

Quercus ilex L. Steneg. -15m. Ofte en busk. Bladene 3-8cm, tornet-tandede til helrandede, med gulliggrøn underside. 0-1400m.

Quercus coccifera L. Kermeseg. -2m. Bladene 1½-4cm, tornet-tandede, skinnende mørkegrønne, æg- til omvendt ægformede. 0-1200m.

Q. macrolepis Kotschy (Q. ithaburensis ssp. m.) Brodeg. 10-15m. Bladene 6-10cm med 3-7 par trekantede lapper, der ender i en brod. Undersiden filtet. 0-600m.

Q. cerris L. Frynseeg. 2-25m. Let kendelig på de blivende, linjeformede, 7-11mm lange fodflige. Eneste løvfældende art med agerne siddende under bladduskene. 100-1500m.

Q. frainetto Ten. Kameg. Unge kviste klæbrige med talrige punktformede korkporer. Bladene med 8-9 par parallelsidede lapper. 200-1200m.

Q. pubescens Willd. Duneg. -25m. Bladene 3½-10cm med 3-6 par lapper; vedvarende dunhårede langs kanten. 200-1200m. Udbredt.

ULMACEAE

Ulmus. Ælm.

1. Bladets længste side danner en afrundet lap ved grunden, der m.m. overlapper bladstilken ..... glabra
   Bladgrunden overlapper ikke bladstilken 2.
2. Bladet rundagtigt med m.m. hjærteformet grund ..... procera
   " omvendt æg- til lancetformet, med kileformet eller afskåret grund 3.
3. Kvistene tæt dunede. 12-16 par bladribber ..... canescens
   " glatte til svagt dunede. 7-12 par bladribber minor

Ulmus glabra Hudson Skovælm. 600-1400m. 1 fund.

U. minor Miller Småbladet ælm. 0-1400m.

U. canescens Melville Gråælm. 0-1400m.

U. procera Salisb. Skævbladet ælm. -30m. Bladbredden over ¾ af længden. Oversiden oftest meget ru, undersiden blødhåret. Unge kviste tæt børstehårede. Bladstilken 4-6mm. 0-1400m. 1 fund.

Celtis australis L. Nældetræ. 10-25m. Bladene minder om de smalle blade hos Stor nælde, langt tilspidsede, mørkegrønne med ru overside. En 8-10mm stor, sortebrun stenfrugt. 100-850m.

C. tournefortii Lam. Rundtakket nældetræ. 1-6m. Bladene ægformede, 2½-5x1½-3cm, nærmest dunbirkeagtige, usymmetriske, med korte, brede tænder, grågrønne og m.m. glatte ovenpå, bleggrønne nedenunder, med 3-året grund. En indtil 12mm stor, gullig eller orange stenfrugt. 200-600m. 2 gamle fund.

MORACEAE

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Papirmorbærtræ. 6-10m. Kvistene tæt låddent-filtede. Bladene 7-20x6-12cm, æg-rudeformede og tilspidsede eller trefligede, savtakkede, ru og mørkegrønne ovenpå, grågrønt filtede nedenunder. Plantet og sj. forvildet.

Morus nigra L. Sort morbær. Træ med kraftige, ru grene. Bredt æg-hjærteformede blade med dunet under- og mat overside. Mørkpurpur brombærlignende frugt. Dyrket og sj. forvildet.

M. alba L. Hvidt morbær. Som forrige, men med glatte, slanke kviste, glat bladunderside og m.m. skinnende overside. Rødlig til hvid frugt. Dyrket og sj. forvildet.

Ficus carica L. Figen. 0-1500m.

CANNABACEAE

Humulus lupulus L. Humle. 0-1100m. Dyrket og forvildet.

URTICACEAE

Urtica. Nælde.

1. Bladstilken lig eller længere end bladpladen. Enårige ... 2.
" kortere end bladpladen 3.
2. Hunblomsterne i lange, udstående klaser ..... dubia
" i stilkede, kugleformede hoveder pilulifera
3. Enbo enårig. Klaserne under 2cm lange ..... urens
Tvebo flerårig. Klaserne over 2cm lange dioica

Urtica dioica L. Stor nælde. 300-1900m. V-VIII.

U. urens L. Liden nælde. 0-600m. II-V.

U. dubia Forsskål (U. membranacea) Udspærret nælde. 20-30cm. Bladet ægformet med 8-15 par tænder og 2 fodflige. 0-500m. II-V.

U. pilulifera L. Kuglenælde. 20-50cm. Bladene helrandede til oftest dybt savtakkede. 4 fodflige. 0-700m. III-V.

Parietaria. Springknap.

1. Støttebladene danner i frugt et hårdt, brunt, 5-lappet svøb om blomsterne. Bladene sjældent over 1cm cretica
Støttebladene vedvarende urteagtige og frie 2.
2. Støttebladene mindst lig frugtblosteret. Enårig.. lusitanica
" kortere end " . Flerårige 3.
3. Opret og lidet grenet ..... officinalis
Liggende eller opstigende og stærkt grenet diffusa

Parietaria officinalis L. Alm. springknap. 30-100cm. Bladene smalt rudeformede, med gennemskinnelige årer. Støttebladene helt frie. Blosteret 2mm hele tiden. 250-1300m. IV-VIII. ?

P. diffusa Mert.& Koch (P. judaica) Grenet springknap. 20-40 cm. Bladene højst 5cm, årerne ikke gennemskinnelige. Støttebladene sammenvoksede ved grunden. Blosteret forlænges til 3-4mm i frugt. 0-1000m. III-VI.

P. lusitanica L. Enårig springknap. 5-20cm. Bladene 1-2cm x 8-12mm. Frugtblosteret 1½mm med indadbøjede spidser. IV-VI.

P. cretica L. Småbladet springknap. 10-40cm. Mest enårig. Bladene 5-15x2-15mm. Oftest 3 blomster i hvert nøgle.0-500m.III-V.

SANTALACEAE

Urter eller småbuske med spredte, oftest smalle blade uden fodflige. Små blomster med enkelt bloster og kegleformet underdel.

Osyris alba L. Kratris. Rislignende busk op til 120cm med noget kantede stængler og ca. 1cm lange, linjeformede blade. Små gulgrønne blomster, 3-4-tallige. 0-600m. sIII-VI.

Thesium. Nålebæger. Urter. Blomsterne i klase eller top, 5-tallige.

1. Blomsterne i top, de fleste sidegrene flerblomstrede ... 2.
" i klase eller top med de fleste grene 1-bloms. 4.
2. Nødden tydeligt netåret ..... bergeri
" " længdeåret, svagt tværåret 3.
3. Med flere, mangeblomstrede topgrene ..... divaricatum
Topgrenene 1-4-blomstrede linophyllon
4. Tyndrodet enårig. Ingen udløbere ..... humile
Flerårig med m.m. forveddet pælerod. Kan have udløbere 5.
5. Nødden med indtil 20 længderibber ..... arvense
" " 10 længderibber 6.
6. Længste klasegrene over 5mm. Mest over 15cm .. linophyllon
" " under 5mm. Mest under 10cm høj parnassi

Thesium arvense Horv. Marknålebæger. 10-25cm. Stænglen i det mindste ru foroven. Blomsterstilke 2-10mm. Bladene 1-2mm brede, mest med 1 svag åre. 850-1950m. V-VIII. TA,PR,ME,KH.

T. parnassi DC. Dværgnålebæger. 5-8cm. Med udløbere. Stænglen jævn. Bladene 1mm brede, 1-årede, ofte krumme. Klasen 1-4cm. 1800-2450m. sV-sVIII. PR,ME,KY,KH.

Thesium linophyllon L. Risnålebæger. 20-30cm. Grålig- til gulliggrøn. Stænglen jævn. Stængelbladene 1½-3½cm x 2-3mm, 1-årede. Klasestilkene 5-12mm. 1400-2200m. sV-sVIII. Som ssp. linophyllon.

T. divaricatum Jan Topnålebæger. 20-40cm. Stænglen jævn, grenet foroven. Bladene 1-3cm, spidse, 1-årede. 100-1100m. V-VIII.

T. bergeri Zucc. 10-15cm. Flere stængler, oftest ru foroven. Bladene ½-3cm. Klasestilkene mest 2-5mm. 0-1300m. IV-VI.

T. humile Vahl Netåret nålebæger. 5-20cm. Bladene rurandede. Blomsterne ofte meget kortstilkede. Nødden med tværårer. IV-V.

LORANTHACEAE

Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb. Enebo. 3-12cm. Grønne, spidsvinklet grenede snylteplanter med kraftigt reducerede, modsatte, stængelomfattende, spidse skælblade på ½-1mm. På Juniperus oxycedrus. 400-1700m. VII-X.

Loranthus europaeus Jacq. Egemistelten. En sommergrøn mistelten med grå, forveddede grene. Blomsterne i klaser. Gule bær. Kun på Eg og Castanea. 250-1300m. V-VI.

Viscum album L. Mistelten. Stedsegrøn. Grenene urteagtige og grønne. Næsten aldrig på Eg. 500-1600m. III-VI. 2 underarter:
ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.: Granmistelten. På Ædelgran. Bladene under 4 x så lange som brede. Bærret hvidt.
ssp. austriacum (Wiesb.) Vollm.: Fyrremistelten. På Pinus nigra. Bladene over 4 x så lange som brede. Bærret gult.

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia. Slangerod.

1. Stedsegrøn, forveddet slyngplante ..... sempervirens
   Løvfældende urter 2.
2. Bladene m.m. siddende, med stængelomfattende øren .. rotunda
   " tydeligt stilkede, ikke stængelomfattende 3.
3. Blosterets krave uudviklet eller et kort næb .... microstoma
   " " veludviklet 4.
4. Bladene med kun svagt hjærteformet grund, 1-3cm parvifolia
   " " tydeligt " " , 2-6½cm 5.
5. Blosterrøret tenformet, bredest midtpå ..... elongata
   " kølleformet, bredest foroven pallida

Aristolochia sempervirens L. Pibeblomst. 2-5m. Bladene indtil 10x6cm. Blomsterne 2-6cm, gråliggule, med brunlilla rand og ofte med brunlilla striber. 0-1100m. III-VII.

A. parvifolia Sm. -60cm. Blosteret 2½-8½cm, gråliggult med en olivengul til mørkebrun krave, der er 6-8 x så lang som bred og meget længere end røret. 0-400m. III-V. Mani-halvøen.

A. pallida Willd. Bleg slangerod. -50cm. Bladene m.m. ægformede, stilken 2-18mm. Blomsterne gråliggrønne eller -gule med brunlilla striber. 400-1200m. IV-VI. ?

A. elongata (Duchartre) Nardi Som den foregående. Blosterkraven olivenbrun indvendigt, ofte med lilla striber eller skær. III-VI.

A. microstoma Boiss.& Spruner Kølleslangerod. -50cm. Blosteret 14-32mm, grågrønt eller gråguit udvendigt, ofte med rubinrødt anstrøg, med brunlilla striber indvendigt. 0-1450m. II-VI. NØ-Pel.

A. rotunda L. ssp. insularis (Nardi & Arrigoni) Gamisans Rund slangerod. -1m. Blosteret 2-8cm, grågrønt eller gråguit med et ret, trompetformet rør og en længere, flad krave. Underarten har forlængede rodknolde. 0-600m. IV-VII.

RAFFLESIACEAE

Cytinus hypocistis (L.) L. Alm. elveræg. 3-8cm høj snylteplante. Planten kødfuld, dækket af gule, orange eller skarlagenrøde, kø-

dede skælblade. 5-10 kraftigt gule blomster foroven, omgivne af kødede højblade af skælbladenes farve. Snylter på Cistus salviifolius og parviflorus. 0-600m. sIII-mV.

Cytinus ruber (Fourr.) Komarov (C. hypocistis ssp. clusii) Karminrødt elveræg. Som den foregående, men skælbladene karminrøde og blomsterne hvide eller blegt lyserøde. Snylter på Cistus creticus. sIII-mV. Mest langs vestkysten.

POLYGONACEAE

Polygonum. Pileurt.

1. Slyngende enårig. Bladene hjærte-pilformede .... convolvulus
   Ikke slyngende. Bladene anderledes 2.
2. Bladskederne lasede og sølvhvide eller klare foroven ..... 3.
   " næppe lasede, m.m. brunlige 9.
3. Mellemste skedehinder længere end stængelleddene maritimum
   " " kortere " " 4.
4. Støttebladene kortere end blomsterne. Øvre blomster i aks 5.
   " længere " " 7.
5. Frugtblosteret fortykket, indeslutter nødden helt bellardii
   " stadig kronbladsagtigt øverst, indeslutter ikke nødden 6.
6. Stænglen kraftig, næsten bladløs under blomstr. equisetiforme
   " spinkel, bladet under blomstringen arenarium
7. Sidegrenenes blade klart mindre end hovedgrenenes aviculare
   Bladene nogenlunde lige store 8.
8. Fleste blomster i m.m. tætte aks ..... longipes
   Alle blomsternøgler i hjørnerne af alm. blade arenastrum
9. Blomsterne i hoveder på 5-10mm ..... capitatum
   " i aks, der er mindst 4 x så lange som brede 10.
10. Akset løst forneden med nogle bladagtige støtteblade ... 11.
    " tæt 12.
11. Flerårig. Med udløbere eller rodslående grene salicifolium
    Enårig. Ikke krybende eller rodslående hydropiper
12. Flerårig ..... amphibium
    Enårig 13.
13. Bladgrunden afskåret eller hjærteformet ..... orientale
    " kileformet 14.
14. Skedernes randhår under 1½mm. Blosteret gulkirtlet lapathifolium
    Skedernes randhår 2-4mm. Blosteret m.m. ukirtlet persicaria

Polygonum convolvulus L. Snerlepileurt. 0-1400m. V-VIII.

P. maritimum L. Året pileurt. 10-40cm. Flerårig med liggende, ru og kantede stængler. Bladene grågrønne. Skederne med 8-12 tydelige, brune årer og brun grund. Strandplante. IV-VII.

P. arenarium W.& K. Spinkel pileurt. 20-50cm. Bladene linje-lancetformede, ofte affaldende. Mindst 1 blomst i hvert nøgle med stilken længere end blosteret, dette 1,8-2,5mm. 0-1200m. V-XII.

P. bellardii All. (P. patulum) Russisk pileurt. 20-100cm. Mest opret. Bladene m.m. lancetformede. Frugtblosteret grålighvidt med fortykkede ribber. 300-1600m. VI-VII.

P. equisetiforme Sm. Padderokkepileurt. 30-100cm. Stænglerne ofte 3-5mm tykke, stribet-furede. Bladene ofte væk før blomstringen. Blosteret 3-4mm. 0-600m. VII-X. Patras.

P. longipes Hal.& Charrel 40-100cm. 1-2-årig. Især de øvre blade fint rillede på oversiden. 0-800m. VI-IX. Patras.

P. arenastrum Bor. Almindelig pileurt. 750-2500m. V-X.

P. aviculare L. ssp. neglectum (Besser) Arc. Vejpileurt. VI-X.

P. amphibium L. Vandpileurt. 100-1000m. VI-VIII.Stymfaliske Sø.

P. lapathifolium L. 0-1400m. V-IX. 2 underarter:

ssp. lapathifolium: Knudet pileurt. Bladundersiden svagt håret. Stænglen rødplettet. Frøet med kredsformet grund.
ssp. pallidum (With.) Fr.: Bleg pileurt. Bladundersiden tæt gråhåret. Stænglen næppe rødplettet. Frøet med bred, afskåret grund.

Polygonum persicaria L. Ferskenpileurt. 0-900m. VI-X.

P. hydropiper L. Bidende pileurt. 0-1000m. VI-X.

P. salicifolium Willd. Pilebladet pileurt. 30-70cm. Bladene 5-15 cm x 5-15mm, finttandet randhårede. Lyserøde blomster i lange, slanke aks. 0-200m. V-IX.

P. orientale L. Nikkende pileurt. 50-100cm. Hele planten tæt dunet. Bladene 8-20x2-3cm. Flerakset. 0-500m. VI-IX. Forvildet.

P. capitatum D.Don 30-50cm. Kirteldunet flerårig. Bladene æg-rudeformede, 1½-4x1-2½cm. Aksene lyserøde, 1-3cm langt stilkede. III-IX. Forvildet ved Patras.

Rumex. Skræppe.

1. Bladgrunden spyd- eller pilformet ..... 2.
" ikke spyd- eller pilformet 5.
2. Blosterbladene under 2mm ..... acetosella
" over 2mm 3.
3. Ydre blosterblade opret-udstående ..... scutatus
" " efterhånden nedbøjede 4.
4. Ydre blosterblade 2½-4mm i frugt, 1mm forbundne .. tuberosus
" " 1½-2½mm i frugt, ½mm " nebroides
5. Frugtblosteret 12-18x12-20mm. Enårig ..... vesicarius
" under 12mm 6.
6. 5-20cm. Bladene 1-3cm, med kileformet grund bucephalophorus
Højere. Bladene større 7.
7. Bruskvorten næsten så bred som blosterbladet conglomeratus
" tydeligt smallere end blosterbladet 8.
8. Blomsterstilkene tykke, leddede nær midten ..... pulcher
" tynde, " under midten 9.
9. Tændernes længde ca. = blosterets bredde ..... dentatus
Blosterbladene helrandede eller finttandede 10.
10. Grundbladene 4-5 x så lange som brede ..... crispus
" ca. 2 x så lange som brede cristatus

Rumex acetosella L. ssp. acetoselloides (Balansa) den Nijs Rødknæ. 0-2500m. III-VII. TA,KY,KH.

R. scutatus L. Skjoldsyre. 20-40cm. Bladene ofte noget vorterodsformede, ca. så lange som brede. Indre blosterblade 4-5mm, runde med hjærteformet grund. 900-2400m. VI-VIII. TA,KY.

R. tuberosus L. Knoldsyre. 10-60cm. Med tenformet fortykkede rødder. Bladene som hos Syre. 0-1500m. III-VII. 3 underarter:
ssp. creticus (Boiss.) Rech.f.: Flerstænglet. Nedre blade butte. Toppen kort og tæt, flere gange grenet.
ssp. tuberosus: Mest 1-stænglet. Nedre blade spidse eller butte. Topgrenene ugrenede; toppen lang og åben.
ssp. horizontalis (K.Koch) Rech.f.: Mest 1-stænglet. Nedre blade butte eller spidse. Toppen grenet flere gange.

R. nebroides Campd. (R. gussonei) Smalbladet syre. 20-50cm. Nedre blade med smalle, spidse flige. Øvre blade få og smalle, 5-20 x så lange som brede. 1600-2200m. VI-VIII. KY,KH.

R. vesicarius L. Storblomstret skræppe. 15-40cm. Bladene trekantet-ægformede, indtil 7x4cm. Blosterbladene hindeagtige, tæt netårede, rødlige. III-VI. Flere steder langs kysten ved Navplio.

R. bucephalophorus L. Oksehovedskræppe. 5-20cm. Blomsterne i klaser, hængende, med 2 slags stilke: nogle tynde og korte, andre brede og flade. Blosteret langtandet. 0-1400m. IV-VI. 3 ssp.:
ssp. aegaeus Rech.f.: Med grundstillede blomster.

ssp. bucephalophorus: Ingen grundstillede blomster. Frugtblosteret trekantet med 2-3 par brede tænder.
ssp. gallicus (Steinh.) Rech.f.: Ingen grundstillede blomster. Frugtblosteret tungeformet med mest 3 par smalle tænder.

Rumex cristatus DC. Rustskræppe. 60-200cm. Nedre blade 20-30 x 5-15cm. Toppen tæt. Blosterbladene ofte rødbrune, 5-8x5-7mm, med talrige, 0,7-1mm lange tænder. 0-1600m. V-VIII.

R. crispus L. Kruset skræppe. 0-1200m. V-VII.

R. conglomeratus Murray Nøgleskræppe. 0-1200m. IV-VIII.

R. pulcher L. Violinskræppe. 20-60cm. Nedre blade ofte violinformede. Toppen med udstående grene, zigzagbøjet foroven. Nøglerne ofte adskilte forneden og bladede. 0-1500m. IV-VI. 2ssp.:
ssp. pulcher: Blosteret med mest 4 par 1-2mm lange tænder.
ssp. woodsii (De Not.) Arc. (ssp. divaricatus): Blosteret med indtil 8 par korte og ofte uregelmæssige tænder.

R. dentatus L. ssp. halacsyi (Rech.) Rech.f. Øreskræppe. 20-70 cm. Nedre blade små, ofte med udvidet grund. Frugtblosteret aflangt-trekantet, netåret, but, med 3 vorter; tænderne 3-6mm.

Emex spinosa (L.) Campd. Tornsalat. 30-60cm. Spinatlignende enårig, der kendes på sine frugter, der sidder i nøgler i bladhjørnerne og udmærker sig ved hver 3 kraftige, udadrettede torne. Bladene aflangt-trekantede og afrundet spydformede. II-IV.

CHENOPODIACEAE

1. Kødede, leddede stængler med modsatte grene ..... 2.
   Anderledes 4.
2. Enårig. Alle grene frugtbare ..... Salicornia
   Flerårig. Nogle grene golde 3.
3. Grenene med små knopper af kødede blade i grupper Halocnemum
   Bladene uudviklede Arthrocnemum
4. Bladene flade ..... 5.
   " trinde eller halvtrinde 9.
5. Frugten omgivet af 2 forblade, der forøges i frugt ..... 6.
   " uden sådanne forblade 7.
6. Forbladene frie, i det mindste i øvre halvdel .... Atriplex
   " sammenvoksede næsten til spidsen Halimione
7. Bladene lancetformede og helrandede ..... Kochia scoparia
   " anderledes 8.
8. Frugtblosteret fortykket, sammenvokset med frugten ... Beta
   " ej " , ikke sammenvokset Chenopodium
9. Bladene indsnørede ved grunden ..... Suaeda
   " ikke indsnørede ved grunden 10.
10. Flerårig med m.m. stive, sylformede blade ... Camphorosma
    Enårige 11.
11. Bladene butte. Blomsten uden forblade ... Kochia laniflora
    " spidse. " med " Salsola

Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arc. Strandbede. Flerårig. kystplante. Klasen uden eller kun med små støtteblade. III-VI.

B. adanensis Pamuk. 10-40cm. Enårig med bladagtige støtteblade. Frugtblosteret tykt og svampeagtigt, m.m. vinkelret bøjet indad og stærkt kølet. VI-sVIII. Asteri-øen nær Hydra.

B. nana Boiss.& Heldr. Dværgbede. Flerårig rosetplante. Bladene 2½-6x½-1cm. Stænglerne 2-5(-8)cm, udstrakte eller nedadkrummede. 1900-2350m. TA,KY,KH.

Chenopodium. Gåsefod.

1. Planten dunet og kirtlet, med aromatisk duft ..... 2.
   " glat eller melet, ikke aromatisk 3.
2. Bladene bølget-tandede. Blomsternøglerne i aks ambrosioides
   " lappede. Blomsternøglerne i kvaste botrys

3. Flerårig med trekantet-spydformede blade .... bonus-henricus
   Enårig 4.
4. Bladet helrandet, undertiden med spydformet grund vulvaria
   I det mindste de nedre blade lappede eller tandede 5.
5. Bladene grønne, ikke eller svagt melede ..... 6.
   " melede 7.
6. Planten opret, lidet grenet, grenene stærkt oprette urbicum
   " ofte mere grenet, grenene mere udstående murale
7. Bladene store, indtil 14cm, rødlilla som unge .... giganteum
   " mindre, ikke rødlilla 8.
8. Bladene næsten så lange som brede ..... opulifolium
   " tydeligt længere end brede album

Chenopodium botrys L. Bugtet gåsefod. 5-50cm. Bladene fjerlappede med op til 4(6) par lapper. Bladet op i blomsterstanden. VI-X.

C. ambrosioides L. Vellugtende gåsefod. 30-80cm. Bladene lancetformede med bugtet-tandet rand. Blomsterstanden grenet og bladet. 0-300m. VI-XI.

C. bonus-henricus L. Stolthenriks gåsefod. 1000-2300m. V-VIII.

C. vulvaria L. Stinkende gåsefod. 5-30cm. Planten lugter af rådden fisk. Bladene m.m. rudeformede og melede, undertiden med en enkelt, stor, svagt afsat tand og derved lidt spydformede. V-IX.

C. urbicum L. Rank gåsefod. 30-120cm. Planten altid grøn og rank. En forlænget, rigtblomstret top. 0-600m. VII-XI.

C. murale L. Murgåsefod. 10-90cm. Bladene noget rudeformede, mørkegrønne og lidt skinnende ovenpå. 0-400m. III-XI.

C. opulifolium Schrader Kortbladet gåsefod. 30-100cm. Bladene ægrudeformede med en kort og bred lap på hver side. 0-600m. V-X.

C. album L. Hvidmelet gåsefod. 0-1100m. V-X.

C. giganteum D.Don Kæmpegåsefod. ½-3m. Bladene kun lidt længere end brede, m.m. trekantede, ret småtandede. 0-200m. IX-XI.

Atriplex. Mælde.

1. Flerårig busk med helrandede, ægformede blade ..... halimus
   Enårige urter 2.
2. Forbladene runde og butte, netårede ..... hortensis
   " spidse, ikke netårede 3.
3. Forbladene forhærdede i frugt. Stænglerne trinde/kantede 4.
   " ej " " " . " stærkt rillede 5.
4. Blomsterstanden endestillet, bladløs eller fåbladet tatarica
   Både ende- og sidestillede, bladede blomsterstande rosea
5. Nedre blade med afskåret grund ..... prostrata
   " " " kileformet grund patula

Atriplex halimus L. Sømælde. Busk op til 2m med sølvhvide, næsten læderagtige, ægformede og mest utandede blade. 0-200m. VI-XI.

A. hortensis L. Havemælde. 30-150cm. Nedre blade bredt ægformet-trekantede, svagt tandede til helrandede, matgrønne eller rødligt anløbne, op til 10cm lange. 0-100m. VII-X. Dyrket og forvildet.

A. tatarica L. Aksmælde. 10-50cm. Grågrøn med spredte, uregelmæssigt lappede eller tandede blade, der er trekantet-ægformede eller aflange. Forbladene smalt rudeformet-trekantede. 0-100m. IV-X.

A. rosea L. Rosenmælde. 25-80cm. Bladene trekantet- eller æg-rudeformede, tæt og spidst tandede. Planten m.m. hvidskællet. Forbladene 6-12mm i frugt, bredt trekantede. 0-400m. V-X.

A. patula L. Svinemælde. 0-2300m. VI-X.

A. prostrata Boucher (A. latifolia, hastata) Spydmælde. 0-100m.

Halimione portulacoides (L.) Aellen Ustilket kilebæger. 20-50cm.

Liggende, ofte rodslående halvbusk med m.m. aflange, 3-6cm lange, sølvmelede blade. Frugtens forblade omvendt trekantede og svagt trelappede fortil. Om. VII-X.

Camphorosma monspeliaca L. Kamferurt. 20-50cm. Opstigende halvbusk med 4-10mm lange, knippestillede blade. Blomsterne i endestillede aks, med et rørformet, 4-tandet bloster. VIII-IX. Xylokastro. Kyllænæs nordlige fod.

Kochia scoparia (L.) Schrader Sommercypres. 20-150cm. Opret enårig. Bladene lancetformede, 3-årede. Frugtblosteret med en knude på hvert blosterblad. 0-100m. sVII-X. Forvildet.

K. laniflora (Gmelin) Borbas Sandblomstermælde. 30-60cm. Strandgåsefodsgtig enårig. Bladene 1½-2cm, hårede og halvtrinde. Frugtblosteret smalvinget. Tørre, sandede steder. 0-150m. VII-IX.

Halocnemum strobilaceum (Pallas) Bieb. Knopkveller. Halvbusk indtil 1m, stærktgrenet med oprette grene med små, knopformede bladgrupper forneden og kvellerformede aks foroven. VI-X. NV-P.

Arthrocnemum. Buskkveller. Minder helt om kvellere, men ofte større; flerårige og med forveddet grund.

A. perenne (Miller) Moss (Sarcocornia p.) Tæppekveller. 5-80 cm. Med krybende, underjordiske skud og derfor ofte tæppedannende. De udfaldende blomster efterlader et tredelt hul og når næsten leddets overkant. Skuddene grønne, bliver ofte røde eller brune. Om. sVII-XI.

A. fruticosum (L.) Moq. (Sarcocornia f.) Alm. buskkveller. 10-30(-120)cm. Ingen udløbere. Planten blågrøn. De udfaldende blomster efterlader et tredelt hul og sidder et stykke fra leddets overkant. Om. sVIII-XI. NV-Pel., Aigina.

A. glaucum (Del.) Ung.St. (A. macrostachyum) Blågrøn buskkveller. 30-80(-120)cm. Ingen udløbere. Planten blågrøn, senere gulliggrøn eller rødlig. De udfaldende blomster efterlader et enkelt hul og når næsten leddets overkant. Om. VIII-sIX.

Salicornia europaea (L.) Alm. kveller. Om. V-X.

Suaeda maritima (L.) Dum. Strandgåsefod. Om. VI-X.

S. splendens (Pourret) Gren.& Godron Børstegåsefod. 30-50cm. Ligner den foregående, men bleggrøn. Bladene hvidkantede med en ca. 1mm lang, affaldende børste. Blosteret meget kødet i frugt. Om. sV-VIII.

S. vera J.F.Gm. (S. frutiscosa) Buskgåsefod. 40-60cm. Lille, stærktgrenet busk. Grenene glatte og stribede, med hvidlig bark. Bladene 8-15x1-1½mm, blågrønne, ofte rødlige, halvtrinde. IV-VIII.

Salsola kali L. Sodaurt. Bladene mest spredte, 15-50x1-2mm, stive og stikkende. 0-70m. VI-IX.

S. soda L. Blød sodaurt. 15-30cm. Bladene mest modsatte, 20-40 x 2-4mm, bløde, ikke stikkende. Om. sV-VII.

AMARANTHACEAE

Amaranthus. Amarant.

1. Kapslen åbnes ikke ..... 2.
   " " på tværs 4.
2. Flerårig. Kapslen opblæst, større end frøet ..... deflexus
   Enårig. Kapslen omslutter frøet tæt 3.
3. Kapslen 2-3mm, jævn eller svagt rynket ..... blitum
   " 1,4-1,7mm, stærkt tværrynket viridis
4. Alle blomster i akselstillede nøgler ..... 5.
   Med bladløse, endestillede aks eller toppe 7.
5. Forbladene 2 x blosteret, m.m. tornspidsede ..... albus
   " kortere end blosteret, ikke tornspidsede 6.

6. (4)5 blosterblade ..... blitoides
   3 " graecizans
7. Blosterbladene m.m. spatelformede, butte eller udrandede 8.
   " tilspidsede 9.
8. Stænglen tætdunet under toppen ..... retroflexus
   " glat eller svagt håret under toppen caudatus
9. Forbladene 1½-2 x blosteret. Toppen grøn ..... 10.
   " 1-1½ x " . " mest rød, gul, lilla 11.
10. Længste forblade 4-6mm, ca. 2 x blosteret ..... powellii
    " " 2-4mm, ca. 1½ x " hybridus
11. Forbladene ca. = blosteret ..... cruentus
    " ca. 1½ x blosteret hypochondriacus

Amaranthus caudatus L. Rævehaleamarnt. 30-150cm. Toppen med 1-flere hængende eller buekrummede aks. V-XI. Forvildet.

A. cruentus L. Blodamarant. 30-150cm. Planten ofte helt rødlig eller rødlilla, ellers mørkegrøn. Bladene med rødlige årer. Stænglen med buekrummede grene fra grunden. Fleste topgrene udstående. V-X. Forvildet fra dyrkning.

A. hybridus L. (A. chlorostachys) Topamarant. 20-100cm. Planten mørkegrøn. Topgrenene m.m. udspærrede. 0-800m. V-X.

A. hypochondriacus L. Rød amarant. Toppen ofte stor og tæt. Dyrket og forvildet. V-X.

A. powellii S.Watson Rank amarant. 100-200cm. Toppen friskgrøn, stift opret, noget åben, med opstigende-oprette sidegrene og stærkt forlænget endegren. 0-600m. V-X.

A. retroflexus L. Opret amarant. 15-100cm. Topgrenene korte og tætte, m.m. oprette. Blosterbladene spatelformede og udrandede. Endetopgrenen ikke meget længere end sidegrenene. 0-800m. V-X.

A. albus L. Hvid amarant. 10-60cm. Mest opret. Stænglen hvidlig-grøn. Bladene aflange eller spatelformede, med svagt bølget rand og kileformet grund. 0-1000m. V-X.

A. blitoides Watson Mældeamarant. 15-50cm. Stænglen hvidlig, mest liggende. Bladene mest elliptiske, ofte med en ½-1mm lang brod og mest en smal, hvidlig bruskrand. 0-1000m. V-X.

A. graecizans L. Vild amarant. 10-70cm. Mest opret. Bladene elliptisk rudeformede. Stænglen grøn eller rødlig. 0-500m. V-X.

A. blitum L. (A. lividus) Pletamarant. 10-80cm. Opret eller opstigende. Bladene rudeformede, ofte svagt udrandede, med en lys eller mørk plet. 0-200m. V-X.

A. deflexus L. Brodspidset amarant. 10-90cm. Krybende stængel. Langstilkede, butte, æg-rudeformede blade. Forbladene ½ x blosteret. 0-950m. V-X.

A. viridis L. (A. gracilis) Spinkel amarant. 10-70cm. Topakset tyndt og langt, bladløst og m.m. bugtet. Bladene æg-rudeformede.

NYCTAGINACEAE

Mirabilis jalapa L. Vidunderblomst. 40-100cm. Urt med modsatte, trekantet-ægformede blade med afskåret eller hjærteformet grund, spidse, 6-10cm, med en stilk på 1-2cm. Blomsterne røde, gule eller hvide, trompetformede med et rør på 2½-3½cm og en krave på 2½cm, i endestillede nøgler, hver med 5 bægerbladslignende højblade. VI-XI. Dyrket og forvildet.

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca americana L. Kermesbær. 0-620m. V-IX.

AIZOACEAE

Urter med kødede, ofte modsatte blade. Bægertænderne kødede. Talrige kronblade og støvdragere.

1. 8-20 støvfang ..... 2.
   4-5 " 3.
2. Bladene mørkegrønne. 10-14 støvfang ..... Carpobrotus
   " blågrønne. 8-11 fjerfrynsede støvfang Malephora
3. 4-tallig blomst. Bladene æg-hjærteformede, stilkede Aptenia
   5-tallig " . " halvtrinde, sidd. Mesembryanthemum

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. Hottentotfigen. -3m. Liggende flerårig. Bladene 4-15cm, med trekantet tværsnit og kølet underside. Blomsterne 5-10cm brede, mest rødlilla. Støvdragerne gule. 0-30(-500)m. III-V. Dyrket og forvildet.

Malephora purpuro-crocea (Haw.) Schwantes Bladene indtil 6cm, halvtrinde til svagt trekantede. Blomsterne 3-5cm brede, rødlilla til orangegule. Kapslen tør og vinget. 5-20m. V-VI.Elafonisos.

Aptenia cordifolia (L.f.) Schwantes Hjærtebladet middagsblomst. 30-50cm. Liggende, krystalvortet flerårig med 12-15mm brede, rødlilla blomster. 0-60m. VI-IX.

Mesembryanthemum nodiflorum L. Trind middagsblomst. 5-15cm. Enårig. Nedre blade modsatte, m.m. trinde og lidt affladede, 14x2-3mm, med få krystalvorter. 1cm brede blomster. 0-50m.IV-VII.

MOLLUGINACEAE

Glinus lotoides L. Filtet tæppeurt. 10-60cm. Liggende, gråt stjærnefiltet enårig. Bladene bredt ægformede til halvrunde, lidt uens, mest i kranse, 2-3½-1-1½cm. Blomsterne i nøgler på 2-10 i bladhjørnerne, 4-8mm, uden krone, med 5 bægerblade og en del hvide, oftest trekløvede staminodier. 0-350m. VII-IX.

PORTULACACEAE

Portulaca oleracea L. Portulak. 5-50cm. Ofte liggende enårig. Bladene spatelformede, kødede, skinnende mørkegrønne, spredte forneden, tætstillede foroven under blomsterne. Disse 6-8mm, få sammen mellem de øvre blade, med gul krone. 0-1000m. IV-X.

Montia fontana L. ssp. amporitana Sennen Stor vandarve. Planten grøn. Frøene noget skinnende. 0-1000m. III-VI. TA.

M. arvensis Wallr. (M. minor) Liden vandarve. Planten gulgrøn. Frøene matte. 0-1700m. III-VI.

CARYOPHYLLACEAE

1. Fodflige forefindes ..... 2.
   " mangler 9.
2. Alle blade spredte ..... 3.
   I det mindste de nedre blade modsatte eller i krans 4.
3. Bægerbladene 3-7mm. Frugten en kapsel ..... Telephium
   " under 3mm. Frugten en nød Corrigiola
4. Bladene linjeformede ..... 5.
   " flade og brede 6.
5. 3 grifler. Fodfligene sammenvoksede ..... Spergularia
   5 " . " frie Spergula
6. Blomsternes støtteblade store og hindeagtige .... Paronychia
   Støttebladene uanselige 7.
7. Blomsterne i endestillede kvaste ..... Polycarpon
   " i nøgler i bladhjørnerne 8.
8. M.m. opret. Bladene med en kort brod Paronychia echinulata
   Udstrakt. Bladene uden brod Herniaria
9. Bægerbladene helt eller næsten frie ..... 10.
   " sammenvoksede 20.
10. 2 grifler ..... 11.
    3-5 grifler 12.
11. Uden kronblade ..... Scleranthus
    Med " Bufonia
12. 4-5 grifler ..... 13.
    3 " 15.

13. Bladene linje-sylformede ..... Sagina
" flade 14.
14. Glatte enårige. Kronbladene hele eller udrandede Moenchia
Mest hårede. Kronbladene mest kløvede Cerastium
15. Blomsterne i skærm. Kronbladene tandede ..... Holosteum
" ikke i skærm. Kronbladene hele eller kløvede 16.
16. Indre støvdragere forenede ved grunden ..... Rhodalsine
Alle " frie 17.
17. 3 kapseltænder. Bladene lancet- til sylformede .. Minuartia
6 " . " runde til lancetformede 18.
18. Kronbladene kløvede eller manglende ..... Stellaria
" hele 19.
19. Nedre blade langstilkede, 3-årede, ægformede ... Moehringia
" " anderledes Arenaria
20. 3-5 grifler ..... 21.
2 " 24.
21. Blade og støtteblade stive og tornspidsede ..... Drypis
" " " ikke " 22.
22. Bægertænderne mindst af rørets længde ..... Agrostemma
" ikke forlængede 23.
23. 5 grifler. Tvekønnede blomster ..... Lychnis
3 " . Hvis 5 grifler, så tvebo Silene
24. Bægeret krukkeformet med 5 brede vinger ..... Vaccaria
" uvinget 25.
25. Bægerets ribbemellemrum hindeagtige ..... 26.
" " ikke hindeagtige 28.
26. Bægerribberne fremtrædende. Bægeret 2½-5½mm ..... Bolanthus
" ikke fremtrædende 27.
27. Øvre blade kirteldunede. Planten 4-10(-15)cm høj Gypsophila
Bladene ikke kirtlede Petrorhagia
28. Med yderbægerskæl ..... Dianthus
Uden " 29.
29. Blomsterne i hoveder med et helrandet svøb ... Cyathophylla
Anderledes 30.
30. Bladene linje-sylformede ..... Velezia
" brede Saponaria

Arenaria. Sandvåner.

1. Flerårige med golde skud ..... 2.
1-2-årige uden golde skud 3.
2. Blade og bægerblade m.m. butte ..... cretica
" " " spidse til tilspidsede filicaulis
3. Alle blade stilkede, med 1 ribbe ..... muralis
Mellemste og øvre blade siddende, med 3-7 ribber 4.
4. Kronen lig eller længere end bægeret ..... 5.
" tydeligt kortere end bægeret 6.
5. Frøene 0,75-1mm. Bægeret 3-5mm. Bjærgart ..... conferta
" 0,7mm. Bægeret 2½-3mm. Strandart leucadia
6. Bægerbladene linje-lancetformede ..... guiccardii
" æg- til lancetformede 7.
7. Kapslen rundagtig til ægformet. Frøene 0,5-0,65mm serpyllifolia
Kapslen smalt æg- til kegleformet. Frøene 0,35-0,5mm 8.
8. Nedre blade spatelformet-runde, noget kødede peloponnesiaca
" " spatelformede, ikke kødede leptoclados

Arenaria cretica Sprengel Skør sandvåner. 2-10cm. M.m. kirteldunet, pude- eller tæppeplante. Blomstrende stængler oprette med 1-3(-5) blomster. Kronen 2 x bægeret. 1500-2900m. sVI-sVIII. TA, ME,KY,KH,ER.

A. filicaulis Fenzl Trådsandvåner. 5-15cm. Kirteldunet pude- eller tæppeplante. Kvastene med (1-)3-10 blomster. Kronen 1,5-2,2 x bægeret. 1000-2500m. mVI-mVIII. 2 underarter:
ssp. filicaulis: Bladene mindst 3 x så lange som brede.
ssp. graeca (Boiss.) McNeill: Bladene 2½-3 x så lange som brede.
PR,ME,OL,KY,KH m.m.

Arenaria muralis (Link) Sprengel Mursandvåner. 5-25cm. Kirteldunet. Nedre blade indtil 12x9mm, stilken indtil 8mm. Bæger og krone 2½-3½mm. 0-1000m. III-V.

A. conferta Boiss. ssp. conferta Grå markarve. 3-15cm. Udstrakt til opstigende 1-2-årig. Bladene m.m. grådunede, tætstillede forneden. Kapslen bredt cylindrisk. 1400-2800m. mVI-mVIII. KH.

A. leucadia Phitos & Strid 2-5(-8)cm. Tæt, buskagtig enårig. Kapslen ægformet, forhærdet. Sandstrand. V-fVI.

A. serpyllifolia L. Alm. markarve. 0-1500(-2400)m. III-X.

A. leptoclados (Rchb.) Guss. Spæd markarve. 0-1600m. IV-VI.

A. peloponnesiaca Rech.f. -15cm. Kirteldunet. Nedre blade rundagtigt spatelformede. Bægeret 3,2-3,7mm. Kronen 2/3 x bægeret. Kystnær. IV. SV-halvøen.

A. guicciardii Heldr. 3-6cm. Blomsterne i tætte nøgler; stilkene mest under ½ x bægeret. Kapslen smalt cylindrisk, 3-3½ x så lang som bred. 800-1650m. V-VI.

Moehringia trinervia (L.) Clairv. Skovarve. 800-1500m. V-VII.

Minuartia. Norel.

1. Enårig, uden golde skud under blomstringen ..... 2.
   Flerårig, med golde skud under blomstringen 7.
2. Støttebladene krogspidsede i frugt ..... hamata
   " ej " " " 3.
3. Bladene med 5-7 ribber. Bægerbladene meget uens globulosa
   " " 3 " . " lidt " 4.
4. Øvre blomsterstilke kortere end bægeret ..... mediterranea
   Alle " længere " " 5.
5. Stænglerne kirteldunede ..... mesogitana
   " glatte 6.
6. Kronbladene omvendt ægformede, ofte med kort negl ... lydia
   " aflange, med kileformet grund hybrida
7. Bægerbladene 1-ribbede, mest hindeagtige ..... confusa
   " 3-7-ribbede, mest urteagtige 8.
8. Bægerbladene tydeligt 3-ribbede ..... 9.
   " med 5-7 ribber, i det mindste forneden 13.
9. Bægerbladene butte og m.m. aflange ..... wettsteinii
   " spidse og lancetformede 10.
10. Bladene oftest rette, stive og m.m. stikkende ..... 11.
    " " krumme, bløde, ikke " 12.
11. Nedre bladfæster tydeligt opsvulmede ..... juniperina
    " " ikke " pichleri
12. Kronbladene butte. Kvastene med over 15 blomster ... verna
    " mest spidse. Under 15 blom. i kvastene attica
13. Tæt pudeformet. Stængler 1-2cm, mest 1-blomstrede stellata
    Tueformet. Stænglerne 2-20cm, med 1-mange blomster recurva

Minuartia hamata (Hausskn.& Bornm.) Mattf. Hagenorel. 2½-10cm. Bladene med bred grund, bredt hindekantede og randhårede. Blomsterne i hoveder. Kronen meget lille. 850-1800m. sIV-VI.

M. globulosa (Labill.) Sch.& Th. Kuglenorel. 6-25cm. Tæt kirteldunet, ofte lillaanløben. Nøgler af kortstilkede blomster. Kronen under 1/3 x bægeret. 0-900m. IV-VI.

M. mediterranea (Link) K.Maly Dusknorel. 3-10(-15)cm. Glat, eller med kirtlet kvast. Ingen krone. Kapslen mest kortere end bægeret. 0-1200m. sIV-VI.

M. mesogitana (Boiss.) Hand.-Mazz. 2-17cm. Ofte lillaanløben. Kirteldunet undtagen nederst. Kvasten meget åben. 200-1400m.
ssp. mesogitana: Krone og kapsel 1-1¼ x bægeret. sIV-fVI.
ssp. velenovskyi (Rohlena) McNeill: Kronen indtil ¾ x bægeret. Kapslen 1¼-1¾ x bægeret. sIV-VI.

Minuartia lydia (Boiss.) Bornm. -7cm. Glat, ihvertfald forneden, ofte helt lillaanløben. Bægeret ofte med mørklilla spids. IV-V.

M. hybrida (Vill.) Schischkin Tyndbladet norel. 5-25cm. Helt glat eller lidt kirteldunet på bægeret. Kvasten åben. 0-1200m. IV-VI.

M. confusa (Boiss.) Maire & Petitm. (M. trichocalycina) Udstrakt norel. 2-10cm. Mest udstrakt. Stænglerne med 1-6 tætte, kortstilkede nøgler. Bægerbladene ofte krumspidsede. 1800-2400m. VI-VIII.

M. wettsteinii Mattf. ssp. parnonia Kamari 6-18cm. Golde skuds blade knippestillede, lidt kødede, trekantede. Åben, fåblomstret kvast. Kronen lidt længere end bægeret. 700m. Markkanter. VI. Parnons østside: 1 km uden for Paleokhori mod Hag.Vassilios.

M. juniperina (L.) Maire & Petitm. Stikkende norel. 6-25cm. Bladene 8-28mm, 1- eller utydeligt 3-ribbede. Blomsterstilke m.m. oprette. Kronen ca. 1½ x bægeret. 1200-2350m. VI-mVIII. TA,KY,KH.

M. pichleri (Boiss.) Maire & Petitm. 3-8cm. Nedre blade 5-15mm, tydeligt 3-ribbede hele vejen. Kronen næsten 2 x bægeret. 400-1300(-1700)m. mIV-VII. TA (Langada-kløften), PR (lille kløft nær Leonidion nær Mon.Elanos; Madari-toppens nedre skrænter).

M. verna (L.) Hiern ssp. collina (Neilr.) Domin Vårnorel. 4-24 cm. Stænglen med bladknipper i bladhjørnerne. Kvasten med over (10-)15 blomster. 100-1800m. sV-mVIII.

M. attica (Boiss.& Spr.) Vierh. ssp. attica Nær foregående. Stænglen med bladknipper. Kvasten mest med under 15 blomster. 0-2100m. V-VIII.

M. stellata (Clarke) Maire & Petitm. Stjærnenorel. Danner hårde og tætte, lysegrønne puder. De enkelte stængler i puden søjleformede. 1500-2400m. mVI-mVIII. OL,KY,KH,ER, før TA.

M. recurva (All.) Sch.& Th. ssp. condensata (Presl) Greuter & Burdet (ssp. juressi) Krumbladet norel. 5-7cm. Mange golde skud med tætte knipper af 3-6mm lange blade, ofte krumme. Hele planten ofte lillaanløben. 1300-2500m. VI-mVIII. TA.

Rhodalsine geniculata (Poiret) F.N.Williams (Minuartia g.) Rosennorel. 5-15(-30)cm. Liggende-opstigende, kirteldunet flerårig. Bladene 10-15mm, hønsetarmsagtige. Blomsterne hen ad Markhindeknæs, hvide eller lyserøde. Kystnær. III-VII. Aigina, Nesos Moni.

Bufonia stricta (Sm.) Gürke ssp. stricta Krum sivblomst. 6-20cm. Glat, sivagtig flerårig. Bladene sylformede, ofte tiltrykte. 4 lidt uens bægerblade. Kronen lidt kortere end de indre bægerblade. 1500-2100m. VI-VII. PR.

Stellaria media (L.) Vill. Alm. fuglegræs. Stænglen ensidigt håret foroven. Mest med krone. Frøene 0,9-1,3mm, mørkt rødbrune.

S. pallida (Dum.) Piré Blegt fuglegræs. Stænglen ensidigt håret foroven. Mest uden krone. Frøene 0,6-0,9mm, lysebrune. III-V.

S. cupaniana (Jordan & Fourr.) Béguinot Kirtelfuglegræs. Stænglen trindt kirtelhåret foroven. Kronen mest lidt længere end bægeret. (5-)10 støvdragere. 0-1700m. III-V.

Holosteum umbellatum L. Skærmarve. 5-20cm. Enårig. Blågrøn forneden. 2-4 par stængelblade. Med grundroset. 4-10 uens skærmstilke, der nedbøjes efter blomstringen. 0-2100m. III-VI. TA,PN m.m.

Cerastium. Hønsetarm.

1. Flerårig ..... 2.
   Enårig 4.
2. Kronen lig eller lidt kortere end bægeret ..... fontanum
   " tydeligt længere end bægeret 3.
3. Hele planten samt bægeret tæt hvidfiltet ..... candidissimum
   Bægeret ikke tæt hvidfiltet banaticum

4. Kronen under ½ x bægeret ..... comatum
" over ½ x " 5.
5. Nedre bægerhår lange og udstående, 2-2½mm ..... illyricum
Bægerhårene kortere 6.
6. Blomsterstilkene trådformede, meget længere end bægeret pedunculare
Blomsterstilkene højst 2 x bægeret 7.
7. Bægerbladenes spids med lange, ukirtlede, fremadrettede hår 8.
" " uden sådanne hår 9.
8. Blomsterstilkene højst af bægerets længde ..... glomeratum
" længere end bægeret brachypetalum
9. Støttebladene mindst 1/3 hindekantede ..... semidecandrum
" under 1/3 " 10.
10. Kapslen 16-24mm ..... dichotomum
" 6-7mm glutinosum

Cerastium candidissimum Correns Krumbladet hønsetarm. 10-30cm. Stængelblade 16-22mm, rette eller krumme. Støtteblade butte, med hætteformet spids og hindekantede. 1000-2300m. mV-sVIII. Udbredt.

C. banaticum (Rochel) Steudel ssp. speciosum (Boiss.) Jalas Knudret hønsetarm. 10-30cm. Stængelbladene indtil 25x5mm. Stænglen dunet til halvglat. Bladfæsterne m.m. fortykkede. VI-VIII.

C. fontanum Baumg. ssp. vulgare (Hartman) Greuter & Burdet Alm. hønsetarm. 1000-2100m. V-VIII.

C. illyricum Ard. ssp. brachiatum (Lonsing) Jalas Lådden hønsetarm. 5-30cm. Stængel og blomsterstilke med tiltrykte, nedadrettede hår. Urteagtige støtteblade. 400-1400m. sIII-VI.Udbredt.

C. comatum Desv. 2-10cm. Blomsterstilkene med nedadrettede hår. Bægeret tæt langhåret. Urteagtige støtteblade. Kapslen uden tænder. 0-1300m. III-V.

C. pedunculare Bory & Chaub. 8-30cm. Foroven med nedad tiltrykte hår. Støttebladene små, urteagtige, langt randhårede. Bægeret 6-8mm, bredt hindekantet, kort tiltrykt håret. 400-1000m. IV-V. SV-Peloponnes indtil TA, 1 fund fra PR.

C. brachypetalum Pers. ssp. roeseri (Boiss.& Heldr.) Nyman Stivhåret hønsetarm. 1000-2400m. V-mVIII. Udbredt i bjærgene.

C. glomeratum Thuill. Opret hønsetarm. 0-1100m. III-fVI. Udbr.

C. semidecandrum L. Femhannet hønsetarm. 0-1100m. III-IV.

C. glutinosum Fries Klæbrig hønsetarm. 0-1800m. III-V.

C. dichotomum L. Gaffelhønsetarm. 8-20cm. Mellemste stængelblade 12-25mm. Støttebladene helt urteagtige, bladlignende. Bægeret 7-10mm. Kronen 6-7mm, kort kløvet. 100-1100m. sIII-fV. 2 fund.

Moenchia. Brodbæger. Vækst som enårige hønsetarme. Bægeret bredt hindekantet. Helt glatte og ofte blågrønne.

M. graeca Boiss.& Heldr. Græsk brodbæger. 4-15cm. 1-5 blomster. Kronen ca. 2/3 x bægeret. Kapslen ca. 2/3 x bægeret. Frugtstilkene fortykkede foroven. 0-1200m. sIII-fVI.

M. mantica (L.) Bartl. Femtalsbrodbæger. (10-)15-30cm. Mest 4-12 blomster. Kronen 1½-2 x bægeret. Kapslen lidt kortere end bægeret. Frugtstilkene ikke fortykkede øverst. 0-1600m. IV-VI.

Sagina procumbens L. Alm. firling. Flerårig. 800-2100m. V-VIII.

S. apetala Ard. Kronløs firling. Enårig. Bladene med lang brod. Bægeret mest kirteldunet. 0-1000m. III-V.

S. maritima G.Don Strandfirling. Enårig. Bladene uden brod. Bægeret mest glat. 0-500m. III-V.

Scleranthus perennis L. Flerårig knavel. (2-)flerårig. Bægeret but og bredt hindekantet. 2 underarter:

ssp. marginatus (Guss.) Nyman: Frugtbægerblade mest 2-2½mm. Stænglerne grønne, fågrenede, 3-10cm. 1300-2600m. V-VIII. ER,PR.
ssp. dichotomus (Schur) Nyman: Frugtbægerblade mest 3-3½mm. Stænglerne gaffelgrenede, lilla, 10-25cm. 20-1200. IV-VIII. PR.

Scleranthus annuus L. ssp. polycarpos (L.) Thell. Bakkeknavel. Enårig. Bægerbladene ens. 400-1900m. V-VII. PR.

S. verticillatus Tausch Krogknavel. 3-10cm. Enårig. Bægerbladene m.m. uens, med indadbøjet spids. 200-1600m. IV-VI.

Corrigiola litoralis L. Skorem. 10-25cm. Mangestænglet, liggende 1-2-årig. Glat med grågrønne, ikke kødede, spatelformede blade på 10-15mm. Små blomster i endestillede nøgler. Bægeret hvidkantet, ca. 1mm. Hvid krone. 0-1850m. IV-VIII.

Paronychia. Negleurt. Stærktgrenede urter med blomster i nøgler, med sølvhvide, hindeagtige, ofte meget iøjnefaldende støtteblade.

1. Enårig. Højbladene meget kortere end blomsterne ..... echinulata
   Flerårige. Højbladene lidt eller meget længere end blomst. 2.
2. Højbladene skjuler næppe blomsterne ..... macrosepala
   " " blomsterne helt 3.
3. Bladene med en kort, men tydelig brod ..... argentea
   " uden nogen brod 4.
4. 4 fodflige ved hvert bladfæste ..... capitata
   2 " " " " 5.
5. Højbladene butte. Bladene taglagte ..... macedonica
   " spidse. " ikke taglagte albanica

Paronychia echinulata Chater Småpigget negleurt. 5-15cm. Opret - opstigende. Bladene finttandede, ofte rødlige, blegt hindekantede. Bægeret med hætteformet spids og brod. 0-400m. III-V.

P. argentea Lam. Sølvnegleurt. 3-40cm. Blomsternøglerne 10-15mm brede, aksel- og endestillede. Bægerbladene 2½-3mm, hætteformede med en brod på ½-¾mm. 50-250m. V-VII.

P. macedonica Chaudhri 5-12cm. Bladene ofte krumme, 2-5x1-1½mm. Mange endestillede, 8-13mm brede blomsternøgler. 700-2300m. sV-VIII. PR,KH.

P. albanica Chaudhri ssp. graeca Chaudhri 3½-10cm. Bladene ikke krumme, 2½-6x1½-2¾mm. Mange endestillede, 13-15mm brede nøgler. 800-2500m. sV-VIII. TA,PR,ME,KY,KH.

P. capitata (L.) Lam. Seglbladet negleurt. 5-15cm. Bladene 3-13 mm, ru-hårede på begge sider og stærkt randhårede, ofte lidt kølede og m.m. krumme. Bægerblade meget uens. 50-600m. IV-VI.Ø-Pel.

P. macrosepala Boiss. 2-10cm. Bladene grågrønne, tæt tiltrykt dunede. Nøglerne 7-12mm brede, tætstillede og ofte sammenflydende. Bægerbladene meget uens. 0-800m. IV-VI. Ø- og især NØ-Pelop.

Herniaria. Brudurt.

1. Bladene m.m. glatte på fladerne ..... parnassica
   " hårede på begge sider i hvert fald som unge 2.
2. Bladene 3-5 x så lange som brede. Flerårig ..... incana
   " 1½-3 x så " " " . 1-2-årige 3.
3. Bægerhårene 0,3-0,5mm, ofte med krog. Håret underbæger cinerea
   Bægerhårene 0,1-0,3mm, uden krog. M.m. glat underbæger 4.
4. Bægeret med længere hår på spidserne ..... hirsuta
   " ret ensartet behåret micrantha

Herniaria parnassica Boiss. Krumhåret brudurt. 5-20cm. Flerårig. Stænglerne svagt grenede. Bladene 1½-2 x så lange som brede. Fodfligene laset-frynsede. Kortstilkede blomsternøgler. 2 ssp.:
ssp. parnassica: Stængelhårene ganske små, nedadrettede eller krusede. 1200-2600m. sV-VIII. TA,KY,KH,ER.
ssp. cretica Chaudhri: Stængelhårene udstående eller svagt krummede. 900-2100m. V-VII. TA.

Herniaria micrantha Jackson & Turrill -12cm. Bægerets hår 0,2-0,3mm. Frugten lidt længere end bægeret. Støvfanget siddende. 400-1300m. sIV-fVII. ME.

H. incana Lam. Grå brudurt. -30cm. Fodfligene hårede på ydersiden. Bægerbladene 1,0-1,2mm, tydeligt hvidkantede; hårene på spidserne er kortere end de øvrige hår. 0-1600m. sV-mVIII.

H. hirsuta L. Håret brudurt. -20cm. Grågrøn. Bægerets hår 0,1-0,2mm. Bægerbladene 0,6-0,75mm. Støvfanget m.m. siddende.VI-VIII.

H. cinerea DC. Kroghåret brudurt. 0-800m. IV-VI.

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. Mangefrø. 2-15cm. Mest enårig og mest stærktgrenet. Opret. Bladene modsatte eller 4 i krans, elliptiske. Mange små, endestillede blomster med bæger på $1\frac{3}{4}$-$2\frac{1}{2}$ mm og en mindre, klar krone. 0-800m. IV-VI.

Spergula arvensis L. Alm. spergel. Bladundersiden furet. III-V.

S. pentandra L. Femhannet spergel. 5-30cm. Bladundersiden ikke furet. Øverste stængelled indtil 1/3 x hele planten. Frøene med en skinnende, hvid vinge af frøets bredde. 0-1000m. III-V.

Spergularia. Hindeknæ.

1. Flerårig. Kapslen 7-9mm, ofte 2 x bægeret ..... media
   1-2-årig. " $1\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}$mm, ikke meget længere end bægeret 2.
2. Unge skuds fodflige $\frac{1}{2}$ sammenvoksede ..... marina
   " " " mindre sammenvoksede 3.
3. Kvastene uden støtteblade, med hårfine grene ..... diandra
   " med " 4.
4. Kronen med hvid grund, lyserød eller hvid yderst .. bocconei
   " helt lyserød rubra

Spergularia media (L.) Presl (S. maritima) Vingefrøet hindeknæ.

S. marina (L.) Griseb. (S. salina) Kødet hindeknæ. IV-VII.

S. diandra (Guss.) Boiss. Trådhindeknæ. 3-10(-30)cm. Tynde, glatte stængler. Bladene $\frac{1}{2}$-1mm tykke. Krone og bæger 2-3mm. Stærktgrenet blomsterstand. 0-10m. IV-VI. Aigina.

S. rubra (L.) Presl Markhindeknæ. 0-1900m. IV-VIII.

S. bocconei (Scheele) Asch.& Gr. Hvidt hindeknæ. 5-25cm. Kvast og bæger kirteldunede. 0(-500)m. IV-VI.

Telephium imperati L. ssp. orientale (Boiss.) Nyman Murtunge. 10-20cm. Glat, blågrøn flerårig med mange, m.m. liggende, ugrenede skud. Bladene 3-15x2-5mm. Tætte, endestillede kvaste. Bæger og den hvide krone 4-7mm. Bægeret hvidrandet. 1400-2400m. V-VII.

Agrostemma githago L. Klinte. 0-1200m. IV-VII.

Lychnis atropurpurea (Griseb.) Nyman Mørk tjærenellike. -75cm. Ligner Tjærenellike, men kronen mørkt rødlilla og bægeret ellipsoidisk. 600-1800m. V-VII. TA,PR.

Silene. Limurt.

1. 5 grifler. Tvebo ..... latifolia
   3 " 2.
2. 2-flerårig ..... 3.
   Enårig 26.
3. Bægeret ca. 20-året forneden, tæt netåret foroven ..... 4.
   " (5-)10-året i nedre halvdel eller utydeligt året 5.
4. Tæt pudeformet. Bægeret kirteldunet ..... auriculata
   Ikke " . " glat vulgaris
5. Bladranden med korte, tætte, tilbagebøjede hår ..... 6.
   " uden tilbagebøjede hår 7.
6. Bægeret kirteldunet ..... fruticosa
   " glat radicosa

7. Kronbladene 4-tandede. Bægeret 5-8mm ..... pusilla
" ikke 4-tandede 8.
8. Bægeret glat, højst med randhårede tænder ..... 9.
" håret 18.
9. Kapselstilken indtil 4mm ..... 10.
" over 4mm 15.
10. Bladene linje- til linje-lancetformede ..... 11.
" bredere, lancetformede til rundagtige 12.
11. Bægeret mest 8-15mm. Frøene m.m. jævne ..... saxifraga
" 7-8mm. Frøene knudrede taygetea
12. Bladene dunede ..... 13.
" ofte randhårede, ellers glatte 14.
13. Blomsterne nikkende. Linjeformede kronflige .. longipetala
" ej nikkende. Brede kronflige goulimyi
14. Bladene lancet-spatelformede, 2mm brede ... conglomeratica
" omvendt æg- til ægformede caesia
15. Mange golde skud under blomstringen ..... 16.
0-få " " " " 22.
16. Modne kapsel rager helt ud af bægeret ..... parnassica
" " m.m. omgivet af bægeret 17.
17. Bægeret 25-42mm. Kapselstilken 12-27mm ..... bupleuroides
" 8-15mm. " indtil 7mm saxifraga
18. Blomsterne i oftest 2 ensidige svikler ..... dichotoma
" ikke i ensidige svikler 19.
19. Bægeret med tilspidset grund ..... viridiflora
" " afskåret grund 20.
20. Nedre bladfæster opsvulmede og hvidlige ..... spinescens
" " ikke opsvulmede 21.
21. Bægeret fint dunet-ru foroven og -neden, ofte med m.m. glat midte ..... 22.
Bægeret ensartet behåret 23.
22. Bægergrunden omslutter kapselstilken tæt ..... multicaulis
" bredt rørformet linoides
23. Engangsblomstrende. Uden sideskud eller siderosetter gigantea
Med sideskud eller siderosetter 24.
24. Blomsterne i tætte nøgler ..... congesta
Blomsterstanden åben 25.
25. Bægeret kirtelhåret ..... italica
" med m.m. siddende kirtler sieberi
26. Bægeret glat ..... 27.
" dunet til låddent 36.
27. Blomsterne i en dobbeltsvikkel ..... 28.
Blomsterstanden anderledes 29.
28. Blomsterne opret-udstående under blomstringen ..... graeca
" nikkende under blomstringen nutabunda
29. Kapselstilken 6-8mm ..... 30.
" højst 4mm 31.
30. Kronskællene 3-5mm, trådformet frynsede ..... echinosperma
" 1½-2mm, helrandede eller finttand. corinthiaca
31. Kronbladets plade indtil ½ delt ..... 32.
" " næsten helt delt 34.
32. Blomsterstilkene meget kortere end bægeret ..... muscipula
" længere end bægeret 33.
33. Kronens plade 1/3-1/2 delt. Kapselstilken 1-2½mm cretica
" " udrandet. Kapselstilken 3-4mm .. tenuiflora
34. Bægeret bredest i nedre 1/3 ..... reinholdii
" " midtpå 35.
35. Kronens plade ca. 2mm, hvid til blegrød ..... behen
" " 3-4mm, lyst rødlilla holzmannii
36. Bægeret med ca. 30 ugrenede ribber ..... 37.
" " 10 ribber 39.
37. Bægeret 10-13mm, med afrundet grund i frugt ..... sartorii
" 15-18mm, " afskåret " " " 38.

38. Kronens plade 4-6mm, med bred bugt med lille tak i conica
" " 7-9mm, med snæver bugt uden tak subconica
39. Blomsterne i svikler ..... 40.
" i kvaste 46.
40. Kapselstilken 4-8mm ..... 41.
" ½-3mm 43.
41. Bægeret med kirtelhår ..... bellidifolia
" uden " 42.
42. Med lange, udstående børster, især forneden ..... trinervia
Uden " " " colorata
43. Kronbladene helrandede til svagt lappede ..... 44.
" kløvede 45.
44. Bægeret dunet, ikke indsnævret ..... sedoides
" langt stivhåret, indsnævret foroven gallica
45. Bægerribberne fremtrædende og ru ..... remotiflora
" ikke fremtrædende, hårede nocturna
46. Bægerribberne fremtrædende. Kronens plade 2/3 delt nicaeensis
Bægerribberne svage. Kronen hel eller udrandet 47.
47. Kronens plade med en mørk plet ved grunden ..... sedoides
" " uplettet 48.
48. Støvknapperne lyslilla. Kapslen 6-10mm ..... integripetala
" hvide eller bleglilla. Kapslen 4-5mm laconica

Silene latifolia Poiret (S. alba) Aftenpragtstjærne. sIV-VIII.

S. viridiflora L. Grønblomstret limurt. 30-80cm. Vækst som Nikkende limurt, med grønlighvide kronblade. Kun toppen med kirtler. Støvdragerne ofte længere end kronen. 300-1800m. VI-VIII.

S. fruticosa L. Buskagtig limurt. 5-30cm. Gulgrøn halvbusk. Bladene glatte bortset fra randhårene, i duske for enden af grene. Tæt kort dusk. Bægeret 20-25mm. 0-600m. sIV-VI. Sydkysten.

S. italica (L.) Pers. Italiensk limurt. 20-50cm. Toppen bred og ret åben. Kronen hvidlig til rødlig med grønlig underside, 2/3 kløvet. Med udløberagtige sideskud. IV-VII. 2 underarter:
ssp. italica: Rosetbladene mest grønne. Bægeret 15-22mm. Kapselstilken 5-10mm. 0-500m.
ssp. peloponnesiaca Greuter: Rosetbladene ofte gradunede. Bægeret 9-15mm. Kapselstilken 3-5mm. (300-)500-1800m. Udbredt.

S. sieberi Fenzl 10-40cm. Med korte sideskud. Planten tæt gradunet forneden. 2-6(-8) blomster. Bægeret 19-22mm. Kapselstilken 8-10mm. Kronen som hos foregående. 100-1800m. V-VII.

S. spinescens Sm. Tornlimurt. 20-50cm. Halvbusk. Tæt gradunet forneden. Stænglen med retvinklet udstående sidegrene, der til sidst bliver noget tornagtige. 0-1000m. sIV-VI. NØ-Pelop.

S. goulimyi Turrill 10-30cm. Ukirtlet halvbusk. Bægeret 11-14mm. Kapselstilken 3-4mm. Kronen klart lyserød ovenpå, blegere og lillaåret nedenunder. 300-1300m. IV-VI. S-Pel: Messinia - Parnon.

S. gigantea (L.) L. ssp. hellenica Greuter 20-150cm. Rosetbladene mest visne under blomstringen. Blomsterne i nøgler eller kranse på 6-10. Bægeret 7-10mm. Kronen gullig. 200-1000m. IV-mVII.

S. longipetala Vent. Langkronet limurt. 40-60cm. Toppen bredt kegleformet og symmetrisk. Bægeret 8-12mm, med 10 hindeagtige bånd forneden, tæt netåret foroven. 0-400m. III-VI.

S. radicosa Boiss.& Heldr. 10-60cm. Bladstilken tæt, langt randhåret. Bægeret 9-14mm, med 10 brede, kødede ribber med smalle furer imellem. Kronens underside brungrøn. 500-2100m. VI-fIX.

S. bupleuroides L. ssp. staticifolia (Sm.) Chowd. Langblomstret limurt. 60-80cm. Glat og blågrøn. 1-6 blomster. Nedre blade smalle. Bægeret hindeagtigt mellem ribberne. 900-2100m. TA,PR,KY,KH.

S. auriculata Sm. Græsk pragtstjærne. 5-30cm. Grundbladene lan-

cetformede og spidse, tæt randhårede. 1-5 blomster. Bægeret 13-17 mm. Kronen mest hvid. 1600-2400m. sVI-sVIII. OL,KY,KH,ER.

Silene caesia Sm. Blågrøn limurt. 15-35cm. M.m. glat, mest mørk blå- til grågrøn, noget kødet. Bægeret kun svagt opblæst i blomst, 9-13mm. Kronen hvid til rød. 1000-2600m. mV-VIII. TA,KH,PN.

S. vulgaris (Moench) Garcke Blæresmælde. 0-2700m. sIII-IX. 5ssp:
ssp. macrocarpa Turrill: Med lange, underjordiske udløbere. Bladene 4-7cm x 7-16mm. Bægeret 15-19mm. 0-1000m. sIII-V.
ssp. suffrutescens Greuter: Halvbuskagtig, forveddet et stykke opad. Modne bæger 18-21mm. Bladene mindst 3 x så lange som brede.
ssp. megalosperma (Sart.) Hayek: Halvbuskagtig. Modne bæger 13-16 mm. Bladene 2-3 x så lange som brede; eller under 2½cm. -1400m.
ssp. prostrata (Gaudin) Sch.& Th.: Bladene små, sjældent over 3cm. Sjældent over 5 blomster/stængel. Bægeret mest 14-16mm. 1600-2700 m. VII-IX.
ssp. bosniaca (G.Beck) Greuter & al.: Bladene mindst 3cm, 1½-3 x så lange som brede (indtil 10x6cm). Bægeret 13-19mm. 400-1800m.

S. congesta Sm. 20-60cm. Planten dunet forneden. Blomsterne mest i endestillede nøgler, ellers med få sidegrene. Bægeret 7-11mm. Støvdragerne ofte længere end kronen. 20-1600m. VI-X.

S. saxifraga L. Stenlimurt. 8-35cm. Bladene 0,5-1,2mm brede. Stænglerne 1(2)-blomstrede. Kronen hvid til blegrød med brungrøn underside. Kapslen 6-12mm. 1250-2800m. VII-VIII. ?

S. taygetea Hal. 8-12cm. Bladene 0,5-1,2mm brede, 4-8mm lange. Stænglerne 1(2)-blomstrede. Kapslen 5½-7mm. 2000-2250m.VII-VIII. TA.

S. conglomeratica Melzh. 5-10cm. Tæppedannende med tynde, liggende, forveddede stængler. Bladene faste, længevarende. Bægeret 9-11 mm. 800-900m. VI-VIII. Kalkklipper nær Mega Spileo klosteret.

S. parnassica Boiss.& Spr. ssp. parnassica 10-40cm. Bladene jævnt fordelte, de større 1-2mm brede. Stænglerne 1-blomstrede. Modne kapselstilk 5-10mm. Kronens plade med øret grund. 1300-2400 m. VI-VIII. PR,ME,KY,ER.

S. multicaulis Guss. ssp. multicaulis Mangestænglet limurt. 5-40 cm. Nedre blade væk under blomstringen. De andre hvidt randhårede ved grunden. Bægeret 12-18mm. 800-2500m. sV-IX. TA,PR,KH.

S. pusilla W.& K. ssp. albanica (K.Malý) Greuter & Burdet Strålefrø. 5-20cm. Tæppedannende med rodslående skud. Bladene 1-2mm brede. Kronen mest lyserød. 1000-2500m. VI-VIII. TA,KH.

S. echinosperma Boiss.& Heldr. 15-80cm. Stænglen stærktgrenet. Blomsterne i mange 2-4 x grenede kvaste, stilkene oprette, mest 1-3cm. Kronfligene stjærneformet udstående. 350-1300m. V-VII + sIX-X. TA (Parori-kløften nær Mistra).

S. corinthiaca Boiss.& Heldr. 10-40cm. Nær den foregående. Stængelbladene mest linje- til trådformede. Kronskællene med ca. 4 brodagtige tænder. 0-700m. sIV-VI. Udbredt langs østkysten.

S. sedoides Poiret Stenurtslimurt. 5-20cm. Oftest rigtgrenet, rødlig og stærkt klæbrig. Bladene kødede. Blomsterstilkene lange, ofte skarpt opadbøjede øverst. Mest kystnær. sIII-VI. 2 ssp.:
ssp. sedoides: 1-4(-12)cm. Kronens plade 1-2(-3)mm, hvid til blegrød. Støvknapperne indesluttede i kronrøret.
ssp. runemarkii Oxelman: 2-15(-20)cm. Kronens plade 3-4mm, klart lyserød. Støvknapperne lidt fremragende. IV-V. Ø-Pelop. 0-10m.

S. laconica Boiss.& Orph. 3-12cm. Nederste blade ukirtlede, resten af planten kirtlet. Bægeret 8-11mm, smalt kølleformet under blomstringen. Kapslen 4-5mm. Kronen blegrød. 0-900m. III-VI. Øst for Parnon.

S. integripetala Bory & Chaub. Helkronet limurt. Behåringen som

hos foregående. Bægeret cylindrisk i blomst, kølleformet i frugt. 2 underarter:
ssp. integripetala: 5-40cm. Bægeret 11-19mm. Kronens plade 6-9mm, klart rød. Kapslen 6-10mm. 0-1900m. sIII-VI. Alm. på Syd-Pelop.
ssp. elaphonesiaca Oxelman: 4-10cm. Bægeret 8-10mm. Kronens plade 2½-4mm, blegrød. Kapslen 6-7mm. 250m. III-IV. Elafonisos-øen.

Silene muscipula L. Fluefangerlimurt. 20-60cm. Grøn og glat. Blomsterne i en regelmæssig kvast. Bægeret 12-16mm. Kronskællene parvist sammenvoksede. Kronen lyserød. 0-500m. IV. Aigina.

S. cretica L. Stilklimurt. 10-60cm. Grøn. 1-7 blomster på 3-7cm lange stilke. Bægeret 10-12mm, tenformet i blomst. Kronen lyserød. Kapslen bredest over grunden. 0-1200m. sIII-fVI. S-Pelop.

S. tenuiflora Guss. Som den foregående, men blomsterstilkene 1½-4cm. Bægeret 12-15mm. Kronen mørkere. Kapslen bredest lige under midten. 0-1300m. sIV-VI.

S. behen L. Klokkelimurt. 10-60cm. Helt glat og blågrøn. Bægeret hvidligt, rødligribbet øverst, med hvidrandede tænder. Kronen hvidlig eller blegrød; pladen helt kløvet. 0-800m. sIII-V.

S. holzmannii Boiss. Ligner den foregående, men kronens plade kun lidt over ½ kløvet. Ca. 0m. IV-V. NØ-lige småskær.

S. reinholdii Heldr. Ligner S. behen. Bægeret hindeagtigt i nedre 1/3, ellers urteagtigt og tæt netåret. 0-750m. IV-fVI.

S. graeca Boiss.& Spr. 10-50cm. Glat, blågrøn, ikke klæbrig. Bægeret 12-15mm, rørformet i blomst, tenformet i frugt. Kronens negle danner et smalt rør 1-4mm udover bægeret. 0-1200m. IV-VII.

S. nutabunda Greuter Nær graeca, men bægeret 9-11(8-13)mm. Kronens negle m.m. lig bægeret. 0-400m. IV-VI. V- og S-Pelop.

S. dichotoma Ehrh. Gaffellimurt. 30-80cm. Kruset-dunet til lådden over det hele. 2-fårig. Blomsterstilkene 0-2mm, skarpt nedbøjede i blomst, rette og fortykkede i frugt. 0-1000m. IV-fVIII.

S. remotiflora Vis. 40-80cm. Kvasten 1-3 x gaffelgrenet og [illegible] fjærnblomstret. Bægerribberne med kegleformede eller tykgrundede hår; tænderne med en dusk lange børster. 300-1000m. V-VI.

S. trinervia Seb.& Mauri (S. gallinyi) Stivhåret limurt. 20-60 cm. Dobbelt behåring af korte og lange børster. Bægeret tiltrykt aksen. Ribbehårene tykgrundede. 0-1200m. sV-VIII.

S. colorata Poiret Vingefrøet limurt. 10-40cm. Stænglen dunet af nedadrettede hår. Kronen iøjnefaldende lyserød. Frøene med 2 bølgede vinger langs randen. 0-700m. III-VI.

S. nicaeensis All. Sandlimurt. 10-40cm. Hele planten klæbrigtlådden, m.m. sanddækket. Kvasten usymmetrisk. Kronen hvid med grønlig underside. 0-50m. IV. Messinia, NV-Pelop.

S. nocturna L. Akslimurt. 5-50cm. Dunet; undertiden klæbrig foroven. Tiltrykte, kortstilkede blomster. Kronen blegrød, undertiden indesluttet. 0-700m. IV-VI.

S. bellidifolia Jacq. Ensidig limurt. 30-60cm. Bladene spredt stivhårede. Blomsterne m.m. ensidige i 1-2 tætte klaser. Bægeret ofte ret langt uldhåret. 0-300m. sIII-fVI.

S. gallica L. Fransk limurt. 10-50cm. Sviklen altid ugrenet. 3-dobbelt behåring: lange udstående, kirtel- og korte nedadrettede hår. Kronen mest hvid eller blegrød. 0-600m. III-VI.

S. sartorii Boiss.& Heldr. 10-25cm. Blomsterstilkene 1-2(-3½) cm. Bægertænderne hindekantede. Kapselstilken ca. ½mm. Bægeret m.m. valseformet i blomst, pæreformet i frugt. 0-20m. Mest i klitter. sIII-VI. Argolis.

S. conica L. Keglelimurt. 5-30cm. Mest ukirtlet. Frugtstilke

5-10mm. Kronen lyserød. 0-1900m. IV-VI.

Silene subconica Friv. Ligner den foregående, men altid kirteldunet foroven. Blomsterstilke 6-25mm. Kronen blegrød eller næsten hvid. 0-1700m. IV-VI.

S. linoides Otth (S. linifolia) 20-80cm. Bægeret 10-17mm, rut over det hele, omend kun svagt midtpå. Blomsterne i en uregelmæssig dusk. 200-700m. V-VI + X.

Drypis spinosa L. Tornnellike. 6-25cm. Tornpudeplante. Firkantet stængel. Spidse, linjeformede blade. Støttebladene med 5-9 torne. Endestillet, sammentrængt kvast. Kronen hvid eller blegrød. 800-2500m. VI-VIII. TA,KY,KH,ER,PN.

Gypsophila nana Chaub.& Bory Dværggipsurt. 4-10cm. Tueformet, m.m. kirteldunet flerårig. Bladene 7-25x1½-5mm. Kvastene med 3-10 mest blegrøde blomster. Bægeret 3-4½mm, klokkeformet og svagt 5-året. Kronen 2-2½ x bægeret. 1600-2400m. sV-mVIII. TA,PR,KH.

Bolanthus laconicus (Boiss.) Barkoudah Småblomstret ribberør. 10-30cm. Blådugget-fintdunet urt eller halvbusk. Tætte, endestillede, langstilkede, 3-12-blomstrede nøgler. Bægeret 2½-3½mm. 350-1200(-1650)m. VI-VII. TA,PR.

B. fruticulosus (Bory & Chaub.) Barkoudah Strandribberør. -35cm. Blådugget-fintdunet urt eller halvbusk. Blomsterne i åbne, uregelmæssige kvaste. Bægeret 4½-5½mm. Kronen hvid med lilla tværstribe. 0-100m. mIV-mVI. SØ-halvøen, Elafonisos, Kythæra.

B. chelmicus Phitos ssp. chelmicus 5-15cm. Ikke blådugget flerårig. 2-7-blomstrede, ende- og akselstillede nøgler. Bægeret 3-4 mm. Kronen hvid. 1100-1800m. VI-VII. 2 fund fra Khelmos.

Saponaria. Sæbeurt.

1. Blomsterne bleggule, i et tæt hovede ..... bellidifolia
   " røde eller hvide. Standen mere åben 2.
2. Flerårig ..... officinalis
   1-2-årig 3.
3. 25-70cm. Opret og svagt grenet ..... glutinosa
   3-30cm. Liggende til opret, stærkt grenet 4.
4. Bladene kødede, de nedre lancet- til omv. lancetf. jagelii
   " tynde, de nedre m.m. spatelformede calabrica

Saponaria bellidifolia Sm. Rosetsæbeurt. 10-25cm. Grundbladene 2½-7cm, spatelformede. 1(2) par stængelblade. Hovedet 1-3cm bredt med 1 par støtteblade. 1400-2400m. VII-mVIII. KH.

S. officinalis L. Alm. sæbeurt. 200-1800m. VI-VIII.

S. glutinosa Bieb. Klæbrig sæbeurt. 25-70cm. Kvasten en ofte tæt, halvskærmagtig top, stivhåret kirtlet. Bægeret 18-25mm, smalt og spidstandet. Blegrød krone. 500-2000m. VI-mVIII.

S. calabrica Guss. Enårig sæbeurt. 10-30cm. Liggende til opstigende. Kvasten løst topformet. Bægeret 10-12mm, kort buttandet. Kronen lyserød. 50-1500m. IV-VI.

S. jagelii Phitos & Greuter Strandsæbeurt. 3-10cm. Stænglen rødlig, opret til opstigende. Bægeret 7-10mm. Kronen lyserød med hvid grund. Sandstrand. III-IV. Elafonisos-øen.

Cyathophylla chlorifolia (Poiret) Bocquet & Strid 8-18cm. Glat, blågrøn enårig, liggende til halvt opret. Stængelbladene indtil 10mm, gennemvoksede. 2-6 blomster i endestillede hoveder. Bægeret 8-13mm. Kronen lyserød. 800-1850m. V-VI. KH: 2½km SØ og 3 km ØSØ for Zarukhla i 1700-1850ms højde.

Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert Konellike. 30-60cm. Glat enårig. Stærkt grenet kvast. Bægeret pæreformet med 5 brede vinger. Kronen lyserød, afskåret eller tolappet. sIV-VII. 0-1300m.

Petrorhagia. Knopnellike.

1. Med støtte- eller højblade ..... 2.
   Uden " " " 7.
2. Støttebladene kortere end bægeret ..... saxifraga
   " omslutter bægeret helt 3.
3. Største højblade 3-4mm brede. Flerårig ..... grandiflora
   " " mindst 4mm brede. Enårige 4.
4. Bladskederne mindst 2 x så lange som brede ..... velutina
   " højst så lange som brede 5.
5. Kronbladene 10-14mm, pladen 1,7-3,5mm bred ..... prolifera
   " 19-28mm, " 5-10mm bred 6.
6. Største højblade 18-24x11-20mm. Kronen ensfarvet .. glumacea
   " " 15-17x7½-8½mm. " mest mørkåret obcordata
7. Kronbladene udrandede. Bægertænderne aflange, butte graminea
   " hele. Bægertænderne trekantede 8.
8. Kronbladene lyserøde. 1-2-årig ..... phthiotica
   " hvide eller gullige. Flerårige 9.
9. Stænglen glat midtpå, ellers kirteldunet ..... armerioides
   " kirteldunet hele vejen illyrica

Petrorhagia illyrica (Ard.) Ball & Heyw. Rødhannet knopnellike. 10-40cm. Kronbladene hvide, ofte med rødplettet grund. Rødlilla støvknapper. Blomsterne enlige eller i knipper. 300-2000m.V-VIII. ssp. illyrica: Ribberne 1-årede. Tæt, mangeblomstret stand. ssp. taygetea (Boiss.) Ball & Heyw.: Ribberne 3-årede. Åben, fåblomstret stand. (Overgangsformer forekommer).

P. armerioides (Ser.) Ball & Heyw. -35cm. Bægerribberne stærkt 3-årede, årerne sammenløbende opad. Kronbladene hvide med 3 røde pletter ved grunden. 0-900m. V-VII.

P. phthiotica (Boiss.& Heldr.) Ball & Heyw. 3-20cm. Stænglen glat forneden, gaffelgrenet, svagt kirteldunet foroven. Ribberne 1-årede.på bægeret. 1600-2000m. KY.

P. saxifraga (L.) Link Fjældknopnellike. 5-45cm. Flerårig. Blomsterne med 4 bibægerblade. Bægerribberne 3-årede. Kronen hvid eller lyserød. 0-1600m. V-VIII.

P. graminea (Sm.) Ball & Heyw. -40cm. Flerårig med tætte bladrosetter, ofte forveddet forneden. Bægerribberne 3-årede. Kronen lyserød eller hvid med lyserøde årer. 50-700m. IX-I.

P. grandiflora Iatrou 15-45cm. 1-16 blomster i hoveder. Bægeret ca. 10mm. Kronbladene 18-22mm, hvide eller blegrøde med røde årer. 50-600m. fV-sVII. PR. Østsiden ved Mon.Elona.

P. velutina (Guss.) Ball & Heyw. (P. dubia) Skedeknopnellike. 5-40cm. Mellemste stængelled kirtlet-filtede. Bladskederne 3-7 mm. Største højblade 6-14(18)x4-10(12)mm. 0-1200m. IV-VIII.

P. prolifera (L.) Ball & Heyw. Alm. knopnellike. 10-50cm. De to yderste par højblade spidse, med brod, de indre m.m. butte. Frøene netårede, 1,3-1,9x0,8-1,2mm. 0-1200m. V-VIII.

P. glumacea (Bory & Chaub.) Ball & Heyw. 20-80cm. 4-6 højblade, alle butte. Frøene 2-3x1,3-2,2mm. 0-800m. IV-VI.

P. obcordata (Margot & Reuter) Greuter & Burdet Som glumacea, men frøene 1,0-1,8x0,8-1,5mm. 0-1000m. V-VII.

Dianthus. Nellike.

1. Busk. 8-20 yderbægerskæl ..... fruticosus
   Urter, undertiden med forveddet grund 2.
2. Kronbladene helt eller næsten helrandede ..... 3.
   " tydeligt tandede 5.
3. Kronen mørkerød ..... stenopetalus
   " hvid (eller lyserød) ovenpå 4.
4. Kronen hvid på begge sider ..... integer
   " med grønlig eller rødlig underside pallens

5. Stængel, blade og blomsterstande delvist kirteldunede ..... 6.
   Planten glat 9.
6. Blomsterstilkene ikke skjulte af støtteblade ..... diffusus
   " skjules af støtteblade 7.
7. 25-45cm. Bægeret 17-23mm ..... corymbosus
   Mest 4-25cm. Bægeret mest 10-18mm 8.
8. Kronens plade med mørkt rødlilla grund ..... tymphresteus
   " " ikke mørkplettet viscidus
9. Kronens underside gullig eller grøngul ..... 10.
   " " rød 12.
10. Enårig ..... tripunctatus
    Flerårig 11.
11. Stængelbladskederne mindst 4 x så lange som brede biflorus
    " 1½-2 x så lange som brede mercurii
12. Stænglerne 1-blomstrede ..... serratifolius
    Blomsterne 2-mange sammen 13.
13. Lav tornpudeplante. 2-4 blomster sammen ..... androsaceus
    15-60cm høj. Blomsterne i tætte hoveder 14.
14. Alle blade ½-1mm brede ..... pinifolius
    Stængelbladene 1-2½mm brede cruentus

Dianthus integer Vis. ssp. minutiflorus (Hal.) Bornm. 10-30cm. Grundbladene lidt stikkende. Stænglen mest 1-blomstret. Bægeret 8-14mm, ofte lillaanløbent. 2-4 yderbægerskæl. 1400-2300m. VII-VIII. KY,KH,ER.

D. serratifolius Sm. ssp. abbreviatus (Hal.) Strid 6-15cm. 2-4 par stængelblade. Grundbladene lidt stikkende. Bægeret 9-14mm. Kronen lyserød eller hvid, mørkere nedenunder, uregelmæssigt tandet. 1500-2300m. sV-sVII. TA,PR,KY.

D. pallens Sm. (D. monadelphus ssp. p.) Bleg nellike. 30-60cm. Bladfæsterne fortykkede. Øvre blade m.m. stråfarvede. Bægeret 18-22mm, bleggrønt. 20-1200m. sV-fVIII.

D. biflorus Sm. 15-60cm. Blomsterne 1-4(-8) sammen i kortstilkede nøgler. Bægeret 16-24mm, bleggrønt. Kronen kanelfarvet eller rødlilla ovenpå. 1000-1900m. VI-fVIII. TA,PR,KY,KH.

D. mercurii Heldr. Nær foregående. Yderbægerskællen kan nå bægertændernes grund. Bægeret 25-30mm. Kronens plade svagt håret ved grunden. 800-1200m. VII-fVIII. KY,KH.

D. tripunctatus Sm. Treplettet nellike. 15-50cm. Fortykkede bladfæster. Yderbægerskællene med en brod på 4-7mm, der når bægertændernes grund. Kronbladene skarptandede. 0-800m. V-VII.

D. corymbosus Sm. Ukirtlet forneden, kirteldunet foroven. Blomsterne i knipper på 2-6. Yderbægerskællene brat tilsmalnede i en lang stak. Kronen uprikket. 50-1400m. VI-VII.

D. viscidus Bory & Chaub. Opblæst staknellike. 10-25 (5-40)cm. Grundbladene kirteldunede. 2-7 blomster i ret tætte knipper. Yderbægerskællenes stakke lidt kortere end skællet. 400-1500m. sV-VIII. TA,PR,KY,KH.

D. tymphresteus (Boiss.& Spr.) Boiss. 4-12cm. Ofte mange, udstrakte stængler. 1-3 blomster i tætte knipper. Kronen glat. 1700-2200m. sV-fVIII. KH,ER,PN.

D. diffusus Sm. 10-30cm. Stænglen kirteldunet ihvertfald forneden. Nedre blade m.m. visne i blomst. 1(-3) blomster sammen. Kronen lyserød med grøngul underside. 0-1600m. sIV-fVII.

D. fruticosus L. ssp. occidentalis Runem. 10-30cm. Glat busk. Bladene 25-35x2-4mm, tykke til kødede. Busken danner en 20-100cm bred pude. Bægeret 20-25mm. Kronen lyserød. 0-200m. VI-IX. SV-Messinia, Mani-halvøen, Kythæra.

D. pinifolius Sm. ssp. lilacinus (Boiss.& Heldr.) Wettst. Fyrrenålsnellike. 15-45cm. Støttebladene store, dækker den unge blom-

sterstand helt. Kronen lyslilla. 800-2000m. mVI-VIII. PR,ER.

Dianthus androsaceus (Boiss.& Heldr.) Hayek Tornpudenellike. Bladene 6-11x0,6-0,9mm, stive og ret stikkende. Blomsterne næsten siddende mellem bladrosetterne. 1000-2200m. VII-VIII. TA,KY,PN (lokalt almindelig her). (Ikke set på KY i 100 år).

D. cruentus Griseb. Blodnellike. 30-60cm. Hovederne med 5-15 blomster. Bægeret oftest lillat. Kronen mørkerød, ikke eller svagt håret. 200-2100m. VI-VIII. KH.

D. stenopetalus Griseb. Smalkronet nellike. 8-40cm. Grundbladene 2-5cm x ½mm, ret stive. Små og tætte hoveder. Yderbægeret stråfarvet og bægeret rødlillat, dette 6-10mm. Kronbladene mørkerøde, under 1½mm brede. 1050-1850m. sV-mVII. PR.

Velezia rigida L. Dueurtsnellike. 10-30cm. Enårig. Planten ligner en Dueurt meget. Bægeret 10-14mm, linjeformet, ca. 10 x så langt som bredt, 5-6 x stilken. Kronbladene kløvede. 0-1200 m. sIV-mVII.

V. quadridentata Sm. Firtandet dueurtsnellike. Ligner den foregående, men bægeret smalt ellipsoidisk, 2-3 x stilken. Kronbladene firtandede. 0-700m. sIV-fVII.

NYMPHAEACEAE

Nymphaea alba L. Hvid åkande. 0-1500m. VI-IX.

CERATOPHYLLACEAE

Ceratophyllum demersum L. Tornfrøet hornblad. 0-500m. VI-IX.

RANUNCULACEAE

Helleborus cyclophyllus (A.Braun) Boiss. Græsk nyserod. 15-45 cm. Bladene med 5-9 m.m. lancetformede, savtakkede flige. Stænglen med 2-5 store, lyst gulgrønne blomster.700-1900m.III-VI.ER.

Nigella. Sortkommen. Enårige med 2-3 x fjersnitdelte blade. 5 ofte lyseblå blosterblade og 5 små honningblade. 5 delvist sammenvoksede, langgriflede bælgkapsler.

1. Støvknapperne ikke brodspidsede ..... damascena
   " med brodspids 2.
2. Honningblade og støvknapper røde ..... stricta
   Støvknapperne ikke røde 3.
3. Bælgkapslerne 2/3-4/5 sammenvoksede ..... doerfleri
   " ca. ½ sammenvoksede arvensis

Nigella arvensis L. Agersortkommen. 10-30cm. Støvknapperne lyseblå. Griflerne ca. = bælgkapslerne, disse 3-ribbede. 0-1000m. V-VI. 2 underarter:
ssp. aristata (Sm.) Nyman: Bladfligene linjeformede, m.m. stive. Med et svøb af højblade under blomsterne.
ssp. brevifolia Strid: Øvre blade med korte, aflange afsnit. Intet svøb af højblade under blomsterne. VI-VIII. Elafonisos.

N. doerfleri Vierh. Grønlig sortkommen. 5-15cm. Opstigende til opret. Blomsterne grønligblå. Støvknapperne gule. Honningbladene grønlige, blegrøde ovenpå. 0-550m. IV-V. På 2 øer.

N. stricta Strid Rødhannet sortkommen. 5-12cm. Liggende. Bælgkapslerne udadbøjede, 1/4-2/5 sammenvoksede. Klitter. IV-V. Kythæra.

N. damascena L. Jomfruen i det grønne. 20-40cm. Opret. Blomsterne med et svøb af højblade under sig. Bælgkapslerne helt sammenvoksede, opblæste og kapsellignende. 0-1200m. IV-VI.

Garidella nigellastrum L. Spinkel sortkommen. 30-50cm. Minder om Nigella, men 2(3) bælgkapsler. Blosteret 3-4mm, grønliglillat eller blåt. Honningbladene 7-5mm, 2 x blosteret, kløvede, hvide med blå pletter. 0-650m. IV-V. ?

Delphinium. Ridderspore. Riddersporer med 3 bælgkapsler.

1. Stænglen langt udstående håret ..... staphisagria
" dunet til glat 2.
2. Flerårig ..... fissum
1(-2-)årig 3.
3. Sporen ca. = det mørkeblå bloster ..... hirschfeldianum
" ca. 2-3 x det blålilla til hvidlige bloster 4.
4. Sidestillede indre blosterblade med kileformet grund. Blosteret blålillat eller skidenlillat ..... peregrinum
Sidestillede indre blosterblade rundagtige med svagt hjærteformet grund. Blosteret ofte blegt hellenicum

Delphinium fissum W.& K. Kløvet ridderspore. 30-100cm. Med rodknold. Nedre blade med rund, 5-10cm bred plade, flere gange delt. i 2-4mm brede flige. Blomsterne blålilla. 1000-1900m. KH.

D. peregrinum L. Skælfrøet ridderspore. 30-80cm. Bladene smal- og spidsfligede. Sidestillede indre blosterblade ægformede til elliptiske. Sporen indtil 2 x blosteret. 0-300m. V-VI.

D. hirschfeldianum Heldr.& Holzm. Som den foregående, men de sidestillede indre blosterblade med kvadratisk, takket plade og kort kileformet grund. Aigina.

D. hellenicum Pawł. -100cm. Stænglerne ganske spinkle. Blomsterne ofte bleglilla eller hvidlige. Sporen $2\frac{1}{2}$-3 x blosteret.

D. staphisagria L. Steffensridderspore. 30-100cm. 1(-2)-årig. Bladene med brede, ofte 3-lappede, spidse flige. Sporen 1/5-1/3 x det mørkeblå bloster. 0-700m. V-VIII.

Consolida. Ridderspore. Riddersporer med 1 bælgkapsel. Enårige.

1. Nedre støtteblade hele. Blomsterne i top ..... regalis
" " delte. Blomsterne mest i klase 2.
2. Sporen ca. 4mm ..... tuntasiana
" (8-)10-13mm 3.
3. Forbladene når blomstens grund ..... orientalis
De nedre blomsters forblade når ikke blomsten ajacis

Consolida orientalis (Gay) Schrödinger Hyacintridderspore. 30-50 cm. Sporen 10-12mm, lidt kortere end blosteret. Nedre støtteblade med 2-7 flige. Bælgkapslen med brat afsat griffel. 0-600m.V-VIII.

C. ajacis (L.) Schur (C. ambigua) Haveridderspore. 30-60cm. Kapslen dunet, tilsmalnet mod griflen. Sporen 13-18mm. 0-600m.V-VII.

C. tuntasiana (Hal.) Soó -15cm. Indtil 6 blomster i løse klaser. Blosteret bleglillat. V-fVI.

C. regalis S.F.Gray ssp. paniculata (Host) Soó Kornridderspore. Alle støtteblade hele. 0-1200m. V-VI.

Anemone blanda Schott & Kotschy Balkananemone. Med rodknold. Stilkede stængelblade. 9-16 blå blosterblade. 300-1500m. II-mVI.

A. coronaria L. Fransk anemone. 15-45cm. Stængelbladene siddende og stærkt delte. Grundbladene 2 x trekoblede og dybt fligede. Blomsterne røde, blå eller hvide. 5-8 blosterblade.0-1250m.XII-IV.

A. pavonina Lam. Påfugleanemone. 10-30cm. Stængelbladene siddende, hele eller næsten hele. Grundbladene 3-5-fligede med m.m. delte afsnit. Blomsten rød, lyserød eller rødlilla. 0-800m. I-IV.

Clematis flammula L. Korsskovranke. 0,3-5m. Bladene 2 x delte. En mangeblomstret top. Blomsterne hvidlige, dunede udvendigt, glatte indvendigt, ca. 2cm brede. 0-600m. V-VIII.

C. vitalba L. Alm. skovranke. 2-15m. Bladene 1 x delte. Hvide blomster i mangeblomstret top, dunede på begge sider. V-VII.

C. cirrhosa L. Nikkende skovranke. 2-5m. Bladene hele eller 1-2 x trekoblede, med tandede småblade. Blomsterne nikkende, 4-7cm

brede, gullighvide og enlige. 0-1450m. X-II.

Adonis. Adonis. Stærkt fjerfligede blade. Stærkt røde eller gule kronblade og et grønt bæger. Mange nødder i et langt hovede.

1. Flerårig. Gule støvknapper og blomster ..... cyllenea
   Enårig. Sortagtige støvknapper 2.
2. Blomsten skålformet og mørkerød ..... annua
   Kronbladene udbredte, klart røde eller gule 3.
3. Bægeret 1/4-1/3 x kronen. Støvtrådene sorte foroven flammea
   " mindst 1/2 x kronen. Støvtrådene m.m. farveløse 4.
4. Bægeret låddent inderst. Kronbladene 10-13mm .... aestivalis
   " m.m. glat. Kronbladene 4-10mm microcarpa

Adonis cyllenea Boiss.& Heldr. Græsk adonis. 25-60cm. 8-11 kronblade. 1100-1600m. V. Oligyrtos (Parnias), Trakhi, Saitas.

A. annua L. ssp. cupaniana (Guss.) Steinb. Høstadonis. Bægeret 1/2-2/3 x kronen, rødbrunt, nedbøjet til udstående. 0-600m.III-V.

A. flammea Jacq. Skarlagenadonis. Nødderne sortspidsede. IV-VI.

A. aestivalis L. ssp. squarrosa (Steven) Nyman Junkeren i det grønne. 35-50cm. Bægeret tæt tiltrykt kronen. 0-900m. IV-V.

A. microcarpa DC. Småfrugtet adonis. 10-20cm. Frugten 2,3-3mm med grønsort næb. 0-300m. III-IV.

Ranunculus. Smørblomst.

1. Støvknapperne sortlilla. Kronen mest hvid/lyserød asiaticus
   " gule 2.
2. Blomsterne hvide. Vandplanter ..... 3.
   " gule 8.
3. Undervandsbladene længere end stængelleddene pseudofluitans
   " kortere " " 4.
4. Kronbladene sjældent over 5mm, ikke overlappende ..... 5.
   " mest over 5mm, overlappende 6.
5. Modne frugt over 1½mm, m.m. ægformet ..... trichophyllus
   " " under 1mm, m.m. kugleformet rionii
6. Nødden under 1mm. Ingen flydeblade ..... sphaerospermus
   " over 1mm. Mest med flydeblade 7.
7. Nødden vinget eller kølet, glat ..... baudotii
   " uden køl eller vinge, ofte håret saniculifolius
8. Grundbladene hele, tandede eller svagt lappede ..... 9.
   Nogle nedre blade mindst 1/3 delte 14.
9. 3 bægerblade ..... 10.
   5 " 11.
10. Nødden glat. Bladene takkede/svagt lappede .... ficarioides
    " dunet. Bladene butkantede ficaria
11. Alle blade grundstillede ..... bullatus
    Med stængelblade 12.
12. 3-5cm brede blomster. 50-150cm høj og opret ..... lingua
    Mindre blomster og mindre planter 13.
13. Enårig. Stænglen mangeblomstret ..... ophioglossifolius
    Flerårig. Stænglen 1-blomstret brevifolius
14. Enårig ..... 15.
    Flerårig 19.
15. Bægeret udstående ..... arvensis
    " nedadrettet 16.
16. Kronen 1-1,3 x bægeret ..... 17.
    " 2-3 x bægeret 18.
17. Nødden 7-8mm. Kronbladene 5-8mm ..... muricatus
    " ca. 2mm. Kronbladene 2-4mm chius
18. Nødden 2½-3mm, med et næb på ½mm ..... sardous
    " 3-4mm, " " " " 1mm marginatus
19. Bægeret nedadrettet ..... 20.
    " udstående 25.

20. Frugtstanden rund ..... 21.
" forlænget 22.
21. Kronbladene 10-14mm. Svagt furet blomsterstilk neapolitanus
" 6-10mm. Blomsterstilken trind velutinus
22. Grundbladene glatte eller lidt udstående hårede .. gracilis
" tiltrykt dunede eller silkehårede 23.
23. Frugten med tydeligt krumt næb. Grundbladene 2-3 x delte ..... isthmicus
Frugten med ret eller svagt krummet næb. Grundbladene 1 x delte og lappede 24.
24. De tykke rødder tenformede. Vortede nødder ... psilostachys
" " " aflange. Knudrede, hårede nødder rumelicus
25. Stænglerne krybende og rodslående ..... repens
" ikke rodslående 26.
26. Stængelgrunden tydeligt trævlet ..... 27.
" ikke " 28.
27. 2 slags grundblade. Frugtstanden forlænget ..... paludosus
1 " " . " rund sartorianus
28. 7-12 kronblade ..... millii
5 " 29.
29. Stænglen 1(-3)-blomstret, 5-25cm høj ..... 30.
" flerblomstret 31.
30. Grundbladene længere end brede, 3 x delte ... millefoliatus
" m.m. rundagtige, 2 x delte subhomophyllus
31. Frugtstanden forlænget. Med tenformede rødder sprunerianus
" rund. Kun med tynde rødder brutius

Ranunculus lingua L. Langbladet smørblomst. Ml. Mili & Nea Kios.

R. velutinus Ten. Fløjlssmørblomst. 30-60cm. Rødderne tynde. Bladstilke og nedre stængeldel udstående dunede; ellers silkehåret. Nødden 3mm, med meget kort næb. 0-1000m. IV-VI.

R. repens L. Lav smørblomst. 0-1900m. V-VIII. 1 sted.

R. brutius Ten. Krognæbbet smørblomst. 30-50cm. Grundbladene 6-12cm brede, halvglatte. Nødden ca. 4½mm, næbbet ca. 2½mm og krummet. Bladlapperne ofte stilkede. 1100-1900m. V-VII.

R. sartorianus Boiss.& Heldr. Fliget bjærgsmørblomst. 5-25cm. Stænglerne med få reducerede blade. Nødden 2,2-3mm, næbbet 0,5-1,2mm, krumt. 1400-2400m. V-VIII. TA,KY,KH,ER.

R. neapolitanus Ten. Sølvstænglet smørblomst. 20-50cm. Udstående dunet. Bægeret gulbrunt, kølet, uldhåret. Nødden meget kortnæbbet, mørkebrun med grøn kant. 0-1600m. IV-VI.

R. sardous Cr. Stivhåret smørblomst. 0-1000m. II-IX.

R. marginatus d'Urv. Kantfrugtet smørblomst. 20-35cm. Ligner sardous, men blomsten gyldengul. Bladene glatte og skinnende. Nøddens kant bredere. 0-1500m. VI-VII.

R. muricatus L. Pigsmørblomst. 5-35cm. Opret med hul stængel. Bladene groft takkede til 3-5-lappede. Nødden med glat kant hele vejen rundt. Kronen lidt længere end bægeret. 0-700m. III-IV.

R. arvensis L. Agersmørblomst. 5-30cm. Opret og grenet foroven. Bladene smalfligede. 3-7 6-8mm store, oftest langtornede nødder med et næb på 3-4mm. 0-1000m. IV-VI.

R. chius DC. Tykstilket smørblomst. 8-15cm. Grundbladene hen ad Vedbendærenprises. Nødden 2½-4mm, rynket. 0-800m. III-V.

R. gracilis Clarke Løgsmørblomst. 25-30cm. Ægformede rodknolde. 1-3-blomstret stængel. Få reducerede stængelblade. III-VI.

R. rumelicus Griseb. Bladundersiden silkehåret. Nødden retnæb-

bet. Ellers som den følgende. IV-V.

Ranunculus psilostachys Griseb. Kartesmørblomst. 2-8 blomster. Frugthovedet cylindrisk, 14-22x6-8mm. Næbbet af nøddens længde. 900-1900m. V-VI. TA,PR,ME,KY,KH,ER,PN.

R. isthmicus Boiss. Klosmørblomst. 6-10cm. Tiltrykt dunet. Med tenformede rødder. Grundbladene 2-3 x delte. Næbbet = eller lidt længere end frugten, klokrummet. 0-600m. II-III.

R. paludosus Poiret Forskelligbladet smørblomst. 8-30cm. Ydre grundblade svagt 3-lappede til hele; de indre 3 x smalfliget delte. Nødderne ca. 2mm; næbbet af nøddens længde. 0-800m. IV-V.

R. millefoliatus Vahl Fjerfliget smørblomst. 10-30cm. Grundbladene stærkt smalfligede; fligene $\frac{3}{4}$-1mm brede. Frugthovedet kort aflangt. Bladfligene spidse. Glat bæger. 200-1800m. IV-V.

R. millii Boiss.& Heldr. Som foregående, men bladfligene butte. Nødderne ca. 2mm; næbbet kloformet, ca.$\frac{1}{4}$ x nødden.

R. subhomophyllus (Hal.) Vierh. 5-7cm. M.m. glat. Grundbladsafsnittene ofte stilkede. Nødden $2\frac{1}{2}$-3mm, rundagtigt, bredvinget. Næbbet lidt kortere og bøjet. 1100-2300m. IV. TA,ME,KY,KH.

R. sprunerianus Boiss. Grenet smørblomst. 20-35cm. Grundbladene 3-delte med hjærteformet grund og butte lapper. 3-11 blomster. Næbbet af nøddens længde, næsten ret, men kroget yderst. IV.

R. asiaticus L. Havesmørblomst. 10-30cm. Blomsterne 3-5cm brede, mest hvide, men kan være gule eller røde. Ydre grundblade 3-lappede, indre tiltagende delte. Valseformet frugtstand.0-950m.II-V.

R. ficaria L. ssp. chrysocephalus P.D.Sell (ssp. ficariiformis) Vorterod. 0-1900m. I-V.

R. ficarioides Bory & Chaub. Glat flerårig. Bladene bredt ægformede med dybt hjærteformet grund. Stænglerne meget korte. Bægerbladene affaldende. 8-11 kronblade. 1000-2200m.IV-mVI. TA,KY,ØE, KH,PN.

R. brevifolius Ten. Kortbladet smørblomst. 5-15cm. Fortykket rodstok. Grundbladene mest nyreformede, $1\frac{1}{2}$-4cm brede, svagt trelappede. 1(2) stængelblad. Planten glat. 1800-2600m. fV-mVII. TA,KY,KH.

R. bullatus L. Rosetsmørblomst. 8-20cm. Flerårig. Bladene ægformede, rundtakkede, noget hvælvede, ruhårede nedenunder. ssp. cytheraeus (Hal.) Vierh. har flerblomstrede stængler med støtteblade og 10-15mm brede blomster. 0-1400m. X-XII.

R. ophioglossifolius Vill. Tungesmørblomst. 10-40cm. Stænglen slap, opstigende, hul. Bladene lancet- til bredt ægformede. Blomsterne 5-9mm brede. Kronbladene 3x$1\frac{1}{2}$mm. 0-600m. III-VII.

R. baudotii Godron Strandfrøpeber. 0m. III-V.

R. saniculifolius (Viv.) Cook (R. peltatus ssp. s.) Sanikelfrøpeber. Frugtstilken længere end bladet. Måneformet honningkirtel. 0m. IV-VI.

R. pseudofluitans (Syme) Newbould (R. penicillatus ssp. ps.) Penselfrøpeber. Bladene oftest over 8cm, med parallelle flige. Kronbladene 10-15mm. Mest i strømmende vand. 0-300m. V-VI.

R. sphaerospermus Boiss.& Blanche Kuglefrugtet frøpeber.

R. trichophyllus Chaix Hårfliget frøpeber. Ingen flydeblade. 0-1800m. IV-VI.

R. rionii Lagger Enårig frøpeber. Enårig. Ingen flydeblade. 0-100m. V-VI.

Ceratocephalus falcatus (L.) Pers. Krumt kartefrø. 2-10cm. Enårig rosetplante med håndfligede blade. Små, gule, 10-15mm

brede blomster med bæger. Ret stor, ægformet frugtstand. Frugterne med et seglkrummet næb, 8-10mm ialt. 0-1500m. II-III.

Myosurus heldreichii Heldr. Tyk musehale. Tyk frugtstilk. IV-V.

Aquilegia. Akeleje. Arterne her har tvefarvede blomster med himmelblåt til blålillat bæger og lysere krone.

A. ottonis Orph. Lærkesporeakeleje. 15-30cm. Småbladene mest 10-25mm, spredt kirteldunede. Kronen lyseblå. Kronbladenes plade mindst 15mm, afskåret fortil. Blomsterstilkene kortdunede. Bælgkapslerne 15-22mm. 1300-1800m. KH (Styx). mV-sVII.

A. taygetea Orph. 10-20cm. Småbladene 8-15mm, ret tæt dunede. Kronen flødefarvet. Kronbladenes plade under 15mm, afrundet fortil. Blomsterstilkene langt, udstående hårede. Bælgkapslerne mest 11-14mm. 1600-2200m. VI-VII. TA.

Thalictrum orientale Boiss. Hvid frøstjærne. 10-30cm. Glat. Få oprette, hvide blomster, med 8-10mm store blosterblade. TA.

PAEONIACEAE

Paeonia mascula (L.) Miller ssp. hellenica Storbladet bonderose. 50-80cm. Bladene 2 x trekoblede med 9-16 elliptiske til runde afsnit. Blomsterne røde, 8-14cm brede. 500-1900m. IV-V.

BERBERIDACEAE

Gule 6-tallige (÷ Berberis) blomster uden bæger. 6 støvdragere.

1. Busk. Frugten et bær ..... Berberis
   Urter. Frugten en kapsel. Flerårige 2.
2. Alle blade grundstillede ..... Bongardia
   Stænglen m.m. bladet 3.
3. Hver stængel med 1 blad og 1 klase ..... Gymnospermium
   " " " flere blade og ofte også klaser Leontice

Leontice leontopetalum L. Blærekapsel. 30-50cm. Opret, glat og blågrøn. Bladene 2-3 x trekoblede med bredt ægformede afsnit. Klaserne med 15-40 blomster. Kapslen 2½-4cm. 0-500m. II-IV.

Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach ssp. peloponnesiacum Fingret blærekapsel. 10-15cm. Hver stængel med 1 grund- og 1 stængelblade. Grundbladet trekoblet og derefter 4-7-fingret håndelt. Stængelbladet håndelt. Klasen med 6-12 blomster. 1450-1500m. IV-V. PN (bl.a. ved kilden Vrisi Beiku).

Bongardia chrysogonum (L.) Griseb. Rosetblærekapsel. 10-50cm. Glat og blågrøn. Bladene fjersnitdelte med mest 3-spidsede, omvendt kileformede afsnit. Kapslen ægformet, ca. 1½cm. 350m. IV-V. Akhaia: Lille kornmark i fyrreskov nær Akhladea mellem Selinus og Pteri.

Berberis cretica L. Tykgrenet surtorn. 30-150cm. Bladene helrandede. Klaserne med 3-8 blomster. 900-2400m. IV-V. TA,ME,KY.

LAURACEAE

Laurus nobilis L. Laurbær. 1-5m. Unge kviste grønne med langstrakte korkporer. Bladene stedsegrønne, læderagtige, spredte, skinnende mørkegrønne ovenpå, ofte lidt bølgede i randen. Tvebo. 4 blosterblade. 8-12 støvdragere. 0-800m. III-IV.

PAPAVERACEAE

Papaver. Valmue.

1. Øvre blade stængelomfattende ..... somniferum
   " " ikke stængelomfattende 2.
2. Kapsel og frugtknude med børster ..... 3.
   " " " glatte 5.

3. Modne kapsel 2-4 x så lang som bred ..... argemone
" " indtil 2 x så lang som bred 4.
4. Kapslen med tiltrykte børster forneden ..... apulum
" " udstående " over det hele hybridum
5. Støvknapperne lysegule ..... 6.
" mat gulbrune til blalige 7.
6. Bægerbladsranden ofte mørklilla. Øvre blade ofte helrandede eller med et enkelt par lapper purpureomarginatum
Bægerbladsranden aldrig mørklilla. Øvre blade oftest med mange par lapper eller tænder pinnatifidum
7. Kapslen 1-1½ x så lang som bred. Mørke støvknapper rhoeas
" 2-3 x " " " " . Gulbrune støvknapper 8.
8. Mælkesaften hvid. Øvre blade siddende ..... dubium
" gul. " " tit kortstilkede lecoqii

Papaver somniferum L. ssp. somniferum Opiumsvalmue. V-VIII.

P. rhoeas L. Kornvalmue. 0-1500m. IV-X.

P. argemone L. ssp. nigrotinctum (Fedde) Kadereit Køllevalmue.

P. lecoqii Lamotte Gulmælket valmue. Ligner foregående, men kapslen kortere, mere U-formet. Kronbladene lidt mere gulrøde, ofte med en sort plet midtpå. 0-650m. IV-VI.

P. dubium L. Gærdevalmue.

P. pinnatifidum Moris Skarptandet valmue. 10-85cm. De øvre blade mest med skarpe, fremadrettede tænder eller lapper. IV-V.

P. purpureomarginatum Kadereit. 8-45cm. Arskiven med sort mellem strålerne. 0-600m. IV-V. Kythæra.

P. apulum Ten. Kortkapslet valmue. 10-55cm. Det modne støvfang stærkt hvælvet mellem arstrålerne. Kronen uden sort plet ved grunden. 0-800m. IV-V.

P. hybridum L. Vinvalmue. 5-60cm. Det modne støvfang ikke hvælvet mellem arstrålerne. Kronen vinrød med sort grund. IV-V.

Roemeria hybrida (L.) DC. Purpurvalmue. 20-40cm. En enårig, lillablomstret valmue med 2-3 x fjersnitdelte blade og linjeformet kapsel på 2½-8cm. 0-300m. IV-V.

Glaucium flavum Cr. Strandhornskulpe. 30-90cm. Stærkt blågrøn 2-flerårig med store, gule valmueblomster. Kapslen linjeformet, 15-30cm. 0-300m. IV-IX.

G. corniculatum (L.) Rud. Rød hornskulpe. 30-40cm. Dunet enårig med indtil 3cm lange, orange eller røde kronblade. Kapslen indtil 20cm, med tiltrykte børster. 0-300m. V-VI.

Hypecoum. Seglskulpe. Glatte enårige med mælkesaft. Bladene 2-3 x fjerdelte. Blomsterne ret små, gule, 4-tallige; de to par kronblade lidt forskellige, i det mindste de indre trelappede. Kapslen linjeformet, m.m. seglkrummet, noget leddet.

1. Øvre bladflige bredere mod den 3-tandede spids ..... 2.
" " ikke udvidede mod den udelte spids 3.
2. Ydre kronblade højst 6mm brede, altid længere end brede torulosum
Ydre kronblade mindst 6mm brede, ikke længere end brede imberbe
3. Mediane støvtråde smalt trekantede ..... pseudograndiflorum
" " " ægformede procumbens

Hypecoum torulosum Å.E.Dahl 5-12cm. Orangegult blomsterstøv. Citrongule blomster. Ydre kronblades sidelapper ofte indrullede. Skulpen stærkt knudret. Om. III-V. Knudret seglskulpe.

H. imberbe Sm. Storblomstret seglskulpe. 1-40cm. Orangegult

blomsterstøv. Orangegule blomster. Ydre kronblades sidelapper flade. Skulpen kun svagt knudret. 0-300m. III-VI.

Hypecoum pseudograndiflorum Petrović 5-40cm. Gullighvidt blomsterstøv. Blomsten citrongul. Ydre kronblade uden eller med kort negl.

H. procumbens L. Liggende seglskulpe. 5-40cm. Gullighvidt blomsterstøv. Citron- eller orangegul blomst. Ydre kronblade med tydelig negl. Skulpen næppe knudret. 0-600m. III-V.

Argemone mexicana L. Pigvalmue. 25-80cm. Gulblomstret enårig med tornede, blågrønne blade. Kronbladene 2-3cm. Kapslen ellipsoidisk og tornet. VI-VIII. Indslæbt.

Corydalis bulbosa (L.) DC. (C. cava) Hulrodet lærkespore. Støttebladene helrandede. Bladfligene butte. Mellemste småblade med langt kileformet grund. 0-1000m. III-V.

C. blanda Schott ssp. oxelmannii (C. parnassica) 8-13cm. Støttebladene helrandede. Bladfligene lidt spidse. Mellemste småblade langstilkede. Bladene blågrønne. 1800-2700m. mV-sVI. KH.

C. solida (L.) Sw. ssp. incisa Lidén Langstilket lærkespore. Støttebladene fligede; fligene tandede eller lappede. V-VI.

Fumaria. Jordrøg.

1. Kronen mindst 9mm lang	.....	2.
" ikke over 9mm		7.
2. Frugtstilken tilbagekrummet	.....	3.
" udstående til opret		4.
3. Klasen kortstilket til siddende	.....	petteri
" langstilket. Kronen mest hvid		capreolata
4. Støttebladet 1/3-2/3 x frugtstilken	.....	5.
" ca. = frugtstilken		6.
5. Frugten ca. 3 x 3 mm	.....	judaica
" 2-2¼ x 2-2¼ mm		bastardii
6. Frugten 3-4x3-4mm. Kronen m.m. uden mørk spids		macrocarpa
" 2½-3x2½-3mm. Kronen mørkspidset		gaillardotii
7. Frugtstilken tilbagekrummet	.....	kralikii
" udstående til opret		8.
8. Kronen hvid, 5-6mm	.....	parviflora
" lyserød		9.
9. Klasen siddende eller meget kortstilket	.....	densiflora
" med tydelig stilk		officinalis

Fumaria gaillardotii Boiss. Tungeblomstret jordrøg. 20-40cm. Klaserne med 10-15 blomster. Bægerbladene 3-4x2mm.0-600m.III-IV.

F. judaica Boiss. Hjælmjordrøg. 20-50cm. Bægeret 2x1mm. Kronen hvid eller blegrød. 0-600m. III-V.

F. macrocarpa Parl. Storfrugtet jordrøg. 20-50cm. Kronen mest ensfarvet blegrød. Klasen med 7-11 blomster. 0-550m. II-V.

F. capreolata L. Hvid jordrøg. 30-60cm. Klasen kortere end stilken. Bægeret 4-6x2-3mm. Kronen 11-13mm. 0-1200m. IV-VI.

F. bastardii Bor. 20-50cm. 15-25 blegrøde blomster. Bægeret 2-3 x 1-2mm. 0-600m. III-V.

F. petteri Rchb. ssp. petteri Spidsbladet jordrøg. 30-100cm. Frugten 2-2¼x1½-1¾mm. Bægeret bredere end kronen. 0-400m. III-V.

F. kralikii Jordan Spidsbægret jordrøg. 10-20cm. Kronen blegrød, 5-7mm. 0-300m. IV-VI.

F. densiflora DC. Tætblomstret jordrøg. 15-30cm. Støttebladene længere end frugtstilken. Bægeret bredere end kronen. 0-600m.I-V.

F. officinalis L. ssp. officinalis Lægejordrøg. 0-1000m. III-IV.

F. parviflora Lam. Småblomstret jordrøg. 15-40cm. Klasen med

kort, men tydelig stilk. Bladfligene furede. Støttebladene lig eller længere end frugtstilkene. Bægeret ½-1mm. 0-800m. III-V.

CAPPARIDACEAE

Capparis spinosa L. Kapers. 40-80cm lange buske med liggende eller udstående grene med spredte, grågrønne, elliptiske til runde blade på 2½-6cm, der ofte har akseltorne. Store, enlige, hvide, 4-talsblomster i bladhjørnerne med mange støvdragere og en langstilket frugtknude. 0-800m. 2 underarter:
ssp. spinosa: Akselbladene over 2mm, ofte tornagtige. Kronen stærkt uregelmæssig. VI-IX.
ssp. rupestris (Sm.) Nyman: Akselbladene indtil 2mm. Kronen svagt uregelmæssig. V-VI.

CRUCIFERAE

1. Skulpen lang, 3-flere x så lang som bred ..... 2.
   " kort, højst 3 x " " " " ..... 26.
2. Bægerbladene oprette. Bægeret lukket ..... 3.
   " m.m. udstående ..... 13.
3. Skulpen tvedelt på tværs. Rød krone. Kødede blade ... Cakile
   " ikke tvedelt på tværs ..... 4.
4. Alle hår grenede og tiltrykte ..... Erysimum
   Med udstående hår eller glat ..... 5.
5. Støvfanget dybt 2-lappet ..... 6.
   " hovedformet eller højst svagt 2-lappet ..... 8.
6. Støvfanget med 2 sidestillede knuder eller horn .. Matthiola
   " uden " " " " ..... 7.
7. Griflen kort. Støvfangets lapper frie ..... Hesperis
   " mangler. Støvfangets lapper sammenvoksede Malcolmia
8. Kronen rød ..... 9.
   " gul eller hvid ..... 10.
9. Skulpen delt på tværs. Hårene ugrenede ..... Erucaria
   " ikke tværdelt. Stjærnehåret strandplante Maresia
10. Bladene helrandede, stængelomfattende, blågrønne Conringia
    " ikke helrandede ..... 11.
11. En perlesnorsformet indsnøret ledskulpe ..... Raphanus
    Skulpen opspringende, ikke perlesnorsformet ..... 12.
12. Skulpen med et sværdformet sammentrykt næb ..... Eruca
    " " " knopformet næb Hirschfeldia
13. Skulpen fladtrykt, m.m. dråbeformet og hængende .... Isatis
    " ikke hængende ..... 14.
14. En m.m. perlesnorsformet ledskulpe ..... Enarthrocarpus
    Skulpen opspringende ..... 15.
15. Skulpens klapper med 3 ribber ..... 16.
    " " " 0-1 ribbe ..... 18.
16. Kronen hvid ..... Alliaria
    " gul ..... 17.
17. Skulpen med et sværdformet næb ..... Sinapis
    " " en kort griffel Sisymbrium
18. Skulpeklapperne flade ..... 19.
    " hvælvede ..... 21.
19. Med fjersnitdelte blade ..... Cardamine
    Stængelbladene hele; grundbladene kan være fligede ..... 20.
20. Griflen 4-8mm. Kronen lilla ..... Aubrieta
    " højst 2mm Arabis
21. Skulpeklapperne uden eller med utydelig ribbe ..... 22.
    " med en tydelig ribbe ..... 24.
22. Kronen hvid ..... Nasturtium
    " gul ..... 23.
23. Frøene i 2 rækker ..... Rorippa
    " i 1 række Barbarea
24. Frøene i 2 rækker ..... Diplotaxis
    " i 1 række ..... 25.
25. Skulpen med kort eller langt næb ..... Brassica
    " uden næb. Hvid krone Arabidopsis

26. Kronen gul eller lysegul ..... 27.
" hvid eller rødlilla 37.
27. Stænglen bladløs ..... Draba
" bladet 28.
28. Skulpen hængende ..... 29.
" opret eller udstående 30.
29. Bladene 1-2 x delte ..... Carrichtera
" hele Clypeola
30. Skulpen brilleformet ..... Biscutella
" ikke brilleformet 31.
31. Stængelbladene med pilformet grund ..... 32.
" uden " " 34.
32. Skulpen omvendt pæreformet med en pig øverst ..... Myagrum
" anderledes 33.
33. Skulpen netrynket. Kronen gyldengul ..... Neslia
" ikke netrynket. Kronen bleggul Camelina
34. Skulpen med 4 uregelmæssigt grovtakkede vinger .... Bunias
" uvinget 35.
35. Uden grenede hår ..... Rapistrum
Stjærnehåret 36.
36. Skulpen 14-28x9-13mm, ganske flad ..... Fibigia
" 3-11mm, ikke helt flad Alyssum
37. Skulpen bredvægget og m.m. flad ..... 38.
" smalvægget eller trind 44.
38. Blomsterne rødlilla ..... 39.
" hvide 40.
39. Med stjærnehår. Skulpen 6-16mm ..... Aubrieta
Uden " . " 2-7cm Lunaria
40. Kronbladene dybt 2-lappede ..... 41.
" hele eller udrandede 42.
41. Rosetplante uden stængelblade ..... Erophila
Med stængelblade Berteroa
42. Enårig. Bladene tandede ..... Draba muralis
Flerårig. Bladene helrandede 43.
43. Med skjoldformede stjærnehår ..... Ptilotrichum
Med 2-6-grenede hår Lobularia
44. Skulpen med et m.m. trindt tværsnit ..... 45.
" flad 47.
45. Skulpen indsnøret midtpå i to led ..... Didesmus
" m.m. kugleformet 46.
46. 2 skulpeled, det nedre lille og cylindrisk ..... Crambe
1 " , der er netrynket Calepina
47. Skulpens overflade rynket eller vortet ..... Coronopus
" " jævn 48.
48. Stængelbladene med omfattende grund ..... 49.
" uden " " 53.
49. Skulpen omvendt hjærteformet, uvinget ..... Cardaria
" anderledes 50.
50. Skulpens sider rette, danner en spids vinkel nedad Capsella
" " krumme 51.
51. Planten m.m. håret ..... Lepidium
" stort set glat 52.
52. Skulpen m.m. rund ..... Aethionema cordatum
" tilsmalnet forneden Thlaspi
53. Stænglen uden eller kun med små skælblade ..... Teesdalia
" bladet 54.
54. Kronbladene ulige store ..... Iberis
" ens 55.
55. Skulpens vinger bredere end skulperummet ..... Aethionema
" " højst brede foroven 56.
56. Flerårig, eller med oventil vinget skulpe ..... Lepidium
Enårig. Skulpen uvinget 57.
57. Skulpestilkene opret udstående. Klaserne åbne Hymenolobus
" udstående. Klaserne tætte Hornungia

Sisymbrium. Vejsennep.

1. Skulpen 1-2½cm, næsten siddende ..... 2.
" 3-20cm 3.
2. Skulperne tiltrykte, i bladløs klase ..... officinale
" m.m. udadbøjede fra bladhjørnerne polyceratium
3. Skulpestilken tyndere end skulpen ..... irio
" så tyk som " 4.
4. Øvre stængelblade med 2-4 par smalle flige ..... altissimum
" " hele eller med 1 par grundlapper orientale

Sisymbrium irio L. Glat vejsennep. 30-60cm. Skulperne rager op over de små, bleggule blomster på 2½-3½mm. Bladene med smalt 3-kantet endeafsnit og smalle, næsten vinkelret udstående sideflige. 0-800m. II-VI.

S. altissimum L. Ungarsk vejsennep. 0-1000m. VI-VII.

S. orientale L. Blød vejsennep. 30-70cm. Ofte gråhåret. Blomsterne bleggule, 8-10mm. Skulperne 4-10cm. 0-800m. VI-VII.

S. polyceratium L. Hornet vejsennep. 20-60cm. Næsten glat. Blomsterne 2-3 sammen i de øvre bladhjørner, 1½-2mm. IV-VI.

S. officinale (L.) Scop. Rank vejsennep. 0-1100m. V-VII.

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande Løgkarse. V-VII.

Arabidopsis thaliana (L.) Haynh. Alm. gåsemad. 0-2100m. III-IV.

Myagrum perfoliatum L. Pigskulpe. 15-100cm. Glat 1-2-årig, blågrøn og stinkende. Stængelbladene trekantet lancetformede med pilformet grund. Skulpen 5-8mm. 0-800m. IV-V.

Isatis tinctoria L. Farvevajd. 2-flerårig. Skulpen 3-5 x så lang som bred. Kronbladene 2½-4mm. 0-2100m. V-VII. 3 underarter:
ssp. tinctoria: Skulpen 15-20x4-5mm, tilsmalnet mod grunden, glat, eller dunet midtpå.
ssp. tomentella (Boiss.& Bal.): Skulpen 12-15x2½-4mm, tilsmalnet mod grunden, oftest dunet til filtet over det hele.
ssp. corymbosa (Boiss.) P.H.David: Skulpen ca. 10x2-3mm, afrundet i begge ender, glat eller fintdunet.

I. lusitanica L. Enårig vajd. 20-90cm. Enårig. Skulpen 5-8 x så lang som brede, 15-28x2½-4mm. Kronbladene 4-5mm. III-V.

Bunias erucago L. Agertakkeklap. 20-80cm. Stivhåret, kirtlet enårig. Skulpen 10-12mm, firkantet med 4 uregelmæssigt dobbelttakkede vinger. 0-2200m. II-VII.

Erysimum. Hjørneklap.

1. Støvfanget dybt 2-lappet ..... 2.
" hovedformet eller svagt 2-lappet 3.
2. Bægeret med mørke kirtler. Frøene 2-radede ..... cheiri
" uden kirtler. Frøene m.m. 1-radede corinthium
3. Skulpen sammentrykt fra siden og m.m. 2-vinget ..... 4.
" uvinget; firkantet eller sammentrykt forfra 5.
4. Bladene m.m. ægformede, bredest i nederste ½ ... cuspidatum
" omvendt æg- til spatelformede pseudocuspidatum
5. Enårig. Skulperne indtil 90° udstående ..... repandum
2-flerårig 6.
6. Bladenes hår overvejende tregrenede ..... 7.
" " " tvegrenede 8.
7. Nedre blade bugtet-tandede til helrandede ..... asperulum
" " fligede til snitdelte pectinatum
8. 2-flerårige, uden golde rosetter ..... 9.
Flerårige, med golde rosetter 10.
9. Skulpens vinkel med aksen 10-30° ..... diffusum
" " " " 70-90° graecum
10. Med lange, bladede sideskud fra grunden ..... cephalonicum
Uden " " " " pusillum

Erysimum cheiri (L.) Cr. (Cheiranthus c.) Gyldenlak. 25-80cm.

Bladene svagt til middeldunede. Klasen ofte grenet. Skulpen mest 5-6mm tyk. 0-1000m. III-VI.

Erysimum corinthium (Boiss.) Wettst. 25-75cm. Bladene tætdunede. Klasen mest ugrenet. Skulpen 3-4½mm tyk.

E. pusillum Bory & Chaub. -40cm. Blomsterstilkene ½-2mm i blomst. Skulpen sammentrykt, ½-1mm tyk, vinklen 10-50°. 1000-2400m. V-VI. TA,PR,ME.

E. cephalonicum Pol. -40cm. Blomsterstilkene ½-2mm i blomst. Skulpen sammentrykt, 1,2-1,4mm tyk, vinklen 15-30°. 100-2400m. IV-VI. KY,KH,ER,PN.

E. diffusum Ehrh. Grå hjørneklap. -120cm. Blomsterstilkene 3-6mm i blomst. Bladene grå. Skulpen med firkantet tværsnit.

E. graecum Boiss.& Heldr. Bladene grågrønne. Blomsterstilken 2-4 mm i blomst. Skulpen med firkantet tværsnit. -50cm i blomst.

E. asperulum Boiss.& Heldr. 10-50cm i blomst. Kronbladene dunede udvendigt, mest med 3-grenede hår. Skulpevinklen 10-40°. Skulpen med 3- og 4-grenede hår. 50-1300(-1900)m. N-Pelop.

E. pectinatum Bory & Chaub. Kambladet hjørneklap. 10-50cm. Skulpevinklen 0-10°. Skulpen 2-4½cm, mest med 2-grenede hår. Flerårig og flerstænglet. 600-2000m. V. TA,PR,ME,OL,KY,KH,PN.

E. cuspidatum (Bieb.) DC. Sværdhjørneklap. 20-70cm.(1)2-årig. Hårene 3-4-grenede. Nedre blade tandede. Skulperne 1-3cm x 2½-3½ mm; klapperne kølede eller smalt vingede. Griflen 3-6mm. Kronbladene 10-12mm. 600-1400m. V-fVII.

E. pseudocuspidatum Pol. 12-27cm i blomst. 2-årig. Som foregående, men kronbladene 8-10mm. 1700-2250m. KH.

E. repandum L. Udspærret hjørneklap. 5-35cm. Hårene 2-3-grenede. Nedre blade grønne, linje- til lancetformede. Skulpen 3-10cm x 1-1½mm. Griflen 2-5mm. 100-600m. IV-V.

Hesperis laciniata All. Fliget aftenstjærne. 10-80cm. Kronbladene 15-30mm, gule med rødlillat anstrøg eller helt rødlilla. Stænglen stivhåret. Bladene fligede til bugtede. Mest 800-1500m. IV-V.
ssp. laciniata: Mest kirteldunet. Skulpen dunet.
ssp. secundiflora (Boiss.& Spr.) Breistr. Ukirtlet. Glat skulpe.

Malcolmia. Levkøj. Enårige med rødlilla krone.Grenhårede.

1. Bægerbladenes grund næppe sækformet ..... 2.
   I det mindste de ydre bægerblade med sækformet grund 3.
2. Skulpen knudret og trind, tiltrykt håret ..... ramosissima
   " ikke knudret, m.m. firkantet, stivhåret africana
3. Klasen bladet forneden ..... orsiniana
   " bladløs 4.
4. Næsten alle hår 3-4-grenede; grenene højst 0,15mm ... graeca
   Med mange midtfæstnede hår; grenene mindst 0,25mm 5.
5. Skulpens griffel over 1½mm. Kronbladene 10-25mm ..... 6.
   " " højst 1½mm. " 4½-12mm 7.
6. Skulpestilkene ½-1mm tykke, tyndere end skulpen ... maritima
   " 1-2½mm " , så tykke som " flexuosa
7. Kronbladene uden gul grund. Skulpen 3-7cm ..... chia
   " med " " . " 1-3½cm 8.
8. Skulpestilkene 3-5mm, ca. af skulpens tykkelse ..... bicolor
   " 5-15mm, tyndere end skulpen hydraea

Malcolmia ramosissima (Desf.) Thell. Grenlevkøj. 5-20cm. Stjærnehåret. Skulpestilkene 2-7mm. Kronbladene 4-8mm. Skulpen 1½-3½ cm. Klitter. III-V.

M. africana (L.) R.Br. Kortstilket levkøj. 10-40cm. Med grenede og stjærnehår. Skulpestilkene 1-2mm. Kronbladene 8-10mm. Skulpen 2½-6½mm. 0-500m. V.

Malcolmia maritima (L.) R.Br. Strandlevkøj. 10-35cm. Skulpestilkene 4-15mm. Skulpen 3½-8cm x 1-2mm, mest med midtfæstnede hår. Sandstrand og klitter. IV-V.

M. flexuosa (Sm.) Sm. Krum levkøj. 20-40cm. Skulpen 8-12cm, bugtet eller krum. 0-200m. II-V. 2 underarter:
ssp. flexuosa: Griflen 1,5-2,3mm. Klasen kort og fåblomstret.
ssp. naxensis (Rech.f.) A.I.Stork: Griflen 2½-5mm. Klasen lang og mangeblomstret.

M. graeca Boiss.& Spr. 5-20cm. Bladene helrandede til lyreformet fligede. Skulpestilke 4-10mm. Skulpen 2½-7½cm x 1-1½mm.

M. orsiniana (Ten.) Ten. Bredbladet levkøj. 10-40cm. Nedre blade omvendt æg- til spatelformede. Kronbladene 4-10mm. Skulpen 2½-3½cm. 1000-2100m. mVI-sVIII.

M. chia (L.) DC. Bleg levkøj. 8-30cm. Kronbladene ofte hvide, ellers blegrøde eller lilla. Skulpen 3-7cm, opstigende til næsten opret. 500-1600m. II-IV.

M. hydraea (Hal.) Heldr.& Hal. Vreden levkøj. Skulpen indtil 4½2m, udstående, opadbøjet og bugtet.

M. bicolor Boiss.& Heldr. 7-35cm. Tofarvet levkøj. Skulpestilkene 3-5(-8)mm. Skulpen 1-3cm, ret og stiv.

Maresia nana (DC.) Batt. (Malcolmia n.) Dværglevkøj. 5-20cm. Ligner Malcolmia ramosissima, men har hovedformet støvfang. Gråt stjærnedunet. Bladene linje-spatelformede. Kronbladene 5-6 mm. Skulpen 1-3cm x ¾mm, trind og knudret. Sandstrand. II-VI.

Matthiola. Levkøj. Blomsterne mest rødlilla.

1. Skulpen med 3 ens horn i spidsen på 3-4mm .... tricuspidata
" " knuder eller 2 horn 2.
2. Skulpen fladtrykt, 3-5mm bred ..... 3.
" m.m. trind, sjældent over 2mm bred og tyk 4.
3. Skulpen med store, sorte eller gule kirtler ..... sinuata
" uden store kirtler incana
4. Flerårig. Skulpen uden horn, men med knuder ... fruticulosa
1(-2)-årig. Skulpens horn 2-10mm longipetala

Matthiola incana (L.) R.Br. Sommerlevkøj. 30-60cm. Kraftig, ofte hvidfiltet flerårig. Bladene mest helrandede, smalle. Kronbladene 2-3cm, rødlilla eller hvide. Skulpen 6-16cm.0-450m.II-V.

M. sinuata (L.) R.Br. ssp. glandulosa (Vis.) Vierh. Klitlevkøj. 30-50cm. Gråfiltet toårig. Nedre blade indskårne. Kronbladene 19-22mm. Skulpen 5-15cm. 0-50m. V-IX.

M. fruticulosa (L.) Maire ssp. fruticulosa Mørk levkøj. 30-50 cm. M.m. gråt stjærnefiltet flerårig. Bladene linjeformede. Kronen skidengul til lilla. Skulperne 3-11½cm, udstående eller nedbøjede. 300-1500m. III-VI.

M. longipetala (Vent.) DC. ssp. bicornis (Sm.) Ball Hornlevkøj. -50cm. Nedre blade bugtede til fligede. Kronbladene 15-25mm. Skulpen 5-15cm, med opadkrummede horn.

M. tricuspidata (L.) R.Br. Trehornet levkøj. 10-30cm. Gråfiltet enårig med lappede blade. Kronen 15-22mm. Skulpen 2½-10cm x 2-3mm. 0-50m. III-IV.

Barbarea vulgaris R.Br. Alm. vinterkarse. Øverste blade tandede. Blomsterstilkene 4-6mm. Klaserne længere i frugt. IV-VII.

B. conferta Boiss.& Heldr. -30cm. Øvre blade fligede. Blomsterstilkene 2-4mm. Klaserne næppe længere i frugt. Griflen 2-3mm. KY.

Rorippa silvestris (L.) Besser Vejguldkarse. 0-1650m. V-IX.

Nasturtium officinale R.Br. Tykskulpet brøndkarse. 0-1500m.

Cardamine carnosa W.& K. Tykbladet karse. 6-15cm. Flerårig. Med krybende jordstængel. 3-5 par småblade. Bladgrunden ikke øret. Kronbladene 6-9mm, med gullig negl. Den unge skulpe tæt grådunet. 1500-2800m. VI-VIII. KH.

C. graeca L. Kildekarse. 10-30cm. 1-2-årig. Stængelbladene med øret grund. Nedre blade med 4-5 par småblade. Kronbladene 4-6mm. Skulperne 3½-5cm, noget ensidige, vingede, griflen 4-8mm. 500-1500m. II-V.

C. hirsuta L. Rosetkarse. Kronen = bægeret. 0-1800m. I-XII.

Arabis. Kalkkarse.

1. Grundbladene dunede, stængelbladene m.m. glatte ..... 2.
   Grund- og stængelblade med samme behåring 4.
2. 2-5 grønne stængelblade ..... subflava
   Mange blågrønne stængelblade 3.
3. Stængelbladene med hjærteformet grund ..... laxa
   " " pilformet grund glabra
4. Ingen stængelblade ..... bryoides
   Med stængelblade 5.
5. Kronen blålilla med gul negl. Enårig ..... verna
   " hvid eller hvidgul 6.
6. Skulpen 9-15cm, som moden vandret stillet ..... turrita
   " højst 9cm, ikke vandret stillet 7.
7. Stængelbladene med afrundet eller kileformet grund collina
   " " øret, pil- eller hjærteformet grund 8.
8. Skulperne m.m. oprette ..... 9.
   " m.m. udstående 11.
9. Stænglen m.m. glat ..... sudetica
   " i hvert fald håret forneden 10.
10. Stænglen glat foroven ..... sagittata
    " jævnt stivhåret hirsuta
11. Flerårig med golde skud. Kronbladene 6-11mm ..... caucasica
    Enårig. Kronbladene ca. 3mm recta

Arabis glabra (L.) Bernh. (A. pseudoturritis) Tårnurt. V-VI.

A. laxa Sm. Udspærret tårnurt. 50-80cm. Ofte grenet foroven. Kronen hvid eller lyslilla. Skulperne 7-12cm, udstående eller ensidigt bøjede.

A. subflava B.M.G.Jones Bleggul kalkkarse. 10-30cm. Grundbladene høvlfligede til svagt lappede. Stængelbladene tydeligt ørede. Kronbladene 7-10mm, bleggule. Skulpen 2-3cm, m.m. udstående på en opret skulpestilk. 1700-2200m. VI-VII.

A. sagittata (Bertol.) DC. Rank kalkkarse. 25-80cm. 12-50 stængelblade med pilformet grund. Kronbladene 4-6½mm. 0-1800m.IV-VI.

A. hirsuta (L.) Scop. Stivhåret kalkkarse. 6-24 stængelblade. Kronbladene 4-5½mm. 0-2100m. IV-VII.

A. sudetica Tausch (A. allionii) Glat kalkkarse. 20-40cm. Ca. 10 m.m. glatte stængelblade. Skulperne rager op over blomsterne. Kronbladene 6-7mm. Grundbladene glatte. 1550-2150m. VI-fVII.

A. collina Ten. (A. muralis) Murkalkkarse. 10-30cm. 6-14 stængelblade, gråfiltede af 3-6-grenede hår. Mest 5-15 blomster. 100-2200m. III-VII.

A. turrita L. Ensidig kalkkarse. 10-90cm. Dunet 2-flerårig. Kronen gullighvid. Skulperne oprette som unge, ensidigt vendte og krumme som modne. 400-1600m. III-VII.

A. recta Vill. (A. auriculata) Øret kalkkarse. 8-25cm. Stænglen u- eller svagt grenet, med 2-5-grenede hår forneden og 5-12 ørede blade. Bægeret 1½-2mm. Kronen 2-4mm. 1750-2200m. VI.

A. verna (L.) R.Br. Violet kalkkarse. 5-40cm. Ofte flerstænglet, med få stængelblade. Få blomster på 5-10mm. 0-1700m. II-V.

Arabis bryoides Boiss. Dværgkalkkarse. 2-6cm. Lancetformede, gråfiltede grundblade på 4-7mm. 2-7 blomster på 6-10mm. Skulperne 1-2cm. 1700-2900m. fV-sVII. KH,ER.

A. caucasica Schlecht. Hvid kalkkarse. 15-35cm. Løst tueformet. 3-8 grofttandede, ørede, aflange til ægformede stængelblade. Skulpevinklen 60-90°. 1200-2400m. V-fVIII. KY,KH,ER.

Aubrieta deltoidea (L.) DC. Alm. Blåpude. 8-20cm. Flerårig. Bladene gråt stjærnefiltede med 0-3 par tænder. Blomsterne rødlilla, 15-28mm. Skulpen mest 7-16x2½-4½mm. 500-1600m. sIII-VI.

Lunaria annua L. ssp. pachyrhiza (Borbas) Hayek Judaspenge. Underarten har tenformede rødder. 0-600m. III-V.

Alyssum. Krognål.

1. Flerårig ..... 2.
   1(2)-årig 10.
2. De blomstrende skud sidestillede (Aurinia) ..... 3.
   " " " endestillede 4.
3. Blomsterne i en enkel klase ..... moreanum
   Blomsterstanden sammensat saxatile
4. Bladene tofarvede: grågrønne ovenpå, grå/hvide nedenunder 5.
   " ensfarvede 6.
5. Skulpen mest bleg- til gulgrøn, randen ikke bølget chalcidicum
   " blågrøn med m.m. bølget rand murale
6. Skulpens griffel 0,6-1(1,5)mm ..... 7.
   " " mindst 2mm 8.
7. Stængelbladene m.m. mindre opad ..... caliacrae
   " " større " sibiricum
8. Kronbladene 8-9mm, svovlgule ..... taygeteum
   " 3-6mm 9.
9. Nedre blade 10-20mm og 1/5-1/6 x så brede ..... montanum
   " " 6-7mm, ca. 1/3 x så brede diffusum
10. Skulpeklapperne glatte ..... 11.
    " hårede 14.
11. Bægeret affaldende. Øvre blade svøbdannende ..... foliosum
    " blivende, til skulpen er moden 12.
12. Griflen tynd og trind, 1,0-1,3mm ..... smyrnaeum
    " kraftig og kegleformet, 0,4-1,0mm, flad forneden 13.
13. Øvre blade og blomsterstilkene med mange børstehår minutum
    " " " " " 0-få " simulans
14. Bægeret blivende, til skulpen er helt moden ..... 15.
    " tidligt affaldende 16.
15. Klasen ½-2(3)cm lang i frugt ..... siculum
    " længere i frugt alyssoides
16. Klaserne meget korte og skærmagtige i frugt ..... umbellatum
    " forlængede i frugt 17.
17. Skulpen kun med tiltrykte stjærnehår ..... minus
    " også med udstående gaffelhår strigosum

Alyssum saxatile L. (Aurinia s.) Alm. guldslør. 10-40cm. Grundbladene indtil 7x1,2cm. Frøene med en vinge på 0,3-1mm. 2 ssp.:
ssp. megalocarpum (Hausskn.) Rech.f.: Skulpen 6-9x7-11mm; griflen 1½-3mm. 0-600m. III-V.
ssp. orientale (Ard.) Rech.f.: Skulpen 4-7½x4½-8mm. Griflen ca. 1mm. 0-1000m. III-VI.

A. moreanum (Tzanoud.& Iatroú) (Aurinia m.) Skællet guldslør. 3-12cm. Jordstænglen tæt besat med visne bladrester. Rosetbladene 15-20x5-12mm, m.m. helrandede. Klasen 1-6cm i frugt. Skulpen 4½-12x4½-6mm. 1400-2100m. sIV-fVI. OL,KY,KH,ER.

A. alyssoides (L.) L. Grådodder. Honningkirtlerne 0,5-0,7mm, trådformede. Skulpens stjærnehår ca. 0,5mm brede. 300-1800m. IV-VI

A. siculum Jordan Kort krognål. 2-6(12)cm. Honningkirtlerne 0,3-

0,6mm, pløkformede. Skulpens stjærnehår 0,2-0,3mm brede med 6-10 stråler. 1000-1900m. V-VI.

Alyssum foliosum Bory & Chaub. Svøbkrognål. -10cm. Nedre blade langstilkede, de øverste tætstillede under klasen; denne tæt og skærmagtig, 1-3cm lang i frugt. Stjærnehårene skælagtige, med 16-24 stråler. 400-1800m. sIII-V.

A. minutum DC. Glatskulpet grådodder. -12cm. Frugtklaserne mest korte og skærmagtige. 500-1900m. IV-VI. TA,PR,PN.

A. simulans Runem. Mellemform mellem de 2 foregående. De øvre blade længere, smallere og mere tætstillede; de øverste undertiden svøbdannende. 600-1900m. mIII-sIV.

A. smyrnaeum C.A.Meyer -10cm. Stjærnehårene med 12-20 stråler. Frugtklaserne 1-2cm. Kronbladene udrandede. 400-1500m. III-V.

A. umbellatum Desv. Skærmkrognål. -15cm. Stjærnehårene med 6-8 stråler. Øverste blade tætstillede under klasen, denne 1-1½cm i frugt. Frugterne tæt taglagte. 0-700m. III-V.

A. minus (L.) Rothm. Markkrognål. 8-15cm. Griflen håret. Kronbladene højst lidt udrandede med lapper, der er kortere end brede. Skulpen med utydeligt affladet rand. 0-1800m. III-V.

A. strigosum Banks & Sol. Hårskulpet krognål. 5-15cm. Griflen glat. Kronbladene dybt udrandede, deres lapper tit så lange som brede. Skulpen med en 1mm bred, flad rand. 0-600m. III-V.

A. montanum L. ssp. repens (Baumg.) Baumg. Bjærgkrognål. 10-50 cm. Skulpen 3½-6mm, rund til bredt elliptisk, med tydelig rand og mest 16-strålede stjærnehår. Nedre blades stjærnehår 0,7-1,5mm brede og mest med 8 grene. 1000-2500m. IV-VII. TA,PR,OL,KY,KH,ME.

A. diffusum Ten. Skjoldkrognål. 5-15cm. Med lange, krybende golde skud. Skulperne m.m. rundagtige. Griflen 2½-3½mm. ?

A. taygeteum Heldr. Skællet krognål. 5-12cm. Stænglen forneden ofte med grå til sorte bladrester. Bladene askegrå. Bægerbladene med en dusk lange hår i spidsen. 2100-2400m. VI-VII. TA (1 fund på Hag.Elias i 1890erne), KH.

A. murale W.& K. Murkrognål. 10-70cm. Blomsterstanden bredt halvskærmformet med grene af 3. orden. Skulpen med næppe synligt årenet og 0,3-0,8mm brede stjærnehår. 300-2000m. V-VI.

A. chalcidicum Nyár. Året krognål. Nær foregående, men skulpen med ofte tydeligt årenet og med 0,15-0,3mm brede stjærnehår. 0-2000m. V-VII.

A. sibiricum Willd. 3-10cm. Med golde rosetter. Nedre blade 3-10 x 1½-6mm, hvidlige til grå. Hårene med uens grene. Skulpeklapperne usymmetriske. 0-800m. V-fVI: Omkring Korinth.

A. caliacrae Nyar. 10-30cm. Bladene indtil 7x3mm, hvide. Hårene ½-1mm brede. Bægeret 2mm (1-1½mm hos sibiricum). Skulpeklapperne usymmetrisk opblæste. Skulpen udrandet. ?

Enarthrocarpus arcuatus Labill. Perleskulpe. 10-50cm. Bladene lyre- til høvlformet fligede. Klasen kun med støtteblade forneden. Kronbladene 10-13mm. Skulpen 3-9cm, krum; næbbet 5-10mm. 0-300m. III-V. Areopoli - Kharuda på Mani-halvøen. Methånæ.

Raphanus sativus L. Radise. Forvildet.

R. raphanistrum L. Kiddike. 2 underarter:
ssp. raphanistrum: Kronbladene 14-25mm, mørkårede. Skulpen 3-4½ mm tyk, med 3-12 led. III-VIII.
ssp. landra (Moretti) Bonn.& Lay.: Kronbladene 8-14(16)mm. Skulpen over 5mm tyk, med 1-5 led. V-VI.

Fibigia clypeata (L.) Med. Skjoldskulpe. 20-40cm. Opret, gråt stjærnefiltet enårig. Bladene lancetformede. Bægeret 5-7mm. Kronen 7-10mm. Skulpen elliptisk. 300-1300m. IV-V.

Berteroa obliqua (Sm.) DC. Rødlig kløvplade. 10-50cm. Skulpen 8-12mm, med flade klapper. Kronbladene 5-8mm, hvide til lyserøde. Frøene vingede. 10-1100m. IV-XI.

Ptilotrichum cyclocarpum Boiss. ssp. cyclocarpum Kortgriflet filtblad. 5-20cm. Tætte rosetter med blade på 2-8cm x 1½-5mm, grå. Mest 1 stængel med 4-10 blade. Skulpen 5-8x3½-5mm med usymmetrisk skillevæg. 1800-2400m. sV-fVII. KY.

Lobularia maritima (L.) Desv. Biblomme. 10-40cm. Stærktgrenet og forneden forveddet fåårig. Bladene 6-30mm, linje-lancetformede, spidse, gråfiltede som unge af midtfæstnede hår. Bægeret 1 mm. Kronen 3mm. Skulpen 2½-3½x2-3mm. 0-150m. III-VI.

Clypeola jonthlaspi L. Hængeskulpe. 2-15cm. Opstigende, gråduet, gulblomstret enårig. Let kendelig ved de hængende, kredsrunde, vingede, flade skulper på 2-5mm. 0-1900m. III-V.

Draba. Gæslingeblomst.

1. Hvidblomstret enårig med bladet stængel ..... muralis
   Gulblomstrede flerårige med bladløs stængel 2.
2. Stænglen lådden ..... strasseri
   " glat 3.
3. Griflen 0,1-0,7(1,0)mm ..... lacaitae
   " 1,4-5,2mm 4.
4. Bladenes randhår indtil 1mm. Griflen under 1/3 x skulpen ..... lasiocarpa
   Bladenes randhår 1-2mm. Griflen mindst 1/3 x skulpen laconica

Draba lasiocarpa Rochel ssp. lasiocarpa Mangeblomstret gæslingeblomst. 1-15cm. 3-30 blomster. Blomster- og skulpestilke skrå til vandret udstående. 1300-2500m. IV-VII. TA,PR,ME,KY,KH,PN.

D. laconica Stevanović & Kit Tan 1½-5cm. 8-12 blomster. Blomster- og skulpestilke opstigende og lidt indadbøjede mod aksen. Klasen hoved- til skærmagtig. Griflen 3-4mm. 1600-1800m. IV-V. TA (Østsiden af Prof.Ilias over bjærghytten).

D. lacaitae Boiss. Trådgæslingeblomst. 2½-15cm. 2-19 blomster. Klasen forlænges i frugt. Skaft, bæger og kronens årer ofte rødligt anløbne. 1600-2450m. IV-VI. OL,KY,KH.

D. strasseri Greuter 7-8cm. 5-12 blomster. Skulperne tæt dækkede af mest 3-grenede hår. Griflen 5-6mm. 1070m. III (med frugt i IV). PR (Prof.Ilias Ø for Molai).

D. muralis L. Murgæslingeblomst. 10-30cm. Med grundroset. Nedre blade m.m. helrandede, øvre med 4-6 tænder, bredt ægformede og noget omfattende. 2mm store blomster i forlænget klase. 600-1500m. IV-fVI.

Erophila. Vårgæslingeblomst.

1. Skulpen m.m. linjeformet med parallelle sider, mindst 6 x så lang som bred ..... macrocarpa
   Skulpen ikke parallelsidet, under 5 x så lang som bred 2.
2. Bladene med mange enkle og kun få grenede hår ..... praecox
   " " " stjærne- og grenhår og 0-få alm. hår 3.
3. Skulpen højst 5mm, under 2 x så lang som bred .. spathulata
   " mest over 5mm, 2-5 x så lang som bred verna

Erophila verna (L.) Chev. Skulpen 5-11x1,3-4mm. 0-2100m. I-VI.

E. macrocarpa Boiss. Skulpen 7-14,5x1,1-1,9mm, ofte skævt krummet, tit længere end stilken. 0-1200m. sII-V. Nær Kalamata.

Erophila praecox (Steven) DC. Bægeret 1-1½mm. Skulpen 4-6mm. Skulpestilkene 2-12mm. III-IV.

E. spathulata Lang Bægeret ca. 1mm. Bladene med korte grenhår. Skulpestilkene 3-18mm. III-IV.

Camelina microcarpa Andrz. Småskulpet dodder. 20-60cm. Grålig enårig med pilformet bladgrund. Kronen lysegul, 2½-4½mm. Skulpen 5-7mm, hvælvet, omvendt ægformet. 0-1300m. V-VI.

Neslia apiculata Fischer & al. Spids rundskulpe. 15-60cm. Noget stjærnedunet enårig med pilformede stængelblade og 2mm lange, gule kronblade. Skulpen 2½-3x2½-3mm, noget netrynket og med 4 længderibber, tilspidset i en kort griffel. mIII-sV.

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Hyrdetaske. Kornen 2-3mm, ca. 2 x bægeret, hvid. 0-2400m. V-VII i bjærgene.

C. rubella Reuter Rødlig hyrdetaske. Kronen næppe længere end bægeret, ofte rødlig, i det mindste på kanten. 0-1300m. III-VIII.

C. grandiflora (Fauché & Chaub.) Boiss. Storblomstret hyrdetaske. 10-50cm. Kronbladene 4-5mm, ca. 2½ x bægeret. Skulpen dybt udrandet. 0-200m. IV-VI.

Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. Hindeskulpe. 5-15(-30)cm. Enårig med ugrenede hår. Nedre blade ofte 1 x fjersnitdelte. Kronen lidt længere end bægeret, 1½-3mm. Klasen åben. Skulpen 2-5mm, af foranderlig form, med gennemskinnelige klapper. Om. IV-V.

Hornungia petraea (L.) Rchb. Stenkarse. 2-12cm. Opret og grenet, stjærnehåret enårig med fjersnitdelte blade. Kronen ¾-1mm, ca. = bægeret. Skulpen 2-3mm. 0-2000m. II-fVI. PR,ME,KY,ER,PN.

Teesdalia coronopifolia (Berg.) Thell. Glat flipkrave. 4-10cm. Grundbladene oftest spidst fjerfligede. Kronbladene omtrent ens, af bægerets længde. Skulpen under 3mm, uden griffel.0-1300m.II-IV.

Thlaspi perfoliatum L. Hjærtebladet pengeurt. 10-20cm. Enårig. Blågrøn. Stængelbladene ægformede med afrundede øren. Skulpen 4-6½mm, omvendt hjærteformet og bredvinget. 300-2400m. IV-VI.

T. graecum Jordan Græsk pengeurt. 4-14cm. Oftest uden golde skud. Stængelbladene 6-11mm, finttandede, med 1mm store øren. Støvknapperne lilla. Flerårig. 1400-2300m. sIV-fVI. TA,PR,ME,OL,KY,KH,PN.

T. ochroleucum Boiss.& Heldr. Bleggul pengeurt. 10-20(-35)cm. Flerårig med golde skud. Kronbladene hvide, bleggule ved tørring. Støvknapperne gule. Griflen 2-3½mm. 1100-2100m. sIV-VI.

Aethionema. Tandtråd. Flerårig med helrandede blade. Skulpen bredvinget næsten hele vejen rundt.

A. cordatum (Desf.) Boiss. Gul tandtråd. 6-13cm. Bladene hjærteformede og stængelomfattende. Kronbladene gule, 6½-8mm. Skulperne ca. 6½x6mm, med et spidst hak foroven. 1900-2200m. VI-VII. KH.

A. carlsbergii Strid & Papanicolaou Blegrød tandtråd. 6-10cm. Bladene rundagtige til bredt elliptiske, nedre og mellemste modsatte. Kronen blegrød. Alle skulper enrummede, med et svagt hak foroven. 2100-2400M. VI-VII. TA.

A. saxatile (L.) R.Br. Alm. tandtråd. 4-15cm. Bladene rundagtige til aflange, de nedre ofte modsatte. Kronen hvid eller lyserød. Ihvertfald nogle (mest de nedre) skulper tverummede. 3 ssp.:
ssp. oreophilum Andersson & al.: Lidt forveddet forneden. Stængelbladene 2-4 x så lange som brede. Bægeret 1,8-2,5mm. Kronen 3-5 mm. Griflen 0,3-0,9mm. 400-2400m. V-VI. Udbredt.
ssp. graecum (Boiss.& Spr.) Hayek: Som foregående, men bægeret 2,3-3,3mm. Kronen 4-7(8½)mm. Griflen 0,8-2mm. Arakhneon.

ssp. creticum (Boiss.& Heldr.) Andersson & al.: Stærkt forvedet forneden. Stængelbladene 1½-2½ x så lange som brede.

Iberis. Sløjfeblomst. Skulpen bredt vinget med 2 store, trekantede takker foroven.

1. Stedsegrøn dværgbusk ..... 2.
   1-2-årig urt 3.
2. Bladene 1-2mm brede, halvtrinde på de golde skud saxatilis
   " 2½-5mm brede, flade sempervirens
3. Bladene fjerfligede med 1-2 par flige ..... odorata
   " helrandede til tandede pruitii

Iberis sempervirens L. Stedsegrøn sløjfeblomst, Snepude. 8-14 (-20)cm. Glat. Skulperne i klase. Skulpens takker trekantede. 1100-2100m. V-fVII. TA,PR,KH,ER,PN.

I. saxatilis L. Klippesløjfeblomst. 1½-7cm. Blomstrende skud og skulpestilke korthårede. Skulperne i klase. Skulpens takker afrundede. 1750-2300m. V-VI. KH.

I. pruitii Tineo (I. carnosa) Køllebladet sløjfeblomst. 4-12cm. 1-2-årig. Skulperne i halvskærm. Ydre kronblade 7-9mm, indre 4-6mm. 300-2500m. V-VII.

I. odorata L. Spidslappet sløjfeblomst. 15-30cm. Enårig. Skulperne i halvskærm, omgivne af de øvre blade. Kronbladene ret ens.

Biscutella didyma L. Enårig brilleskulpe. 15-30cm. Enårig med omvendt lancetformede blade. Lysegule blomster. Skulperne ligner et liggende ottetal, flade, 4½-7x9-12½mm. 0-1500m. I-IV.

Lepidium. Karse.

1. Stængelbladene med øret eller pilformet grund ..... 2.
   " " tilsmalnet grund 3.
2. 1-2-årig. Skulpen med skællignende blærer ..... campestre
   Flerårig. " håret hirtum
3. Skulpen 5-6mm, stærkt vinget foroven. 1-2-årig .. spinosum
   " 2-4mm, næppe vinget. Flerårig 4.
4. Bladene brede, op til 10cm lange ..... latifolium
   " lancet-linjeformede, op til 4cm lange graminifolium

Lepidium campestre (L.) R.Br. Salomons lysestage.0-1200m.V-VI.

L. hirtum (L.) Sm. ssp. nebrodense (Raf.) Thell. Håret karse. 5-20cm. Liggende til opstigende, mest gråfiltet. Skulpen 6-8 x 4-5mm, bredvinget, med 2 takker foroven. 1200-2000m. V-VI.

L. spinosum Ard. 10-40cm. Grenet foroven med udstående og stikkende grene. Grundbladene 2 x delte. Skulpens vinger forbundne med griflen. Skulpen glat. 0-500m. III-V.

L. latifolium L. Strandkarse. 0-1000m. VI-VII.

L. graminifolium L. Græsbladet karse. 40-80cm. Opret. Nedre blade m.m. fjerdelte, de øvre mindre og smalle, ofte nedadkrummede. Skulpen druekærneformet. 0-600m. V-X.

Cardaria draba (L.) Desv. Hjærteskulpet karse. 0-1000m. V-VII.

Coronopus squamatus (Forsskål) Asch. Ravnefod. 5-25cm. Liggende enårig med 1-2 x delte blade. Skulpen vortet, nærmest nyreformet, 2-3x3½-4mm. 0-800m. III-VI.

C. didymus (L.) Sm. Liden ravnefod. 5-25cm. Som den foregående, men skulpen netrynket, noget hen ad et liggende ottetal. III-V.

Conringia orientalis (L.) Dumort Hvidlig kålurt. 10-50cm, Glat, blågrøn enårig. Stængelbladene omvendt ægformede til elliptiske. Kronen gullighvid. Skulpen 6-14cm, firkantet i tværsnit. 0-1200m. V-VI. I kornmarker.

Diplotaxis muralis (L.) DC. Mursennep. Kronbladene 4-7½mm. Blomsterstilkene 4-10mm. 0-1000m. V-IX.

D. viminea (L.) DC. Stinkende mursennep. 5-25cm. Enårig. Bladene i roset. Kronbladene 3-4mm, kun lidt længere end bægeret. Blomsterstilkene 1-2mm. 0-800m. II-VI.

Brassica. Kål.

1. Øvre blade med stængelomfattende grund ..... 2.
" " uden " " 3.
2. Flerårig ..... cretica
1-2-årig rapa
3. Skulperne oprette, tiltrykte aksen ..... nigra
" udstående til opret-udstående tournefortii

Brassica cretica Lam. Forveddet forneden. Bladene glatte, svagt læderagtige, stænglens fjerdelte. 0-1500m. III-V. 3 underarter:
ssp. laconica Gustafsson & Snogerup: Ret lav, grenet fra nær grunden. Grundbladene stilkede, dybt fligede eller snitdelte nederst med runde lapper. Kronen hvidgul til bleggul. Frøene netårede.
ssp. nivea (Boiss.& Spr.) Greuter & Burdet: Ret høj, mest grenet foroven. Grundbladene langstilkede, snitdelte forneden eller udelte. Kronen mest hvid. Frøene netårede. NØ-Pelop.
ssp. cretica: Mest ret lav, grenet fra grunden. Grundbladene kortstilkede (sj. siddende), fligede til udelte. Kronen mest gul. Frøene svagt netårede. Kystområder.
(Disse beskrivelser stammer fra Willdenowia 15 s.64, men stemmer ikke med Kretafloraen. Her kaldes nivea for cretica og cretica for aegaea).

B. rapa L. Agerkål. 0-1000m. III-X.

B. nigra (L.) Koch Sort sennep. 0-800m. II-V.

B. tournefortii Gouan Smalfliget kål. 30-50cm. Nedre blade fjerfligede med 5-8 par sidelapper. Kronen 5-7mm, bleggul, ofte med lillaanløben grund. Skulpens næb 6-15mm. 0-400m. II-V.

Sinapis arvensis L. Agersennep. Skulpens næb lidet sammentrykt.

S. alba L. ssp. alba Gul sennep. Skulpens næb stærkt sammentrykt.

Eruca vesicaria (L.) Cav. 20-80cm. Oftest stivhåret enårig. Bladene lyreformede. Kronbladene 15-20mm, hvidlige eller gullige med lilla årer. Skulperne oprette, med sværdformet næb. Bægeret blivende. Alle bægerblade med hætteformet spids. 0-800m. II-IV.

E. sativa Miller Som foregående, men bægeret affaldende; de indre bægerblade uden hætteformet spids. 2 underarter?:
ssp. sativa: Næbbet m.m. brat tilsmalnet mod spidsen. ?
ssp. longirostris (Uechtr.) Maire: Næbbet jævnt tilsmalnet mod spidsen.

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-F. Bastardsennep. 10-50cm. Tæthåret 1-2-årig. Nedre blade lyreformede til fjerfligede. Kronen 6-9 mm, bleggul, ofte mørkåret. Den blomstrende del af klasen hovedformet sammentrængt. Skulperne noget tiltrykte. 0-800m. IV-V.

Carrichtera annua (L.) DC. Skeskulpe. 10-40cm. Enårig. Skulperne 3-4mm, hvælvede, hver klap med 3 stivhårede årer. Skulpen desforuden med et skeformet næb på 4-6mm. 0-300m. II-IV.

Erucaria hispanica (L.) Druce Kærvskulpe. 20-60cm. M.m. glat 1-2-årig. Bladene 1-2 x smalfligede. Kronen 12-15mm. Skulpen 1-2cm, 3-5-ribbet, knudret, med et led midtpå. 0-300m. III-V.

Cakile maritima Scop. ssp. aegyptiaca (Willd.) Nyman Strandsennep. Om. VI-VIII.

Rapistrum rugosum (L.) All. Enårig knopskulpe. 15-60cm. Enårig. Øvre skulpeled brat tilsmalnet i et næb på 1-3mm, eller æg- til kugleformet og 3-6mm langt; nedre skulpeled smalt og cylindrisk.

ssp. linnaeanum Rouy & Fouc.: Øvre led kun svagt ribbet og rynket.
ssp. orientale (L.) Arc.: Øvre led stærkt ribbet og rynket.

Didesmus aegyptius (L.) Desv. Hvid knopskulpe. 10-40cm. Svagt stivhåret enårig. Ligner en hvidblomstret Knopskulpe. Skulpen 6-10mm, dens næb $2\frac{1}{2}$-4mm. 0-550m. sIII-VI. Elafonisi, Kythæra.

Crambe hispanica L. Enårig strandkål. 20-100cm. Enårig. Bladene stivbørstede, med hjærteformet endedel og 0-2 par små sidelapper. Kronen 3-4mm. Øvre skulpeled kugleformet. 0-350m. III-V.

Calepina irregularis (Asso) Thell. Netskulpe. 20-40cm. Glat og svagt blågrøn enårig med lyreformede grundblade og stængelblade med pilformet grund. Kronbladene uens, de ydre 2mm, de indre $2\frac{1}{2}$-3mm. Skulpen 2mm, kugleformet, netåret som tør. 0-500m. III-V.

RESEDACEAE

Reseda. Reseda.

1. Nedre blade med 5-15 par sideflige. 4 kapselspidser .. alba
   Bladene højst med 1-2(4) par sideflige. 3 kapselspidser 2.
2. Alle blade hele. 4 bæger- og kronblade ..... luteola
   Nogle blade delte. 5-6 bæger- og kronblade 3.
3. De fleste blade delte. Kronbladene hele til 3-lappede lutea
   Nogle øvre blade delte. Kronbladene 5-mangelappede 4.
4. Bægerbladene øges i frugt fra 3-5mm til 6-12mm ... phyteuma
   " " kun lidt, højst 8mm i frugt tymphaea

Reseda luteola L. Farvereseda. 0-800m. IV-mVI.

R. alba L. Hvid reseda. 25-80cm. Alle blade mangefligede. Kronen hvid. Kapslen m.m. udstående. 0-500m. III-V.

R. lutea L. Gul reseda. 0-800m. sIII-VI.

R. phyteuma L. Rapunselreseda. 10-40cm. Nedre blade spatelformede; nogle af de øvre med 1-2 par flige. Kronbladene grønlighvide. Kapslen noget pære- til valseformet, nikkende som moden. 0-900m. IV-VI. Sj.

R. tymphaea Hausskn. 20-40cm. Nedre blade ofte 10-20x$1\frac{1}{2}$-3cm. Kapslen omvendt ægformet eller med næsten kvadratisk omrids, nikkende som moden. 200-1100m. IV-VI. Sj.

CRASSULACEAE

Crassula. (Tillaea). Korsarve. Småplanter med modsatte, sammenvoksede, ofte rødlige blade. 3-4-talsblomster.

C. tillaea Lester G. (Tillaea muscosa) Moskorsarve. 1-8cm. Mosagtig plante med 2mm lange, ægformede, tætsiddende, konkave blade, der får hele stænglen til at ligne et lille aks. Blomsterne siddende, mest 3-tallige. 0-400m. III-V. Spredt.

C. alata (Viv.) Berger Trind korsarve. 3-10cm. Udstrakt til opret. Bladene 3-7mm, m.m. trinde, lancetformede, brodspidsede. Blomsterne kortstilkede. Kronen kortere end bægeret. 0-700m. III-V. Sydspidsen af Mani-halvøen.

C. vaillantii (Willd.) Roth Rødblomstret korsarve. 2-6cm. Bladene linje-spatelformede, butte, 2-4mm, ej tætstillede, grønne eller rødlige. Blomsterstilkene længere end bladene. Kronen lyserød, længere end bægeret. 0-500m. IV-V. Sj.

Umbilicus. Navleblad. Flerårige med glatte, runde og ofte skjoldformede blade. Blomsterne med kronrør, i klase eller top.

1. Kronfligene lig eller længere end røret ..... 2.
   " betydeligt kortere " " 3.

2. Blomsterne 9-13mm. Kronfligene ca. = røret ..... erectus
" 3-4mm. Kronfligene længere end røret chloranthus
3. Kronfligene tilspidsede. Blomsterne vandrette horizontalis
" brodspidsede. " mest nikkende rupester

Umbilicus chloranthus Heldr.& Sart. Småblomstret navleblad. Blomsterne vandrette eller noget hængende, klokkeformede til runde, gule. Grundbladene ofte lidt skjoldformede. V.

U. erectus DC. Storblomstret navleblad. 20-60cm. Blomsterne meget talrige, m.m. oprette, grønliggule. Grundbladene indtil 7cm brede, nyre- til hjærteformede. 0-800m. V-VI.

U. rupester (Salisb.) Dandy Nikkende navleblad. 20-50cm. Blomsterne 7-10mm, hvidliggrønne til stråfarvede, med ægformede kronflige. 0-1200m. III-VI.

U. horizontalis (Guss.) DC. Udspærret navleblad. 20-50cm. Blomsterne (4-)7mm, rødlige, med lancetformede kronflige. III-VI.

Rosularia serrata (L.) A.Berger 10-18cm. Grundbladene 2-3cm, aflangt spatelformede, glatte, finttandede til næsten helrandede. Toppene sidestillede. Kronen 6-8mm, med kronrør, lyserød til hvidlig. 50-2000m. V-VI.

Sempervivum marmoreum Griseb. Hvidkantet husløg. 10-20cm. Rosetterne indtil 6cm brede, med tæt kirteldunede kanter og ofte også sider. Kronbladene tæt kirtlede, røde med hvide kanter. 1300-2300 m. VII-VIII. KY,KH,ER.

Sedum. Stenurt.

1. Blomsterne gule eller bleggule ..... 2.
" overvejende hvide eller lyserøde 7.
2. Bælgkapslerne oprette ..... 3.
" m.m. udstående 4.
3. Golde skuds blade hindeagtigt udvidede forneden tenuifolium
" " " trinde hele vejen sediforme
4. Bægerbladene ikke sammenvoksede med blomsterbunden .... acre
" helt " " " 5.
5. Bladene m.m. spidse, med klare vorter i spidsen .. laconicum
" butte, uden vorter i spidsen 6.
6. Flerårig. Kronen mindst 2 x bægeret ..... sartorianum
Enårig. Kronen 1-1½ x bægeret litoreum
7. Bladene tilspidsede ..... ochroleucum
" butte eller spidse 8.
8. Kvastene sidestillede, udgår fra bladrosetten .. tristriatum
" endestillede 9.
9. Bladene flade ..... 10.
" trinde til halvtrinde 12.
10. Bladene i kranse på 4, i hvert fald forneden ..... cepaea
" modsatte eller spredte 11.
11. Bladene helrandede. Flerårig ..... magellense
" tandede. Enårig stellatum
12. Bladene m.m. modsatte ..... dasyphyllum
" spredte 13.
13. Lige så mange støvdragere som kronblade ..... 14.
2 x " " " " " 15.
14. Bladene 3-6mm ..... caespitosum
" 10-20mm rubens
15. Blomsterne 6-7(-9)-tallige ..... hispanicum
" 5-tallige 16.
16. Helt glat enårig med grønlighvide blomster ..... atratum
Mest 2-flerårig. Hvide eller lyserøde blomster 17.
17. Kronbladene lyserøde, langt tilspidsede ..... pallidum
" mest hvide, lancetformede album

Sedum sediforme (Jacq.) Pau Høj stenurt. 20-40cm. Bladene oftest blågrønne, noget kølleformede. Topgrenene stærkt buekrummede. 0-1000m. V-VII.

Sedum ochroleucum Chaix Bleggul stenurt. 15-30cm. Blomsterne i en mest 4-grenet, kirteldunet halvskærm. Kronbladene oprette under blomstringen. 800-1700m. VI-VII.

S. tenuifolium (Sm.) Strobl (S. amplexicaule) Børstestenurt. 6-30cm. Golde skuds visne blade siddende sommeren over. Kvasten mest 2-grenet. 0-2100m. VI-VII. TA,PR,KH m.m.

S. acre L. Bidende stenurt. 0-2400m. VI-VII.

S. sartorianum Boiss. (S. urvillei) Skællet stenurt. -20cm. Helt glat. Bladene noget blågrønne, halvtrinde, med en bred, afskåret, hvidlig spore. Kvasten med ca. 7 blomster. VI-VIII.

S. laconicum Boiss. Rødåret stenurt. 1-15cm. Helt glat. Bladene noget blågrønne, m.m. trinde, med en kort, smal spore. Blomsterstanden sammentrængt med 3-9 blomster. -2000m. V-VI. 2 ssp.: ssp. laconicum: 4-15cm. Oftest med flere ekstra kvaste. ssp. insulare (Rch.f.) Greuter & Rech.f.: 1-4(-6)cm. Undertiden med 1-2 ekstra kvaste. Kvastene med 2-6 blomster. 1500-2200m.

S. album L. Hvid stenurt. 0-2500m. VI-VIII.

S. dasyphyllum L. Tykbladet stenurt. 3-8cm. Oftest helt kirteldunet. Bladene blåduggede, ægformede, 1-1½ x så lange som brede. Kvasten med mest 2 grene og 3-10 blomster. 0-2400m. VI-VII.

S. magellense Ten. 6-15cm. Helt glat, friskgrøn og skinnende. Blomsterne i en smal klase eller dusk. Oprette bælgkapsler. 1600-2500m. V-VII. TA,PR,ME,KY,KH,ER.

S. tristriatum Boiss.& Heldr. Trestribet stenurt. 2-10cm. Roset plante. Tæt kirteldunet overalt. Kronbladene hvide eller lyserøde med mørkere striber, tilspidsede. 600-2200m. VI-VII. TA,PR.

S. cepaea L. Topstenurt. 15-30cm. Blomsterne hvide med rød åre, i en lang top, der indtager det meste af stænglen.0-1500m.V-VII.

S. atratum L. Mørk stenurt. 2-12cm. Glat, mørkegrøn, ofte rødligt anløben. Blomsterne i en tæt kvast med 2-4 grene og 3-12 blomster. 1900-2700m. VI-VII. KY,KH.

S. stellatum L. (Phedimus s.) Stjærnestenurt. 3-15cm. Bladene 10-15mm, m.m. rundagtige, de nedre ofte modsatte. Blomsterne lyserøde. 0-800m. IV-V.

S. litoreum Guss. Bleg stenurt. 4-15cm. Bladene 10-20mm, noget flade. Kronen bleggul. Blomsterstilken tyk og kødet, ca. 2mm. 0-1700m. V-VI.

S. rubens L. Rødlig stenurt. 5-12cm. Noget blågrøn og ofte rødlig enårig. Kirteldunet. Kronbladene 6mm, skarpt tilspidsede, hvide eller lyserøde. 0-2400m. VI-VIII.

S. caespitosum (Cav.) DC. Brodkronet stenurt. 2-5cm. Glat, ofte rødlig enårig. Blomsterne 4-5-tallige. Kronbladene 3mm, brodspidsede, hvide med lyserødt skær. 0-800m. IV-V.

S. hispanicum L. Grå stenurt. 7-15cm. Bladene 7-18mm, blågrønne, glatte eller kirtlede, med klare vorter i spidsen. Hvide blomster. 1-flerårig. Bælgkapslerne lysebrune. 0-2300m. VI-VIII.

S. pallidum Bieb. Rødkapslet stenurt. Nær foregående, men mest glat. Bælgkapslerne mørkerøde og kirtelknudrede. VI-VIII.

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga. Stenbræk.

1. Grundbladene tydeligt stilkede ..... 2.
   Alle blade m.m. siddende 7.
2. Enårige med liggende til opstigende stængel ..... 3.
   Flerårige med opret stængel 4.
3. Kronbladene hvide. Bægeret opret eller udstående hederacea
   " gule. Bægeret nedadrettet sibthorpii

4. Frugtknuden undersædig. Grundbladene kirtelhårede ... graeca
" oversædig. " ej " 5.
5. Større blade ca. 25mm brede, med 5-11 takker ..... taygetea
" " over 25mm brede, med mindst 15 takker 6.
6. Bladene uden bruskrand ..... chrysospleniifolia
" med " rotundifolia
7. Bladene med 3-5 tænder eller lapper fortil ..... 8.
" helrandede, sjældent fint savtakkede 10.
8. Flerårig, med golde skud ..... exarata
1-2-årig, uden " " 9.
9. 1-årig. Nedre blade visne under blomstringen tridactylites
2-årig. " " friske " " adscendens
10. Kronbladene rødlilla ..... sempervivum
" hvide eller blegrøde 11.
11. Bladene fint savtakkede. Blomsterne i top ..... paniculata
" helrandede. Blomsterne i en kort kvast 12.
12. Bladene tydeligt spidse, kølede, rukantede i øvre ½ scardica
" m.m. butte, med jævn kant i øvre halvdel marginata

Saxifraga rotundifolia L. Rundbladet stenbræk. 15-40cm. Bladpladen m.m. rund eller nyreformet, rund- til groft savtakket. Bladstilken ikke udvidet foroven. Prikkede kronblade. V-fVIII. KY,KH.

S. chrysospleniifolia Boiss. Milturtsstenbræk. 20-45cm. Bladene som hos foregående, men bladstilken udvidet foroven, med 11-17 takker. Kronbladene svagtprikkede. 500-1500m. sIII-sVI.

S. taygetea Boiss.& Heldr. Rundtakket stenbræk. Mest 10-20cm. Toppen med 3-12 småprikkede blomster. 1800-2400m. VI-VIII. TA,KH,KY

S. hederacea L. Vedbendstenbræk. 5-15cm. Spinkel, stærktgrenet, lidt kirtelhåret. Bladene tynde, svagt og spidst 3-5-lappede, noget hen ad Vedbendærenprises. 200-1550m. IV-V.

S. sibthorpii Boiss. Guldstenbræk. 3-10cm. Stænglen liggende, glat eller fåkirtlet. Bladene skinnende, nyreformede, med 3-5 lapper. Kronbladene gule med orange prikker. 1800-2350m. TA,KY,KH,ER.

S. tridactylites L. Trekløftstenbræk. Kronen 2-3mm. IV-VIII.

S. adscendens L. ssp. parnassica (Boiss.& Heldr.) Hayek Opstigende stenbræk. Kronen 3-5mm. Blomsterstilkene sjældent over 1½ x bægeret. 1700-2400m. VI-VIII. ME,OL,KY,KH,PN.

S. exarata Vill. Furet stenbræk. 1-7cm. Gulgrønne puder med mørke, døde blade under. Bladene med 3-5 lapper, ofte furede ovenpå. Kronbladene gulgrønne til hvide. 100-2900m. V-mVIII. KY,KH,ER.

S. graeca Boiss. Rundlappet knoldstenbræk. 20-40cm. Med knoldformet grund. Tyk stængel. Grundbladene kortstilkede, med 7-9 butte lapper. Kronbladene kirtelhårede. 500-1000m. IV-VI.

S. marginata Sternb. Kantet stenbræk. 3-10cm. Grundbladene m.m. forkalkede, randhårede i nedre ½, hindekantede i øvre halvdel. Kronbladene 10-15mm. 1100-2300m. mV-fVII. TA(Prof.Ilias,Xerovuna)

S. scardica Griseb. Kølstenbræk. 4-15cm. Som foregående, men kronbladene 9-10mm. 400-2900m. fV-mVII. KY,KH.

S. sempervivum C.Koch Husløgsstenbræk. 6-15cm. Grundbladene grågrønne, smalt hindekantede, 5-15x1½-2½mm. 6-16 blomster i en akslignende, først nikkende klase. 1600-2900m. V-mVII. TA,KY,KH,ER.

S. paniculata Miller Klippestenbræk. 15-25cm. Bladene grågrønne, m.m. forkalkede, med krumme tænder. Blomsterne hvide, i en kirteldunet top. 1600-2500m. mVI-mVIII. ER.

PARNASSIACEAE

Parnassia palustris L. Leverurt. 600-2100m. VII-IX. KH.

GROSSULARIACEAE

Ribes multiflorum Kit. Mangeblomstret ribs. 1½-2m. Bladene ca.

10x10cm, mest glatte. Klaserne hængende, med 30-50 gulgrønne blomster. Bærret rødt. 1000-1800m. V-VII.

Ribes uva-crispa L. ssp. austro-europaeum Bornm. Stikkelsbær. Underarten lav og småbladet. -2100m. V-VII. TA,KY,KH,ER.

PLATANACEAE

Platanus orientalis L. Fliget platan. 15-30m. Bladene hen ad Spidsløns, men spredte, lappede til over midten, med kileformet grund. 0-1200m. III-V.

P. hybrida Brot. Alm. platan. Som foregående, men bladene højst lappede til midten, med afskåret eller hjærteformet grund. Plantet.

ROSACEAE

Rubus idaeus L. Hindbær. Gl. fund fra 1908: M.Durduvana.

R. sanctus Schreber (R. ulmifolius) 1-2m. Årsskuddene blådugge-de, mest gådunede, ukirtlede, med kraftige og ensartede torne. Blomsterne mest lyserøde. 0-1150m. V-X.

R. canescens DC. Kilebrombær. Årsskuddene glatte eller dunede, med stilkkirtler, med svage og uens torne. Endesmåbladet kile- til rudeformet. Blomsterne hvide. 0-1800m. V-fVIII.

Rosa. Rose.

1. Griflerne sammenvoksede til en søjle. Klatrende stængel 2.
" frie 3.
2. Bladene stedsegrønne og læderagtige ..... sempervirens
" løvfældende og urteagtige arvensis
3. Bladundersiden tæt kirtlet ..... 4.
" uden eller med få kirtler 7.
4. Småbladene med kileformet grund ..... agrestis
" " afrundet grund 5.
5. Bladundersiden ikke klæbrig ..... squarrosa
" m.m. " 6.
6. Hyben og hybenstilke glatte ..... sicula
" " " kirtelbørstede til -dunede glutinosa
7. Bladundersiden gråfiltet ..... heckeliana
" ikke filtet 8.
8. Bladundersiden uden kirtler ..... canina
" med " squarrosa

Rosa sempervirens L. Stedsegrøn rose. 1-3m. Bladene skinnende. Kronen hvid. Hybenet ca. 1cm, kugle- til bredt ægformet, rødt. Bægerbladene mest helrandede. 0-500m. V-VI.

R. arvensis Hudson Hvid slyngrose. ½-3m. Bladene matte. Kronen hvid. Ydre bægerblade fligede. Hybenet 10-16mm, kugle- til æg-formet, rødt. 0-1800m. V-VII. PR,KY,KH,PN.

R. canina L. Glat hunderose. 0-1700(-2000)m. VI.

R. squarrosa (Rau) Boreau Kirtelfliget hunderose. Fodflige, bladstilke og -skafter tæt kirtlede. Griflerne langt udragende.

R. heckeliana Tratt. Gråstilket filtrose. Stænglerne tit m.m. dunede. Småbladene små, 5-20mm. Hybenstilken 1-5(-8)mm, oftest tæt dunet. 1700-2350m. VI-fVIII. TA,PR,KY.

R. agrestis Savi Lugtløs æblerose. Hybenstilken mest glat. Hy-benbægeret nedbøjet og affaldende. Griffelmundingen under 1mm bred. 300-1800m. mV-VI. KH,ER m.m.

R. glutinosa Sm. (R. pulverulenta) Klæbrig rose. Stænglen ofte med torne, børster og kirtelbørster. Hybenbægret opadrettet og blivende. Griffelmundingen mest over 1mm. 800-2200m. TA,KH,ER.

R. sicula Tratt. Siciliansk rose. Nær foregående.

Agrimonia eupatoria L. Alm. agermåne. 0-1000m. VI-VII.

Aremonia agrimonoides (L) DC. Lav agermåne. 5-35cm. En mindre agermåne med 2-3 blomster sammen i en løs kvast. Blomsterbunden uden børster. 500-2000m. V-VI. 2 underarter:
ssp. agrimonoides: De 3 endesmåblade meget større end resten. Kronbladene 4-5mm. Blomsterbunden 5-6mm og kugleformet.
ssp. pouzarii Skalický: 3-4 par m.m. ens småblade. Kronbladene 6-8mm. Blomsterbunden 7-8mm og ellipsoidisk.

Sanguisorba minor Scop. Bibernelle. IV-VI. 0-2100m. 3 ssp.:
ssp. magnolii (Spach) Briq.: (ssp. verrucosa): Vortet bibernelle. Underbægret næppe kantet, stærkt vortet.
ssp. minor: Blodstillende bibernelle. Underbægret kantet, med netårede sider.
ssp. muricata Briq.: Vingefrøet bibernelle. Underbægret vinget, med grubet-vortede sider.

Sarcopoterium spinosum (L.) Spach Tornbibernelle. 30-60cm. Lille tornet busk med blomsterstande som Bibernelles omend mindre. Mindre blade med 9-15 småblade på 4-6mm. 0-1200m. III-V.

Geum urbanum L. Febernellikerod. 500-1900m. V-VII.

Potentilla. Potentil.

1. Kronen hvid til bleggul. Bladene 3-koblede ..... 2.
" gul. Flere småblade 4.
2. Kronbladene 7-10mm, med en lang negl, bleggule ... speciosa
" 3-6mm, uden eller med en kort negl, hvide 3.
3. Stænglerne uden kirtelhår. Kronen = bægeret ..... micrantha
" kirtlede. Kronen længere end bægeret arcadiensis
4. Bladene finnede ..... supina
" fingrede 5.
5. Stænglerne krybende og rodslående ..... reptans
" ikke rodslående 6.
6. Bægerbladene langt tilspidsede, ca. = kronen ... detommasii
" spidse, kortere end kronen 7.
7. Kronen 7-9mm. Spinkel, ofte med flere opst. stængler pedata
" 9-12mm. Kraftig, ofte med 1 opret stængel recta

Potentilla detommasii Ten. Stjærnepotentil. 20-30cm. Småbladene afrundet savtakkede, silkelådne nedenunder. Kvasten ret tæt. Kronbladene 12-14mm. 1000-1800m. V-VII.

P. pedata Nestler Bladene spredt gråhårede på begge sider, savtakkede. 1600-2000m. V-VII.

P. recta L. Rank potentil. Bladene m.m. grønne på begge sider, svagt indskåret-tandede. V-VII.

P. supina L. Sandpotentil. 10-40cm. Grundbladene med 2-5 par småblade, de øvre ofte trekoblede. Kronen kortere end bægeret. 1-fåårig. Kronbladene 2½-3mm. 0-800m. VI-IX.

P. reptans L. Krybende potentil. 0-1900m. V-IX.

P. speciosa Willd. Kløverpotentil. 6-20cm. Bladene hvid- til gråfiltede på begge sider, mest 8-30x5-18mm. Nedre stængler dækkede af døde bladrester. 1700-2400m. mVI-fIX. TA,ME,OL,KY,KH,ER.

P. arcadiensis G. Iatru 10-25cm. Tæthåret og flerstænglet. Blomsterstanden mangeblomstret. Kronbladene 4½-6mm. 550m. PR (Mon.Elona over Leonidion).

P. micrantha Ramond Fyrrepotentil. 1-5cm. Ligner Skovjordbær i blomst, men mest uden udløbere. Stænglerne 1-2-blomstrede, kortere end bladene. Bægeret rødt. 0-1500m. II-V.

Fragaria vesca L. Skovjordbær. 400-2100m. IV-VI.

Alchemilla indivisa (Hayer) Rothm. -59cm. Alle bladstilke udstående hårede. Stænglen tæt udstående håret forneden, glat foroven. Blomsterne 4mm brede. 1650-2100m. KH.

Alchemilla aroanica (Buser) Rothm. -37(-70)cm. Ydre bladstilke m.m. glatte, de indre med opret-udstående hår. Stænglen tæt håret op til topgrenene. Blomsten stor, indtil 6½mm bred. 1800-2000m. KH (Styx-kløften, især ved foden af vandfaldet). VI.

Aphanes arvensis L. Alm. dværgløvefod. 0-1300m. IV-VI.

Cydonia oblonga Miller Kvæde. 1½-5m. Bladene ægformede, helrandede, med filtet underside. 5-10cm. Blomsten lyserød. Frugten 2½-3½cm, æble- eller pæreformet, gul og filtet. IV-V. Forvildet.

Pyrus pyraster Burgsd. Vild pære. 0-1400m. IV-V.

P. amygdaliformis Vill. (P. spinosa) Mandelpære. 1-6(-20)m. Bladene m.m. lancetformede, 2½-5x1-2cm, mest helrandede, svagt hårede som unge. Unge kviste hvidfiltede. Frugten 1½-3cm, mest kuglerund, gulbrun. 0-1100m. IV-V.

P. elaeagnifolia Pallas Gråbladet pære. Busk til lille træ. Tornede grene. Kvistene gråfiltede. Bladene 3½-8x2-3½cm, m.m. lancetformede, med tæt gråhvidt filtet underside. Frugten 2-3cm bred, pære- til kugleformet. IV-V.

Malus domestica Borkh. Sødæble. IV-V. Dyrket og forvildet.

Malosorbus florentina (Zucc.) Browicz (Malus f.) Rønneabild. -10m. Kvistene m.m. hårede. Bladene indtil 5x3½cm, bredt ægformede, med 4-6 par spidse, ofte savtakkede lapper, indtil 1/3 dybe; med ofte hjærteformet grund, grågrønne og noget hårede nedenunder. Frugten -1½cm, rund til aflang, rød eller gul. TA,PR.

Sorbus. Røn.

1. Bladene fjersnitdelte ..... domestica
   " hele til lappede 2.
2. Bladene med 3-6 par spidse lapper ..... 3.
   " svagt lappede til tandede, undersiden filtet 4.
3. Bladundersiden dunet som ung, siden glat ..... torminalis
   " håret til filtet Malosorbus florentina
4. Bladene med 4-5 par ribber ..... umbellata
   " " 7-14 par ribber 5.
5. Bladene bredest på eller under midten ..... aria
   " " over midten graeca

Sorbus domestica L. Storfrugtet røn. 8-15m. Ligner Alm. røn, men barken ru. Fåblomstret halvskærm. 5 grifler. Frugterne 1½-3 cm, pæreformede, grøn- eller brunlige. 0-800m. IV-V.

S. torminalis (L.) Cr. Tarmvridrøn. 0-800m. IV-V.

S. aria (L.) Cr. Sydlig akselrøn. -15m. Bladene 5-12cm, med hvidfiltet underside, dobbelt savtakkede eller svagt lappede, med oftest m.m. rundet grund. Frugten mest aflang. 1250-2150m.V.

S. graeca (Spach) Kotschy (S. cretica) Græsk røn. -5m. Bladene 5-7cm, med kileformet grund, ellers som hos ovenstående. Frugten mest kugleformet. 1300-2000m. V-VII. TA,KY.

S. umbellata (Desf.) Fritsch ssp. umbellata Gul røn. Busk eller lille træ. Bladene 4-7cm, svagt lappede eller groft tandede i øvre 1/2-1/3, ellers ofte helrandede. Frugten gullig-orange. 1300-2200m. VI. TA,KH,ER.

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindley Japansk mispel. Lille træ op til 10m. Bladene 12-25cm, bredt lancetformede, tandede, med rødbrunt filtet underside. Toppen tæt rødbrunt filtet. Frugten 3-6cm, orangegul, ellipsoidisk. X-II. Dyrket og forvildet.

Amelanchier ovalis Med. ssp. cretica (Willd.) Maire & Petitm. Europæisk bærmispel. 1-3m. Busk med sorte grene og savtakkede blade med afrundede ender og uldhåret underside som ung, rundagtige til bredt ægformede, 2-7cm. Frugten rund, 6-8mm, blåsort. 1100-2200m. IV-VI.

Amelanchier chelmea (Hal.) Browicz -2m. Kvistene hvidfiltede. Bladene 10-25x7-22mm, ægformede til rundagtige, m.m. rundede i begge ender, takkede, vedvarende hvidfiltede nedenunder. Frugten ca. 5mm bred. 1100-1700m. V-VI. TA,KH,KY.

Cotoneaster integerrimus Med. Rød dværgmispel. ½-1½m. Bladene 2-5cm. Underbægret m.m. glat. Frugten glat. Kvastene med 2-3 (1-4) blomster. 1700-2100m. V-VI. ER.

C. nebrodensis (Guss.) C.Koch Filtet dværgmispel. 1-3m. Bladene 3-6cm. Underbægret og frugten filtet. Kvastene med 3-12 blomster. 1200-2200m. V-VI. KY,KH.

Pyracantha coccinea M.J.Roemer Ildtorn. ½-2m. Stærkttornet busk. Bladene stedsegrønne, omvendt lancetformede, 2-4cm, skinnende ovenpå, helrandede til fåtandede. Røde bær. 0-900m. IV-V.

Crataegus. Tjørn.

1. Mest med 3-5 grifler ..... 2.
" " 1-3 " 5.
2. Bladene silkehårede ..... 3.
" uldhårede (altså med bugtede hår) 4.
3. Kvastene med 3-7 blomster. Bladene m.m. ensfarvede pycnoloba
" " 6-16 " . " m.m. tofarvede, med oversiden mørkere grågrøn end undersiden peloponnesiaca
4. Frugten 8-15mm. Bægerblade 1,8-4,9mm. Kronen 4-9mm orientalis
" 6-8mm. Bægerbl. 1,1-2,8mm. Kronen 4-6mm heldreichii
5. Bladundersiden spredt tiltrykt dunet. Gullig frugt azarolus
" tæt uldhåret eller m.m. lådden. Rød frugt 6.
6. Blomstrende skuds ydre blade med 3-16 tænder på hver grundflig. De fleste fodflige med 4-16 tænder kyrtostyla
Blomstrende skuds ydre blade med 0-9 tænder på hver grundflig; deres fodflige helrandede (1-8-tandede) 7.
7. 1(2) grifler. Kvistene glatte eller lådne ..... monogyna
1-3 " . " uldhårede eller uldhåret-lådne 8.
8. Blomstrende skuds ydre blades grundflige indtil 4,2 x så lange som brede. Frugten 8-13mm lang ..... albanica
Blomstrende skuds ydre blades grundflige indtil 2,4 x så lange som brede. Frugten ca. 9mm lang killinica

Artsbeskrivelserne findes på s. 222.

Prunus.

1. Frugtknude og frugt håret ..... 2.
" " " glat 5.
2. Bladene bredt ægformede til rundagtige ..... armeniaca
" mindst 2 x så lange som brede 3.
3. Bladene 6-9mm brede. Frugten 2-2½cm ..... webbii
" 12-40mm brede. Frugten mindst 3½cm 4.
4. Bladene bredest i øvre halvdel ..... persica
" " i nedre " dulcis
5. Blomsterne i en kort halvskærm ..... mahaleb
" enlige eller i siddende skærme 6.
6. Frugtstilken mindst 2 x den modne frugt ..... 7.
" højst lidt længere end den modne frugt 8.

7. Bladene enkelt savtakkede, skinnende ovenpå ..... cerasus
" dobbelt " , matte ovenpå avium
8. Bladene 3 x så lange som brede, 6-8 x stilken ..... persica
" 1½-2 x så lange som brede; stilken længere 9.
9. Bladene mest 9-12mm. Lyserød krone ..... prostrata
" 2-8cm. Hvid krone 10.
10. Bladene helt glatte ..... cocomilia
Ihvertfald undersidens ribber hårede 11.
11. Unge kviste skinnende og glatte ..... cerasifera
" " matte, oftest hårede 12.
12. Barken sortagtig. Bladene 2-4cm ..... spinosa
" brun. Bladene 3-8cm domestica

Prunus persica (L.) Batsch (Persica vulgaris) Fersken. Kantede, rødlige kviste. Bladene noget brunliggrønne. Dyrket, sj. forv.

P. dulcis (Miller) Webb (Amygdalus communis) Mandel. Bladene lancetformede, 5-6x1½-2cm. Vildformerne tornede. Dyrket og forv.

P. webbii (Spach) Vierh. (Amygdalus w.) Rødblomstret mandel. 1-3m. Bladene 3½cm x 9mm eller mindre. II-III. 0-900m.

P. armeniaca L. (Armeniaca vulgaris) Abrikos. Unge blade og kviste rødlige. Bladgrunden afskåret eller lidt hjærteformet.

P. cerasifera Ehrh. (P. divaricata) Mirabel. 0-800m. III-IV.

P. spinosa L. ssp. dasyphylla (Schur) Domin Slåen. Underarten har kvistene og bladundersiderne vedvarende filtede. III-IV.

P. domestica L. Blomme. Dyrket og forvildet.

P. cocomilia Ten. Bjærgblomme. 2-5m. Helt glat. Bladene elliptiske-omvendt ægformede, 2½-4x1-2½cm, fint rundtakkede. Frugten 12-40mm, aflang, gul med rødligt skær. 800-1500m.

P. prostrata Labill. (Cerasus p.) Lavt kirsebær. 20-50(-150)cm. Bladene mest 9-12x3-6mm, omvendt ægformede til elliptiske, savtakkede, især i forreste halvdel. Bladundersiden m.m. filtet, sjældent glat. 1300-2100m. V. TA,KY,KH.

P. avium L. (Cerasus a.) Fuglekirsebær. 0-1500m. IV-V.

P. cerasus L. (Cerasus vulgaris) Surkirsebær. 0-800m. IV-V.Forv.

P. mahaleb L. (Cerasus m.) Klippekirsebær. 2-6m. Bladene bredt ægformede, næsten med hjærteformet grund, tilspidsede, finttakkede, lidt læderagtige. 3-7 blomster i en kort klase. Sort bær. 0-800m. IV-V.

LEGUMINOSAE

1. I det mindste nogle blade finnede eller fingrede (hertil arter med store, småbladslignende fodflige ..... 2.
Bladene enkle eller trekoblede 36.
2. Bladene fingrede ..... 3.
" finnede 4.
3. Bladene m.m. siddende ..... Dorycnium
" langstilkede Lupinus
4. Bladene ligefinnede ..... 5.
" uligefinnede 13.
5. Træ. Kronen mangler ..... Ceratonia
Urt eller halvbusk. Kronen til stede 6.
6. Bladskaftet ender i en torn. Halvbuske ..... Astragalus
" uden torn. Urter 7.
7. Stængel og blade kirteldunede ..... Cicer
" " " ikke kirtlede 8.
8. Stænglen vinget eller småbladene ligestrengede ... Lathyrus
" uvinget og småbladene fjerstrengede 9.
9. Alle bægertænder mindst 2 x røret ..... Lens
Mindst 2 bægertænder kortere 10.

10. Akselbladene meget større end småbladene ..... 11.
" ikke " " " 12.
11. Småbladene mangler. Gul krone ..... Lathyrus aphaca
Med småblade. Kronen ikke gul Pisum
12. Griflen kun dunet på oversiden ..... Lathyrus
" anderledes dunet eller glat Vicia
13. Blomsterstilkene udgår m.m. fra samme punkt ..... 14.
Blomsterne enlige, i klaser eller tætte toppe 24.
14. Bælgen en ledbælg ..... 15.
" ikke leddelt 18.
15. Bælgen stærkt netåret. Kølen but ..... Ornithopus
" ikke " . " spids 16.
16. Bælgen med ensidige, dybe indskæringer ..... Hippocrepis
" lidet indskåren, m.m. symmetrisk 17.
17. Bælgen glat ..... Coronilla
" dunet Hammatolobium
18. Kølen med et næb ..... 19.
" uden noget næb 21.
19. 4-7 par småblade ..... Securigera
2-3 " " eller udelte blade 20.
20. Nedre blade udelte. Skulpen kredsformet ..... Hymenocarpus
Alle blade finnede. Skulpen aflang til linjeformet Lotus
21. Hovedet med et hindeagtigt svøb under sig ..... Ebenus
" uden eller med et svøb af højblade 22.
22. Bægertænderne ca. $\frac{1}{4}$ x røret eller kortere ..... Anthyllis
" 2/3 x røret eller længere 23.
23. Kølen stærkt mørkerød eller sort ..... Dorycnium
" ikke " " " Astragalus
24. Bælgen leddelt ..... 25.
" ikke leddelt 26.
25. Blomsterne i klaser ..... Hedysarum
" enlige i bladhjørnerne 16.
26. Bælgen uopspringende, randet mest tandet ..... 27.
" opspringende, uden tænder 28.
27. Bælgen aflang og flad, savtakket på begge kanter Biserrula
" kort, næsten skiveformet Onobrychis
28. Planten m.m. kirtlet ..... 29.
" ikke " 31.
29. Småbladenes sideribber når ikke bladranden .... Glycyrrhiza
" " " bladranden 30.
30. Fodfligene frie ..... Cicer
" sammenvoksede med bladstilken Ononis
31. Træ eller busk ..... 32.
Urter 34.
32. Træ. Kronen hvid ..... Robinia
Busk. " gul eller brunlilla 33.
33. Kronen brunlilla, uden køl og vinger ..... Amorpha
" gul, med køl og vinger Colutea
34. Kølen med næb ..... Lotus
" uden næb 35.
35. Griflen glat ..... Astragalus
" dunet på undersiden Vicia
36. Sideribberne løber lige ud i den ofte tandede bladrand 37.
" når ikke bladranden 45.
37. Alle støvdragere sammenvoksede. Ofte kirteldunet ... Ononis
1 fri og 9 sammenvoksede støvdragere 38.
38. Bælgen 12-20x10-15mm, flad og ægformet .. Melilotus graecus
" anderledes 39.
39. Blomsterne i en forlænget og åben klase ..... Melilotus
" i hovede, skærm eller en tæt klase 40.
40. Bælgen spiralsnoet ..... Medicago
" højst seglkrummet 41.
41. Bælgen 3-20 x så lang som bred ..... 42.
" kortere, mest kugle- eller ægformet 43.

42. Flerårig ..... Medicago falcata
Enårig Trigonella
43. Bælgen nyre- eller ægformet, udragende af bægeret ..... 43.
" anderledes eller indesluttet i bægeret Trifolium
44. Bælgen nyreformet ..... Medicago lupulina
" ægformet Trigonella spicata
45. Kronen rød eller blålilla ..... 46.
" gul 48.
46. Kronen blålilla ..... Psoralea
" rød 47.
47. Træ med runde blade og lyserøde blomster ..... Cercis
Urt med trekoblede blade Tetragonolobus
48. Kronen regelmæssig. Træ med smalle, hele blade ..... Acacia
" med fane, vinger og køl 49.
49. Urter ..... 50.
Buske 52.
50. Flerårig med dunet bælg ..... Hammatolobium
Enårig. Bælgen ikke dunet 51.
51. Alle blade udelte ..... Scorpiurus
De nedre blade delte Coronilla
52. Kvistene meget bredt tvevingede, flade ..... Chamaespartium
" ikke tvevingede eller flade 53.
53. Bægeret lige afskåret. Tornet busk ..... Calicotome
" tandet 54.
54. Sammenvoksede fodflige. Bælgen 10-20 x 1½-2 cm ... Anagyris
Fodfligene frie eller mangler. Bælgen mindre 55.
55. Bælgen 5-7cm, bredt vinget ..... Podocytisus
" uvinget 56.
56. Bægeret rørformet ..... 57.
" klokkeformet 58.
57. Bægeret med 5 ret ens tænder, næppe tolæbet ..... Anthyllis
" tolæbet Chamaecytisus
58. Bægeret kløvet til grunden foroven. Bladene enkle Spartium
" ikke kløvet til grunden 59.
59. Bægerets overlæbe med 2 korte tænder ..... Cytisus
" " dybt kløvet 60.
60. Fanen længere end kølen. 3-koblede blade ..... Teline
" kortere " " Genista

Cercis siliquastrum L. Judastræ. 3-8m. Bladene 7-12cm, afrundet hjærteformede. Blomsterne lyserøde, kommer før bladene og sidder direkte på stammen i tætte knipper. 0-800m. III-IV.

Ceratonia siliqua L. Johannesbrødtræ. 1-8m. Stedsegrøn. 2-5 par ligefinnede, elliptiske til næsten runde, læderagtige småblade med skinnende mørkegrøn over- og lys underside. Grønlige kronløse blomster i klase. Bælgen brun, affladet, 10-15x2cm. IX-XI.

Acacia cyanophylla Lindley Blå akacie. 4-10m. Træ med mimoseagtige, gule blomster. Bladene linje-lancetformede, 10-20x½-2cm, 1-strengede, m.m. blågrønne. Bælgen 6-12cm x 4-8mm. Dyrk.+Forv.

Anagyris foetida L. Stinktræ. 1-4m. Stinkende busk med guldregnsagtige blade. Kronen gul, 18-25mm. Fanen meget kort, ofte med en sort plet. Bælgen 10-20x1-2cm. 0-1100m. XII-III.

Podocytisus caramanicus Boiss.& Heldr. Vingegyvel. -2m. Risformet busk med trekoblede blade og endestillede klaser. Bælgen 5-7 cm, ægformet til aflang, med bredvinget overkant og tynde sider.

Calicotome villosa (Poiret) Link Håret bægergyvel. 1½-3m. Stærkt tornet busk med trekoblede blade. Blomsterne i knipper på 2-15, med et lige afskåret bæger. 0-1200m. IV-V.

Cytisus villosus Pourret Bladgyvel. 1-2m. Opret busk med stive, 5-kantede grene. Trekoblede småblade på 15-30mm med lådden underside. 1-3 blomster sammen. Fanen med rødstribet grund. II-IV.

Chamaecytisus. Gedekløver.

1. Ældre grene efterhånden tornagtige ..... 2.
" " bliver ikke " 3.
2. Fanen 25-35mm. Bladoversiden tiltrykt dunet ..... spinescens
" 10-23mm. " m.m. glat creticus
3. Småbladene elliptiske og spidse ..... hirsutus
" omvendt ægformede, afrundede fortil triflorus

Chamaecytisus creticus (Boiss.& Heldr.) Rothm. 30-150cm. Småbladene 3-7mm. Blomsterne enlige. Bælgen kort lådden, 4-6cm. IV-VI.

C. spinescens (C.Presl) Rothm. Tornet gedekløver. -20cm. Småbladene 3-11cm. Blomsterne 1-2 sammen. Kronen bleggul. Bælgen kun dunet langs sømmene. 300-1300m. IV-V.

C. hirsutus (L.) Link Håret gedekløver. 20-100cm. Småbladene 6-20x4-10mm. Fanen 20-25mm. Blomsterstilken uden forblade. 400-2200m. mIV-fVII. PR,KY. (hører måske til følgende art).

C. triflorus (Lam.) Skalicka Nær foregående. Blomsterstilken med forblade.

Teline monspessulana (L.) C.Koch Bredbladet krusbælg. 1-3m. Bladene 3-koblede, hårede på begge sider. 3-9 blomster i halvskærme fra bladhjørnerne. Bægeret med grønne tænder. Fanen 10-12mm. Dunet bælg på ca. 2mm. 0-800m. IV-V.

Genista. Visse.

1. Planten tornet. Bladene trekoblede ..... acanthoclada
Ikke tornet. Bladene enkle. Ældre kviste med 5-8 riller 2.
2. Blomsterne i hoveder med svøbblade under ..... subcapitata
" 1-3 sammen i bladhjørnerne 3.
3. Bladoversiden svagt dunet ..... millii
" glat halacsyi

Genista subcapitata Pancic (G. albida) 5-12cm. Unge kviste med korte, krumme og m.m. rette, udstående hår. Småbladene 5-8mm. Bladgrundene blivende. Svøbbladene lysegrønne. Kronen 8-10mm, lysegul. 1800-2200m. VII.

G. millii Heldr. Tæt, stiv, stærktgrenet småbusk. Kronen 10-13mm, klart gul. Bælgen 15-22x4mm, tætdunet af korte m.m. tiltrykte og lange m.m. udstående hår. 1300-1950m.

G. halacsyi Heldr. (en form af G. sericea Wulf. ?). Bladene 5-25 x 2-5mm. Bægerets læber længere end røret (ca. = røret hos millii). VI. TA (Langanda ml. Sparta og Kalamata i 1899).

G. acanthoclada DC. 30-100cm. Busk med modsatte grene. Ældre kviste fortykkede ved bladfæsterne. Småbladene 5-10mm. Kronen 6-10mm, gyldengul, kortere end kølen. 0-1150m. IV-VI. Knudevisse.

Chamaespartium sagittale (L.) Gibbs Nedliggende vingevisse. 10-25cm. Krybende med opstigende, leddede og noget læderagtige kviste. Tætte, endestillede klaser. 1000-1700m. fVI-fVIII. PR

Spartium junceum L. Spansk gyvel. 1-3m. Grøn, risformet busk med affaldende, enkle blade. Blomsterne 2-2½cm, i løse, mangeblomstrede klaser. 0-600m. V-VI.

Lupinus. Lupin.

1. Kronen gul ..... luteus
" ikke gul 2.
2. Bægerets overlæbe svagt tvetandet ..... albus
" " tvekløvet 3.
3. Kronen 15-17mm. Bælgen 18-20mm bred ..... pilosus
" 10-14mm. " højst 12mm bred 4.
4. Småbladene linjeformede, 2-5mm brede ..... angustifolius
" omvendt ægformede, 5-15mm brede micranthus

Lupinus luteus L. Gul lupin. IV-V.

L. angustifolius L. Smalbladet lupin. 20-80cm. Klasens blomster

spredte. Kronen mest lyseblå. 0-1000m. IV-V.

Lupinus micranthus Guss. Håret lupin. 10-40cm. Brunhåret. Kronen blå, fanen hvid midtpå, kølen mørkspidset. Nedre blomster spredte, øvre uregelmæssigt kransstillede. 0-600m. III-V.

L. albus L. ssp. graecus (Boiss.& Spr.) Franco & P.Silva Hvid lupin. 30-120cm. Nedre småblade omvendt ægformede. Ret korte, 5-10cm, spredtblomstrede klaser. Kronen mørkeblå. 0-1100m.IV-V.

L. pilosus L. (L. varius ssp. orientalis) Håret lupin. 40-80cm. Planten blødt lådden. Kronen blå; fanen med en hvid, gul eller bleglilla plet. 0-750m. III-V.

Robinia pseudacacia L. Uægte akacie. 0-1000m. IV-VI. Forvildet.

Colutea arborescens L. Blærebusk. 2-4m høj busk med uligefinnede blade og 3-8-blomstrede klaser. Let kendelig på den 5-7x3cm store, stærkt oppustede bælg. Kronen 16-20mm. 0-1200m. V-VII.

Astragalus. Astragel.

1. Bladene ligefinnede med tornspidset bladskaft ..... 2.
" uligefinnede, ikke tornspidsede 6.
2. Bladenes hår midtfæstnede ..... 3.
" " enkle 5.
3. Bæger og bælg med lange, m.m. udstående hår ..... sirinicus
" " " " korte, m.m. tiltrykte " 4.
4. Fanen hvid. Bægerhårene 0,3-0,4mm ..... angustifolius
" med lyserødt skær. 0,6-1,1mm taygeteus
5. Bægeret 6-9mm. Blomsten m.m. uden forblade ..... creticus
" 10-22mm. Forbladene ca. = bægeret parnassi
6. Enårig ..... 7.
Flerårig 13.
7. Blad- og stængelhårene midtfæstnede og tiltrykte ..... 8.
" " " enkle 9.
8. Fanen under 5mm ..... epiglottis
" 7-8mm hamosus
9. Bægeret 8-13mm. Fanen 18-25mm ..... 10.
" 5-7 mm. " 8-11 mm 11.
10. Klasen med 2-6 blomster. Fanen ca. 18mm ..... pamphylicus
" " 7-18 " . " 20-25mm haarbachii
11. Bægeret tæt skælklædt. Kronen rødlilla ..... echinatus
" ikke " . " gul 12.
12. Fleste klasestilke over 1cm ..... stella
" " under 1cm sesameus
13. Klasestilkene udgår fra rosetten eller en ganske kort stængel ..... 14.
Med en tydelig, bladet stængel 20.
14. De fleste stængel- og bladhår enkle ..... 15.
" " " " " midtfæstnede 17.
15. Kronen hvid eller blålilla ..... depressus
" gul 16.
16. 8-11 par småblade ..... hellenicus
12-19 par " exscapus
17. 10-20 par småblade ..... monspessulanus
4-8 " " 18.
18. Fanen ca. 12mm ..... agrianotii
" 20-30mm 19.
19. Klaserne siddende ..... lacteus
Klasestilken 1-2 x bladene spruneri
20. Kronen lilla ..... maniaticus
" hvid eller gul 21.
21. Kronen hvid ..... lusitanicus
" gul drupaceus

Astragalus pamphylicus Boiss. 5-20cm. 8-12 par småblade. Klasestilken næsten lig bladene. Klasen tæt. Bægertænderne $\frac{1}{2}$ x røret. Bælgen 20-30x5-6mm, lidt krummet, dybt furet nedenunder.

Astragalus haarbachii Spruner (A. suberosus ssp. h.) 5-50cm. 8-12 par småblade. udrandede. Bægertænderne 2/3 x røret. Kronen gullig. Bælgen 25-30x10-15mm, ret, dybt furet nedenunder.

A. stella Gouan Stjærneastragel. 5-20cm. 9-11 par småblade, der er hårede på begge sider. Klasen med 7-12 gullige blomster. Bælgen 10-15x3-4mm, m.m. opret, tæt håret.

A. sesameus L. Sesamastragel. 10-40cm. 6-9 par svagt hårede småblade. Klasen med 5-10 gule, sjældent blålige blomster. Bælgen 10-13x3mm, opret. 0-800m. IV-V.

A. echinatus Murray Skælhåret astragel. 10-50cm. Langstilkede, tætte klaser med 10-15 blomster. Bælgen ægformet, 12-15x6mm, med krumt næb, skæl og knuder. 0-600m. IV-V.

A. epiglottis L. Hjærteastragel. 5-25cm. Bladene 2-4cm med 5-10 par tvesidet hårede småblade. Bægeret 2½-3mm. Kronen gul. Bælgen 7-9mm, trekantet-hjærteformet. 0-600m. III-IV.

A. hamosus L. Krogastragel. 10-40cm. Klasestilkene ½ x bladene. Kronen gul. Bælgen 2-5cm x 2-3mm, halvkredsformet krummet. III-V.

A. maniaticus Kit Tan & Strid 10-15cm. Bladene 2-3½cm, med 10-12 par langt randhårede småblade. Stænglen sorthåret. Bægeret 11-12 mm. Kronen 18-20mm. 15-50m. 200m S.f. Gerolimni. III-IV.

A. depressus L. Lav astragel. 6-14 par småblade, tæt sølv-silkehårede som unge. Kronen hvid, m.m. lillaanløben. Fanen 9-14mm. Bælgen 15-25x3mm. 1500-2300m. V-mVIII. TA,PR,ME,OL,KH,KY,ER,PN.

A. lusitanicus Lam. ssp. orientalis Chater & Meikle 30-70cm. Opret. Bladene 8-12cm. Klasestilken ¼-¾ x bladene. Bægeret 10-15mm. Fanen 20-35mm. Bælgen 5-6x1-2cm. III-V.

A. exscapus L. Stængelløs astragel. Bladene 10-15cm. Klasestilken meget kort, med 3-10 blomster. Bægeret 12-15mm. Fanen 20-30 mm. Bælgen 15-25x7-10mm, aflang. 800-2200m. V-VIII.

A. hellenicus Boiss. Bladene 5-10cm. Klasestilken meget kort, med 3-10 blomster. Bægeret 10-15mm. Fanen citrongul, 20-28mm. Bælgen ca. 17x10mm, skævt elliptisk. 1000-2200m. mV-fVII. ME.

A. drupaceus Orph. 30-70cm. Opret. Bladene 8-18cm med 18-25 par småblade. Klasen med 3-5 blomster på 20-30mm. 0-300m. Krokees i Lakonien. Tidligere på KY.

A. creticus Lam. ssp. rumelicus (Bunge) Maire & Petitm. 5-30cm. Tæt, tornet, halvkugleformet pude. 4-7 par småblade. Kronen 10-15 mm, mest lyserød, sjældent hvid. 1400-2300m. sVI-mVIII.

A. parnassi Boiss. Rødt ræveskæg. Pudedannende. Kronen 14-23mm, mest lyserød. 1000-2200m. mVI-mVIII. 2 underarter:
ssp. parnassi: Bladhårene rette. Endetornen mest kortere end øverste småblade. Fanens plade med spidse øren ved grunden.
ssp. cylleneus (Boiss.& Heldr.) Hayek: Bladhårene bugtede. Endetornen mest længere end de øverste småblade. Fanens plade med butte øren ved grunden. KY,KH.

A. angustifolius Lam. Smalbladet ræveskæg. 5-20cm. Pudedannende. 6-10 par småblade, der er grønne og halvglatte som ældre. Klaserne med 3-12 blomster. Kølen undertiden rødlig. 1300-2100m.Udbredt.

A. taygeteus Persson & Strid Nær foregående, men småbladene sølvsilkehårede også som ældre. Kølen rødspidset. 1600-2300m. TA.

A. sirinicus Ten. Gult ræveskæg. Som angustifolius, men klasestilken ofte af bladets længde (meget kort hos ang.) Kronen hvid til lysegul. 1700-2400m. VI-VII.

A. agrianotii Orph. Bladene 6-18mm, med 4-6 par sølv-silkehårede småblade på 2-5mm. Klasen m.m. kugleformet. Blomsterne bleglilla. 1800m. PR (toppen). VI.

Astragalus lacteus Heldr.& Sart. Bladene 4-10cm, hvidhårede. Fane og vinger hvide, kølen med lyserød spids. 1400-2000m. mV-sVI. PR,ME.

A. monspessulanus L. Fransk astragel. Klasestilken 1-2 x bladene, med 7-30 mest røde blomster. Fanen 20-30mm. Bælgen 2½-4½cm x 3-6mm, lidt krum. 100-1800m. V-VI.

A. spruneri Boiss. Kronen hvid, blegt rødlilla eller lilla. Bælgen 12-20x5-7mm, krum. III-VI.

Biserrula pelecinus L. Savbælg. 10-40cm. Enårig. 3-9-blomstrede klaser med blå eller bleggule og blåspidsede blomster på 4-6mm. Bælgen 25x5mm, regelmæssigt savtakket langs begge kanter. IV-V.

Glycyrrhiza glabra L. Lakridsplante. 40-100cm. Klæbrig, opret flerårig. Bladene 8-12cm med 4-7 par småblade. 8-12mm store, lyseblå blomster i klaser fra bladhjørnerne. 0-1000m. VI-VII.

Amorpha fruticosa L. Særkrone. 1-2(-6)m. Busk. Blomsterne blå eller lilla, ca. 6mm, i endestillede, ofte knipper af tætblomstrede, noget ensidige klaser. Bælgen 7-9mm. VI-VII. Forvildet.

Psoralea bituminosa L. (Bituminaria b.) Tjærekløver. 20-50cm. Opret flerårig med langstilkede, kirtelprikkede kløverblade. Blålilla blomster i langstilkede, ægformede hoveder.0-1000m.V-VI

Cicer arietinum L. Kikært. 20-50cm. Opret, klæbrig enårig. Bladene uligefinnede, kraftigt tandede. Enlige, blegblå eller hvide blomster på 10-12mm. Bælgen 2-3xl-1½cm. VI-VIII. Dyrket og forv.

C. graecum Orph. 20-50cm. Opret, dunet flerårig. Nedre blade uligefinnede, øvre ligefinnede med slyngtråd. Kronen 20-22mm, blålille til hvid. 800-1300m. Nordskrænterne af KY og KH.

Vicia. Vikke.

1. Klasen kortstilket, stilken kortere end 1 blomsts længde 2.
" langstilket, " længere " " " " 13.
2. Fanen dunet ..... 3.
" glat 4.
3. Blomsterne (1-)2-4 sammen. Bladene ofte siddende pannonica
" enlige. Bladstilken = et bladskaftsled hybrida
4. Ingen slyngtråd ..... faba
Bladene med slyngtråd 5.
5. Kronen helt eller overvejende gul ..... 6.
" ikke gul 9.
6. Bægertænderne uens. Bægeret ofte skråt afskåret fortil ... 7.
" m.m. ens. Bægeret lige afskåret fortil 8.
7. Vingerne med sort spids. Kølen rødlilla ..... melanops
Kronen anderledes lutea
8. Vingerne gule, højst med sort spids ..... grandiflora
" blå laeta
9. Bægertænderne uens ..... 10.
" m.m. ens 11.
10. 3-7 par smalle, trespidsede småblade ..... peregrina
1-3 " brede småblade narbonensis
11. Kronen under 10mm. Frøene knudrede ..... lathyroides
" mest over 10mm. Frøene jøvne 12.
12. 1-3 par småblade. Køl og vinger hvidlige ..... bithynica
3-8 " " . " " " rødlilla sativa
13. Bægertænderne ens, alle lig eller længere end røret .... 14.
" uens, de øvre kortere end røret 16.
14. Ingen slyngtråde ..... ervilia
Øvre blade med slyngtråde 15.
15. Planten dunet. Modne bælg dunet ..... hirsuta
" m.m. glat. Modne bælg glat loiseleurii
16. Kronen 4-8mm, bleglilla. Klasen med 1-6 blomster ..... 17.
" mindst 9mm 18.

17. Bælgen mest 2-frøet. Klasen kortere end bladet ... dipserma
" med 3-5 frø. " mindst lig " pubescens
18. Fodfligene næsten helt tvedelte. 1-2-blom. klaser monantha
" helrandede eller finttandede 19.
19. Bægerets grund stærkt poset ..... 20.
" " noget eller svagt poset 21.
20. Kronen noget sortspidset. Klasen højst = bladet benghalensis
" ej sortspidset. Klasen mest læng. end bladet villosa
21. Fodfligene tandede. 2-3 par småblade ..... bithynica
" helrandede 22.
22. Klasen med 1-6 blomster. 1-6 par småblade ..... cretica
" " 4-40 blomster. 4-flere par småblade 23.
23. Planten og bælgen lådne ..... sibthorpii
" " " dunede eller glatte 24.
24. Fanens plade ca. lig neglen ..... incana
" " længere end neglen 25.
25. Småbladene 1-2mm brede, linje- til sylformede ... dalmatica
" 2-6mm " , linje- til lancetformede tenuifolia

Vicia incana Gouan Filtet vikke. Ligner Musevikke, men stænglen udstående dunet. 10-22 par småblade. Klaserne med 20-40 blomster. 0-600m. V-VIII.

V. tenuifolia Roth Langklaset vikke. 0-1500m. V-VII.

V. dalmatica A.Kerner Børstevikke. 35-55cm. Klasen med ca. 10 rødlilla blomster. 0-1700m. sIII-VII. KY.

V. sibthorpii Boiss. Hvidvinget vikke. 30-100cm. 6-12 par småblade på 5-20x2-6mm. Kronen 12-15mm, blålilla, undertiden hvidvinget. 0-800m. III-IV.

V. villosa Roth Sandvikke. 0-1150m. III-V. 3 underarter:
ssp. varia (Host) Corb.: Bælgen glat. Klasen med 10-30 blomster.
ssp. eriocarpa (Hausskn.) Ball: Bælgen dunet, ihvertfald som ung. Klasen med 5-20 blomster.
ssp. microphylla (d'Urv.) Ball: Klasen med 2-6 blomster. Bælgen glat eller dunet. Småbladene 3-10mm.

V. benghalensis L. Sortspidset vikke. 20-80cm. Lådden 1-flerårig med rødlilla kroner og 2-12-blomstrede klaser. 0-800m. III-VI.

V. cretica Boiss.& Heldr. 10-30cm. Svagt dunet enårig. Kronen hvid eller gullig med rødlilla spids. Småbladene 4-10x1-4mm.II-V.

V. monantha Retz Treblomstret vikke. 30-60cm. Kronen lyst rødlilla med bred grund, 10-15mm. 5-8 par småblade. 0-600m. IV-V.

V. ervilia (L.) Willd. Linsevikke. 15-50cm. Glat til dunet enårig. 8-15 par småblade. Kronen hvid med lilla årer, 6-9mm. IV-V.

V. hirsuta (L.) S.F.Gray Tofrøet vikke. 0-1200m. IV-VI.

V. loiseleurii (Bieb.) Litv. (V. terronii) 0-1000m. IV-VI.

V. disperma DC. (V. parviflora) Sylbægret vikke. 10-50cm. Ligner hirsuta, men klaserne med 2-6 bleglilla blomster. 0-1400m. III-V.

V. pubescens (DC.) Link Dunet taddervikke. Spredt dunet. Småbladene 3-5mm brede. Klasen med 3-6 blomster. 0-800m. III-V.

V. grandiflora Scop. Storblomstret vikke. 30-50cm. Flerårig. Fanen gul med lilla grund og lidt brunlig på oversiden. Bælgen dunet på ribberne og spidsen. 0-1500m. IV-VI.

V. laeta Cesati (V. barbazitae) Blåvinget vikke. 30-50cm. Flerårig. Kirtlet bælg. 200-1000m. V-VI.

V. pannonica Cr. ssp. striata (Bieb.) Nyman Ungarsk vikke. 10-60 cm. Dunet enårig. Kronen 14-22mm, skident rødlilla. Bægertænderne næsten ens. 0-800m. IV-VI.

V. sativa L. Fodervikke. 0-1500m. III-VI. 5 underarter:

1. Med underjordiske blomster og bælge. Kronen 20-25mm ssp. amphicarpa
   Ingen underjordiske stængler 2.
2. Kronen 10-18mm. Bægertænderne kortere end røret. Bælgen sort eller meget mørkebrun ..... ssp. nigra
   Kronen 18-30mm. Bægertænderne lig eller længere end røret. Bælgen gulbrun til mørkebrun, sjældent sort 3.
3. Bælgen 4½-6mm bred ..... ssp. cordata
   " 6-11mm " 4.
4. Bælgen indsnøret mellem frøene, brun eller gulbrun. Frøene 3½-6½mm ..... ssp. sativa
   Bælgen ikke indsnøret mellem frøene, mørkebrun eller næsten sort. Frøene 5½-8mm ssp. macrocarpa

Vicia lathyroides L. Vårvikke. 0-1900m. III-fVII.

V. peregrina L. Markvikke. 20-40cm. Svagt dunet enårig. Småbladene ½-2mm brede. Blomsterne 10-16mm, rødlilla, 1-2 sammen. III-VI.

V. melanops Sm. Sortøjet vikke. 15-80cm. Kronen 15-22mm, med grønliggul grundfarve. 0-900m. IV-V.

V. lutea L. ssp. vestita (Boiss.) Rouy Gul vikke. 10-50cm. Enårig. Blomsterne 1-3 sammen, 20-35mm, bleggule, undertiden lillaanløbne. 0-800m. IV-V.

V. hybrida L. Svovlvikke. 20-60cm. Blomsterne enlige, bleggule eller lillaanløbne. Bægertænderne uens. 0-1000m. III-V.

V. bithynica (L.) L. Firbladet vikke. 20-60cm. Enårig. Småbladene 2-5cm x 2-20mm. Blomsterne 1-3 sammen, 16-20mm. Fanen rødlilla, vinger og køl hvide. 0-1000m. III-V.

V. narbonensis L. Fransk vikke. 20-60cm. Opret, dunet enårig. Nedre blade uden slyngtråd. Kronen mørkt rødlilla. Småbladene 2-5x1-4cm. 1-6 blomster sammen. Kronen 15-18mm. 0-1000m. IV-VI.

V. faba L. Hestebønne. III-V. Dyrket og forvildet.

Lens. Linse. Ligner Vicia, men med lange bægertænder. Enårig. Blegblå eller bleglilla blomster på 4-7mm, 1-3 sammen i langstilkede klaser.

L. nigricans (Bieb.) Godr. Vild linse. 10-30cm. Udstående dunet. 2-5 par småblade, 1-2mm brede. Fodfligene halvt spydformede eller tandede. Klasestilken med stak. Bælgen glat. 0-1000m. IV-V.

L. culinaris Med. Alm. linse. 10-40cm. Udstående dunet. 3-8 par småblade, op til 8mm brede. Fodfligene helrandede. Klasestilken med stak. Bælgen glat. V-VIII. Dyrket og forvildet.

L. ervoides (Brign.) Grande Kortbladet linse. 10-30cm. Tiltrykt dunet. 2-4 par småblade, 1-3mm brede. Fodfligene halvt spydformede eller tandede. Klasestilken uden stak. Bælgen dunet. IV-V.

Lathyrus. Fladbælg.

1. Flerårige ..... 2.
   Enårige 6.
2. Kronen gul ..... pratensis
   " rød- eller blålilla 3.
3. Bladene med slyngtråd ..... grandiflorus
   " uden " 4.
4. Småbladene 10 (7-15) x så lange som brede ..... digitatus
   " 2-5 x så lange som brede 5.
5. 1 par småblade ..... laxiflorus
   Mest 4-6 par småblade niger
6. Nedre blades småblade med 3-tandet spids ..... saxatilis
   Alle småblade med enkel spids 7.
7. Kronen gul til orangegul ..... 8.
   " ikke gul 10.

8. Ingen småblade, men 2 store, spadelignende fodflige ..... aphaca
   Øvre blade med småblade ..... 9.
9. Nedre bladskafter uden småblade ..... ochrus
   Alle " med " ..... annuus
10. Nedre bladskafter uden småblade ..... 11.
    Alle " med " ..... 12.
11. Vingerne blå- eller rødlilla. Fanen udrandet ..... clymenum
    " hvide eller lyserøde. " brodspidset ..... articulatus
12. Kronen orangerød ..... 13.
    " ikke orangerød ..... 14.
13. Blomsterstilken uden stak. Bælgen 7-11mm bred ..... setifolius
    " med " . " 3-7 mm " ..... sphaericus
14. Stænglen uvinget. Blomsterstilkene 2-5mm ..... inconspicuus
    " vinget. " 1-6cm ..... 15.
15. Bælgen med 2 vinger langs rygsiden ..... 16.
    " højst med køle langs rygsiden ..... 17.
16. Kronen lyseblå, lyserød eller hvid ..... sativus
    " rød ..... amphicarpos
17. Planten svagt dunet. Rød krone med lyseblå vinger ..... hirsutus
    " glat. Kronen rødlilla ..... cicera

Lathyrus niger (L.) Bernh. Sort fladbælg. 0-1000m. V-VI.

L. digitatus (Bieb.) Fiori Fingerfladbælg. 10-40cm. 1-2 par småblade. Klasen med 4-10 rødlilla blomster på 15-30mm. sIII-fVII.

L. pratensis L. Gul fladbælg. 0-2100m. sV-VIII. PR,KY,KH.

L. laxiflorus (Desf.) O.Kuntze Fyrrefladbælg. 20-50cm. Småbladene spidse, bredt lancet- til afrundet rudeformede. Fodfligene tilsvarende. Klasen med 2-6 blålilla blomster på 15-20mm. VI-VII.

L. grandiflorus Sm. Storblomstret fladbælg. 30-150cm. Småbladene ægformede og butte, 2½-5x1-3½cm. Fanen blålilla, 25-30mm, vingerne rødlilla, kølen lyserød. 300-2000m. IV-VII.

L. saxatilis (Vent.) Vis. Stenfladbælg. 10-30cm. Noget vikkelignende. Nedre småblade omvendt hjærteformede, 1-3 par; øvre smalle. Enlige, blegblå eller -gule blomster på 7-8mm. 0-600m. IV-V.

L. sphaericus Retz Enblomstret fladbælg. Kronen 10-13mm. Bælgen tydeligt længdestribet. 0-1200m. IV-VI.

L. inconspicuus L. Småblomstret fladbælg. Kronen lyst rødlilla, 4-8mm. Bælgen ca. 3mm bred, uden længdestriber. 0-800m. IV-V.

L. setifolius L. Børstefladbælg. 10-60cm. Bælgen 15-30x7-11mm. Kronen 8-11mm. 0-1200m. IV-VI.

L. cicera L. Purpurfladbælg. 20-100cm. Kronen 10-14mm. Småbladene 1-6mm brede. Fodfligene 2-5mm brede. 0-1000m. III-VI.

L. sativus L. Sædfladbælg. 10-60cm. Kronen 12-24mm. Bælgen 10-18mm bred. 0-600m. III-V.

L. amphicarpos L. Firvinget fladbælg. 5-25cm. Kronen 10-12mm. Bælgen med 2 vinger både langs ryg- og bugsiden. 0-600m. III-IV.

L. annuus L. Rødgul fladbælg. 40-150cm. Blomsterne 12-15mm, gule, ofte med et rødligt skær. Bælgen ca. 5x1cm. 0-1500m. III-VI.

L. hirsutus L. Håret fladbælg. 20-120cm. Klasen med 2-3 blomster på 7-15mm. Bælgen rusthåret. 0-1350m. V-VI.

L. clymenum L. Klatreært. 30-100cm. Bladene med bred, udfladet stilk og skaft, de nedre uden, de øvre med 2-4 par småblade.IV-V.

L. articulatus L. Hvidvinget klatreært. Som clymenum. IV-V.

L. ochrus (L.) DC. Skedefladbælg. 20-60cm. Den udfladede bladstilk 1-2cm brede, aflangt-spatelformet. Øvre blade med 1-2 par småblade. 0-1000m. IV-VI.

L. aphaca L. Bladløs fladbælg. 10-30cm. Selve bladet reduceret

til en slyngtråd, men med 2 store, spyd- eller spadeformede akselblade. Blomsterne 6-18mm, langstilkede. 0-1500m. IV-VI.

Pisum sativum L. Ært. 3 underarter:
ssp. sativum: Kronen ensfarvet. Bælgen 5-12cm. Dyrket.
ssp. humile (Holmboe) Greuter & al.: Kronen blålig med rødlilla vinger, 13-18mm. Fanen indtil 20mm bred. Bælgen 4-5cm. II-IV.
ssp. elatius (Bieb.) Asch.& Gr.: Kronen lilla med sortlilla vinger. Fanen indtil 36mm bred. Bælgen 5-8cm. IV-VI.

Ononis. Krageklo.

1. Kronen rød ..... 2.
" gul 5.
2. Flerårig ..... spinosa
Enårig 3.
3. Blomsterne tydeligt stilkede ..... reclinata
" ganske kortstilkede 4.
4. Planten ukirtlet. Bægeret hvidligt ..... mitissima
" klæbrig. " grønt diffusa
5. Flerårig ..... 6.
Enårig 8.
6. Blomsterstandens blade ca. 2 x blomsternes længde pusilla
" " kortere end blomsterne 7.
7. De nedre blade finnede ..... adenotricha
" " " med 1-3 småblade natrix
8. Bælgen 7-10 x så lang som bred, knudret .. ornithopodioides
" bredere og ikke knudret 9.
9. Småbladene 5-8mm, ofte sammenfoldede ..... variegata
" 10-25mm, ikke " 10.
10. Bægertænderne med 5 ribber. Frøene glatte ..... pubescens
" " 3 " . " knudrede 11.
11. Kronen 10-13mm, længere end bægeret ..... sieberi
" 7-9mm, højst af bægerets længde breviflora

Ononis adenotricha Boiss. 5-30cm. Flerstænglet med forveddet grund. Småbladene 6-7mm, ægformede og udrandede. Kronen 7-9mm.

O. natrix L. ssp. hispanica (L.f.) Coutinho Gul krageklo. 20-60cm. Stærktgrenet dværgbusk. Kronen ofte med røde eller lilla årer. Småbladene 2-5(-8)mm. Kronen 6-12mm. 0-100m. III-X.

O. ornithopodioides L. Fuglekloskrageklo. 5-25cm. Klæbrig. 3 småblade på 10-15mm. Kronen kortere end bægeret. Bælgen 17-21 x 2-3mm. 0-300m. III-VI.

O. reclinata L. Udstrakt krageklo. 2-15(-30)cm. Mest med udstrakt-opstigende grene. Kronen 5-8mm, ofte lidt kortere end bægeret. Småbladene 5-8mm. 0-1200m. IV-VI.

O. pubescens L. Gulhovedet krageklo. 15-35cm. Mellemste blade trekoblede, resten enkle. Kronen ca. 15mm. 0-500m. III-VII.

O. breviflora DC. (O. viscosa ssp. b.) 10-20cm. Opret. Blomsterstilkens stak 6-17mm. Kronen 7-9mm, ofte rødåret. III-VI.

O. sieberi Besser (O. viscosa ssp. s.) 10-20cm. Opret. Blomsterstilkens stak 0-3mm. Kronen 10-13mm. Planten med aromatisk duft. 0-200m. IV-V.

O. pusilla L. Liden krageklo. 10-20cm. Småbladene 5-13mm. Kronen 5-12mm, oftest af bægerets længde. 0-1200m. V-VII.

O. spinosa L. Strandkrageklo. 0-1900m. IV-X. 2 underarter:
ssp. antiquorum (L.) Arc. Bælgen med 1 frø.
ssp. diacantha (Rchb.) Greuter: Bælgen med 2-4 frø.

O. variegata L. Foldet krageklo. 10-30cm. Liggende eller opstigende, klæbrig og ofte med påsiddende sandskorn. Kronen 12-14 mm. Småbladet enkelt, ofte noget krummet. Sandstrand. IV-VI.

O. diffusa Ten. Savtandet krageklo. 10-40cm. Grundbladene un-

dertiden finnede. Kronen 9-11mm, lidt længere end bægeret.III-VI.

Ononis mitissima L. Akskrageklo. 15-60cm. Blomsterne i tætte aks. Kronen 10-12mm, længere end bægeret. 0-500m. IV-VI.

Melilotus. Stenkløver.

1. Bælgen 12-20mm, flad, hindeagtig og bredvinget ..... graecus
" 1½-8mm 2.
2. Klasen kortere end støttebladet ..... messanensis
" længere " " 3.
3. Vingerne kortere end kølen. Bælgen koncentrisk stribet .... 4.
" lig eller længere end kølen. Bælgen tværstribet eller netåret 5.
4. Kronen 2½-4mm ..... sulcatus
" 4-8mm segetalis
5. Midterste blades fodflige tandede ..... italicus
" " " helrandede 6.
6. Kronen 2-3mm. Bælgen 1½-3mm ..... indicus
" 4-7mm. " 3-5mm officinalis

Melilotus graecus (Boiss.& Spr.) Lassen (Trigonella g.) Bredbælg. 10-30cm. Klasen lidt sammentrængt, stilken 4-6cm. Kronen 7-10mm. Bælgen 12-20x10-15mm, tværåret. 0-500m. III-V.

M. messanensis (L.) All. Kortklaset stenkløver. 20-40cm. Klasen 7-10mm, med 3-10 blomster på 4-5mm. 0-600m. III-V.

M. sulcatus Desf. Småblomstret stenkløver. 10-40cm. Klasen 1-2 cm, ofte med under 25 guldgule blomster. 0-800m. IV-VII.

M. segetalis (Brot.) Ser. Agerstenkløver. 40-60cm. Klasen tæt, ca. 3cm, med 30-50 blomster. 0-600m. IV-VII.

M. italicus (L.) Lam. Storblomstret stenkløver. 20-60cm. Klaserne 1½-3cm, længere i frugt. Kronen 6-9mm. Bælgen netåret og spidsnæbbet, 5-6mm. 0-600m. III-V.

M. indicus (L.) All. Indisk stenkløver. 15-50cm. Kronen bleggul. Bælgen stærkt netåret. 0-1000m. III-VII.

M. officinalis (L.) Pallas Markstenkløver. 0-1500m. V-VIII.

Trigonella. Bukkehorn.

1. Bægeret rørformet, 5-12mm ..... 2.
" klokkeformet, 2-6mm 4.
2. (3-)10-15 blomster sammen i et stilket hovede coerulescens
Blomsterne 1-2 sammen og siddende 3.
3. Småbladene 2-5cm. Bælgen (÷ næb) 6-11cm ..... foenum-graecum
" 5-12mm. Bælgen (÷ næb) 1½-4cm gladiata
4. Klasestilken 0-½cm ..... 5.
" over ½cm 6.
5. Stænglen svagt håret. Bægertænderne kortere end røret spinosa
" tæt tiltrykt dunet. Bægertænderne længere end røret monspeliaca
6. Bælgen 5-8mm ..... 7.
" 10-16x2-4mm 8.
7. Bælgen m.m. glat. Kronen 6-7mm ..... spicata
" håret. Kronen 3-4mm cephalotes
8. Vingerne kortere end kølen. Bælgen tilspidset corniculata
" lig kølen. Bælgen halvspids balansae

Trigonella corniculata (L.) L. Markbukkehorn. 10-55cm. Klaserne ægformet-aflange, med 8-15 blomster. Kronen 6-7mm. Bælgen hængende, noget krum, 2-3mm bred, med tværårer. 0-600m. III-V.

T. balansae Boiss.& Reuter 10-55cm. Klaserne kugleformede i blomst. Bælgen 2-4mm bred; ellers som foregående. 0-300m. III-V.

T. spinosa L. 10-30cm. Kronen ca. 4mm. Bælgen 2-3½cm x 1-2mm, hængende, krum, glat og tværåret. III-V.

Trigonella spicata Sm. 10-40cm. Bælgen ægformet, netåret, langhåret som ung, med et langt, krumt næb. Hovedformet klase. IV-VI.

T. cephalotes Boiss.& Bal. 20-40cm. Klaserne runde, stilkene 2-5cm. Kronen 3-4mm. Bælgen nedbøjet, netåret. IV-V.

T. monspeliaca L. Stjærnebukkehorn. 5-15cm. Klasen m.m. hovedformet. Bælgen 7-17x1-1½mm, hængende, lidt krum, skrååret.

T. coerulescens (Bieb.) Hal. Lådden mølurt. -40cm. Tæt håret. Kronen 11-13mm, blå. Bælgen 10-15mm; næbbet 3½-5mm. IV-VII.

T. gladiata Steven Sværdbukkehorn. 5-25cm. Blomsterne mest enlige, 8-10mm, bleggule. Bælgen ret; næbbet 1-2cm. 500-1300m.

T. foenum-graecum L. Bukkehorn. 10-50cm. Blomsterne ofte parvise, 12-18mm, gullighvide med lillaanløben grund. Næbbet 2-3cm. IV-VI. Dyrket og forvildet.

Medicago. Sneglebælg.

1. Bælgen nyreformet, højst 3mm lang ..... lupulina
   " forlænget, krum eller skruesnoet, over 3mm 2.
2. Flerårig ..... 3.
   Enårig 6.
3. Busk på 1-4m ..... arborea
   Urter 4.
4. Hvidfiltet strandplante ..... marina
   M.m. dunet 5.
5. Kronen gul. Bælgen seglformet til næsten lige ..... falcata
   " lilla. Bælgen skruesnoet sativa
6. Fodfligene helrandede til svagt tandede ..... 7.
   " tydeligt savtakkede til fligede 8.
7. Bælgens kant bred og flad. Akseparallelle torne ... coronata
   " " kølet. Tornene udstående minima
8. Kronen næsten lig bægeret, ca. 2½mm ..... praecox
   " tydeligt længere end bægeret, mindst 3mm 9.
9. Bælgens torne slanke og med en tydelig fure (lup!) ..... 10.
   " eventuelle torne højst med en svag fure 13.
10. Alle bælgens torne drejer ned mod bægeret ..... disciformis
    Tornene alsidigt rettede 11.
11. Bælgen i en tæt skrue. Planten tydeligt håret ..... globosa
    " " " løs " . " glat til fåhåret 12.
12. Vindingernes køl med en midterfure. Småbladene tit med en sort plet, 10-25mm store ..... arabica
    Vindingernes køl uden midterfure. Småbladene upletted, 7-15mm store polymorpha
13. Bælgen 9-18mm bred ..... 14.
    " 2-10mm " 17.
14. Bælgen uden torne ..... 15.
    " med " 16.
15. Bælgen halvkugleformet ..... scutellata
    " linseformet orbicularis
16. Bælgen kirteldunet ..... ciliaris
    " glat intertexta
17. Bælgen tornløs, tværribberne tydeligt tykkere udad rugosa
    " anderledes 18.
18. Planten næsten glat. Bælgen ofte topformet ..... murex
    " håret 19.
19. Småbladene tandede næsten til grunden ..... turbinata
    " højst tandede i den øvre halvdel 20.
20. Bælgen tydeligt kirteldunet ..... rigidula
    " højst kirteldunet på randen 21.
21. Klasestilken tit kortere end bladstilken ..... truncatula
    " længere end den tilhørende bladstilk littoralis

Medicago lupulina L. Humlesneglebælg. 0-2100m. V-mVII.

Medicago sativa L. Lucerne.

M. falcata L. Seglsneglebælg. 0-1200m. IV-VII.

M. arborea L. Træsneglebælg. Silkehåret busk med hvidlig bark. 4-8 orangegule blomster sammen på 12mm. Bælgen 12-15mm, med 1-1½ vinding. 0-500m. I-IV. Ofte forvildet.

M. marina L. Strandsneglebælg. 20-50cm. Liggende, forveddet forneden. Næsten hovedformede klaser med 5-12 blomster. III-VIII.

M. ciliaris (L.) All. Kirtelsneglebælg. Kronen 5-9mm. Bælgen 15-20mm bred med tornene, og dermed den største i slægten. IV-V.

M. intertexta (L.) Miller Gittersneglebælg. 30-50cm. Småbladene undertiden med en mørk plet. Bælgen 15-18mm bred med torne, hvælvet i begge ender. Tornene tiltrykte bælgen. 0-600m. IV-V.

M. scutellata (L.) Miller Skjoldsneglebælg. M.m. kirteldunet. Bælgen 9-18mm, kirteldunet, med kølribbe og mange tydelige tværårer. 0-600m. IV-V.

M. rugosa Desr. Ribbet sneglebælg. Bælgen 6-10mm, glat. Tværårerne ikke sammenløbende. 0-800m. III-V.

M. orbicularis (L.) Bartal. Skivesneglebælg. 20-90cm. Bælgen linseformet, 10-17mm bred. Dens tværårer noget sammenløbende. III-V.

M. disciformis DC. Hvirvelsneglebælg. Bælgen ca. 6mm bred. Øverste vinding meget mindre og uden torne. 0-1300m. III-VI.

M. coronata (L.) Bartal. Kronsneglebælg. Fodfligene helrandede eller fåtandede. Klaserne med 3-8 blomster på 2½-3mm. IV-V.

M. arabica (L.) Hudson Pletsneglebælg. 0-1100m. IV-VI.

M. minima (L.) Bartal. Liden sneglebælg. Planten spredt håret. Bælgen også håret og noget kirtlet. 0-1450m. III-V.

M. praecox DC. Pindsvinesneglebælg. Blomsterne mest enlige, 2-3 mm. Bælgen 3-4mm bred, svagt dunet, mest krumtornet.0-1300m.III-V

M. polymorpha L. Foranderlig sneglebælg. Bælgen 4-10mm, med tydelige randribber, så kanten bliver 3-kølet. Tornene dybt furede.

M. turbinata (L.) All. (M. tuberculata) Knudret sneglebælg. Klasen med 1-8 blomster på 5-6mm. Bælgen m.m. cylindrisk med korte, men tætstillede torne. 0-600m. III-V.

M. murex Willd. Kærvsneglebælg. Bælgen 5-9mm, oftest med 1-3mm lange torne, men kan også have korte knuder i stedet. IV-V.

M. rigidula (L.) All. Krogsneglebælg. Bælgens tværårer stærkt krummede. Tornene krumme. Småbladene 5-8mm. 0-1400m. III-VI.

M. truncatula Gaertner Fodangelsneglebælg. Bælgen 5-8mm, næsten altid spredt lådden. Kronen 6-8mm. 0-1100m. III-V.

M. littoralis Rohde Sandsneglebælg. Bælgen 4-6mm. Tværårerne næsten kun sammenløbende nær randribberne. Sand nær kysten. III-V.

M. globosa C.Presl (M. constricta) Skråribbet sneglebælg. Tværribberne ikke sammenløbende, virker koncentriske. 0-150m. IV-V.

Trifolium. Kløver.

1. Kronen gul ..... 2.
   " hvid, rød, lilla eller hvidgul 9.
2. Kronen 2-3½mm. Fanen næppe furet ..... 3.
   " 4-10mm. " furet 4.
3. Øvre blades midtersmåblad tydeligt stilket (1-2mm) dubium
   " " " siddende micranthum
4. Kronen bleggul. Blomsterstilken 1-2mm, længere end bægerrørets overkant boissieri
   Kronen gul. Blomsterstilken kortere end bægerrørets overk. 5.
5. Toårig. Øvre blades fodflige uden udvidet grund ..... aureum
   Enårig. " " " med øreformet udvidet grund 6.

6. Kronen 8-9mm, orange i knop ..... aurantiacum
" 4-8mm, gul i knop 7.
7. Hovedet med 20-30 blomster på (3-)4-5mm ..... campestre
" " 10-15 " " 5-7mm 8.
8. 5-20cm. Kronen 7-8mm. Hovedet 15-20mm bredt ..... brutium
20-50cm. " 5-7mm. " 9-12mm " patens
9. Hovederne med 2 slags blomster, de indre golde ..... 10.
" kun med frugtbare blomster 11.
10. 2-5 frugtbare blomster, de golde udvikles senere end de frugtbare subterraneum
10-16 frugtbare blomster globosum
11. Frugtbægeret blæreformet oppustet ..... 12.
" ikke blæreformet oppustet 17.
12. Flerårig ..... 13.
Enårig 14.
13. Støttebladene ½-1mm, frie ..... physodes
" 3-4mm, delvist sammenvoksede fragiferum
14. Frugtbægeret dunet til filtet ..... 15.
" glat, med tværribber 16.
15. Frugthovederne stilkede ..... resupinatum
" m.m. siddende tomentosum
16. Kronen 1½-2 x bægeret ..... vesiculosum
" ca. = " spumosum
17. Flerårig ..... 18.
Enårig 26.
18. Hovederne næsten siddende, med 1-3(-5) blomster uniflorum
" mangeblomstrede 19.
19. Planten m.m. glat ..... 20.
Ihvertfald bægerrøret eller bægertænderne hårede 21.
20. Frugtstilkene kortere end bægerrøret ..... parnassi
" lig eller længere end bægerrøret repens
21. Bægerrøret med 15-20 ribber ..... alpestre
" " 10 ribber 22.
22. Bægerrøret håret ..... 23.
" m.m. glat 25.
23. Mellemste blades fodflige brat tilsmalnede i en børsteformet spids ..... pratense
Mellemste fodflige jævnt tilsmalnede i en grøn spids 24.
24. Bægertænderne m.m. ens og lig røret ..... noricum
Nedre bægertand længere end de 4 øvre ochroleucum
25. Kronen rød. Øvre fodflige lancetformede ..... medium
" gullighvid. Øvre fodflige æg-lancetformede pignantii
26. 5 bægerribber. Fanen furet. Kronen lilla ..... speciosum
Over 5 bægerribber. Fanen ikke furet. Kronen ikke lilla 27.
27. Blomsterstilkene med et lille støtteblad ved grunden. Planten m.m. glat ..... 28.
Blomsterstilkene uden noget støtteblad 31.
28. Hovederne siddende ..... 29.
" stilkede 30.
29. Stængelleddene 1-8cm. Hovederne veladskilte .... glomeratum
" mest under ½cm. Hovederne tætsidd. suffocatum
30. Bægertænderne 3-4 x røret ..... michelianum
" ca. = røret nigrescens
31. Hovederne siddende eller med svøbblade under sig ..... 32.
" stilkede 38.
32. Alle blade spredte ..... 33.
I det mindste de 2 øverste blade modsatte 38.
33. Småbladene med krumme sideribber ..... 34.
" " m.m. rette sideribber 36.
34. Kronen 8-10mm, 2 x bægeret. Fa sidestill. hoveder dalmaticum
" 4-5mm, ca. = " 35.
35. Stænglen dunet. Kronen hvidlig, kortere end bægeret scabrum
" filtet. Kronen blegrød, mindst = bægeret lucanicum
36. Kronen længere end den nederste bægertand ..... tenuifolium
" næppe længere end den nederste bægertand 37.

37. Frugtbægerets tænder oprette eller sammenknebne .. bocconei
" " m.m. udstående striatum
38. Hovedet med et svøb af ofte bladløse fodflige ..... 39.
" uden et sådant svøb 40.
39. Kronen længere end bægeret ..... hirtum
" kortere " " cherleri
40. Bægeret 20-ribbet ..... lappaceum
" 10-ribbet 41.
41. Alle frugtbægertænder ægformet-trekantede ..... clypeatum
Bægertænderne smallere i frugt 42.
42. Fodfligenes frie del uden nogen sylformet spids ..... 43.
" " " med en sylformet spids 45.
43. Hovedet aflangt til cylindrisk ..... incarnatum
" rundt 44.
44. Blomsterne bleggule ..... xanthinum
" hvide til lyserøde stellatum
45. Kronen tydeligt længere end bægeret ..... 46.
" kortere end eller ca. = bægeret 48.
46. Frugtbægerets tænder m.m. oprette; svælget åbent pallidum
" " udbredte; svælget m.m. lukket af en fortykkelse 47.
47. Kronen 8-12mm. Hovedstilkene 2-5cm ..... echinatum
" 5-7mm. " 0-2cm squamosum
48. I det mindste de 2 øvre blade modsatte ..... 49.
Alle blade spredte 51.
49. Alle bægertænder 2-4 x røret ..... dasyurum
Højst 1 bægertand 2 x røret 50.
50. Den nedre bægertand 2 x de andre ..... squarrosum
Bægertænderne nogenlunde ens leucanthum
51. 1-få, mest endestillede hoveder på 2-11cm ..... 52.
Oftest mange hoveder på 1-2½cm 53.
52. Småbladene mest længere end stilken, (½)2-8cm angustifolium
" " kortere " " , 1-2cm intermedium
53. Bægertænderne med bred grund ..... arvense
" børsteformede ligusticum

Trifolium parnassi Boiss.& Spr. -4½cm. Tættuet og tykrodet. Kronen lyserød, 4-6½mm. Blomsterstilken ¾-1½mm. Bægerrøret 1½-4mm. 1500-2650m. VI-mVII(-VIII). TA,KY,KH,ER.

T. repens L. Hvidkløver. 0-2400m. III-XI. TA,PR,OL,KY,KH,ER,m.m.

T. nigrescens Viv. Ledkløver. 5-40cm. Ligner en enårig Hvidkløver. Bælgen lidt indsnøret mellem de mest 4 frø. 0-1500m. III-VI.

T. michelianum Savi Knudekløver. 10-60cm. Opret. Kronen 8-11mm, lyserød, ca. 2 x bægeret. Hovedet 20-25mm bredt. 0-600m. V-VI.

T. glomeratum L. Nøglekløver. 10-20cm. Mange, liggende til opstigende stængler. Hovederne 8-12mm, runde. Kronen 4-5mm, lyserød, lidt længere end bægeret. 0-1000m. IV-VI.

T. suffocatum L. Sandkløver. 1-5cm. Liggende. Hovederne 5-6mm, ofte sammenflydende. Kronen 3-4mm, hvid. Tueformet.0-1500m.III-V.

T. uniflorum L. Lav kløver. 1-3(6)cm. Lav, tueformet. Kronen mest 15-20mm, hvid til rødlilla. 0-1500m. III-VI.

T. spumosum L. Spytkløver. 10-30cm. Liggende eller opstigende. Frugtbægeret pæreformet opblæst. Kronen først hvid, senere lyserød. 0-600m. IV-V.

T. vesiculosum Savi Blærekløver. 15-50cm. Bladene næsten læderagtige, 15-30mm lange, de øvre smallere end de nedre. Hovederne 2-6x2-3½cm. Kronen 1½-2 x bægeret. 0-800m. IV-VI.

T. physodes Steven Skumkløver. 5-25cm. Glat, ikke rodslående, liggende til opstigende. Kronen 8-14mm, lyserød.200-2100m.Udbredt.

T. fragiferum L. Jordbærkløver. 0-800m. IV-VIII.

Trifolium resupinatum L. Omvendt kløver. 10-30cm. Liggende til opret. Blomsten vender fanen nedad, drejet 180°. Frugtbægeret pæreformet, med 2 divergerende tænder. 0-1000m. IV-VII.

T. tomentosum L. Uldhovedet kløver. 10-30cm. Liggende. Fanen vender nedad, drejet 180°. Frugtbægeret næsten kugleformet, de 2 tænder skjulte. 0-700m. IV-VI.

T. speciosum Willd. (T. grandiflorum) Violkløver. 10-30cm. Kronen lilla, ca. 8mm. Øvre bægertænder højst lig røret, nedre 2-3 x så lange. 500-1200m. IV-VI.

T. boissieri Guss. 8-30cm. Hovedets stilk næppe længere end støttebladet. Fanen smal, m.m. længdefoldet over bælgen. IV-V.

T. brutium Ten. 5-20cm. Hovedstilkene 3-5cm, 2-4 x bladene. Stænglerne opstigende. 900-1500m. VI-VII.

T. aurantiacum Boiss.& Spr. Orangekløver. 5-20cm. Øvre fodflige med afrundet til øret grund, de andre ikke. Midterste småblads-stilke over 1½mm. Hovedet 20-25mm i frugt. V-VI.

T. patens Schreber Guldkløver. 20-50cm. Stænglen opret eller opstigende, bugtet. Endesmåbladets stilk 0-2mm. Blomsterne næsten siddende, gyldengule. 0-1200m. VI-VII.

T. aureum Pollich Humlekløver. 15-30cm. Opret. Midtersmåbladet næsten siddende. Blomsterne næsten siddende, 6-7mm. 500-1400m.

T. campestre Schreber Gul kløver. 0-800m. IV-VIII.

T. dubium Sibth. Fin kløver. 200-1600m. V-IX.

T. micranthum Viv. Spæd kløver. 2-10cm. Hovederne med 1-6 blomster med stilke længere end bægerrørets overkant. Kronen 2-3(-4) mm. 0-1300m. V-IX.

T. striatum L. Stribet kløver. 0-1500m. IV-VII.

T. arvense L. Harekløver. 0-1500m. IV-VI.

T. bocconei Savi Tvillingkløver. 5-25cm. Tætdunet. Hovederne 9-15mm, tætte og aflange, de endestillede ofte parrede, men uens. Kronen 4-5mm. 0-800m. IV-VII.

T. tenuifolium Ten. Smalbladet sylkløver. 10-30cm. Øvre småblade linjeformede, nedre ofte bredere. Hovederne runde til ægformede. Kronen gulligt lyserød, 6mm. 0-600m. V-VI.

T. ligusticum Balbis Børstekløver. 10-40cm. Stænglen mørkegrøn, spredt udstående håret. Hovederne ofte parrede med 1 kort- og 1 langstilket. Kronen 3-4mm. Bægeret 4-6mm. 0-800m. IV-VI.

T. scabrum L. Ru kløver. 5-25cm. Minder om Stribet kløver, men bægertænderne stikkende, tilbagekrummede. 0-1300m. IV-VI.

T. lucanicum Guss. Som den foregående. IV-VI.

T. dalmaticum Vis. Ligner scabrum, men stænglerne opstigende, næppe bugtede. Småbladene 8-15mm (5-10mm hos scabrum). Alle bægertænder længere end røret og stærkt krummede i frugt.

T. stellatum L. Stjærnekløver. 8-20cm. Stænglen tæt udstående håret. Hovederne runde, ca. 1½cm i blomst. Bægerrøret 5mm, tænderne 7mm, udspærrede i frugt. Kronen 8-12mm. 0-1000m. IV-VI.

T. xanthinum Freyn Gul stjærnekløver. Lig stellatum, bortset fra kronens farve.

T. dasyurum C.Presl 15-35cm. Ligner T. stellatum, men ofte kraftigere. Småbladene 2-2½cm, m.m. elliptiske, helrandede. Hovederne 2-2½cm, ofte parrede. 300-600m. III-V.

T. incarnatum L. Blodkløver. 0-2200m. IV-VI. Kronen mest gullighvid, sjældent lyserød, meget længere end bægeret.

T. pratense L. Rødkløver. 0-2100m. I-XII.

Trifolium pallidum W.& K. Bleg kløver. 15-40cm. Ligner en enårig udgave af Rødkløver. Kronen hvid eller blegrød. Fodfligene brat tilsmalnede i en trådformet stak. 0-800m. IV-VII.

T. noricum Wulfen Nikkende kløver. ½-16cm. Tættuet og tykrodet. Bladene m.m. alle grundstillede, forneden dækkede af hvidlige fodflige. Kronen 11-24mm, hvid/lyserød. 1800-2350m. VI-VIII. KH. (T. ottonis Spruner er småformer på 1-5cm med rødlilla krone og småblade på 2-8mm.)

T. lappaceum L. Burrekløver. 4-25cm. Kronen 7-8mm, lyserød, lig bægeret i blomst, meget kortere i frugt. Bægertænderne hårede i øvre halvdel. 0-600m. IV-V.

T. hirtum All. Håret kløver. 10-40cm. Ofte udstående grenet, med udstående hår. Hovederne halvkugleformede. Kronen rødlilla, 12-15 mm. 0-600m. V-VI.

T. cherleri L. Svøbkløver. 5-15cm. Sjældent grenet foroven; udstående håret. Hovederne halvkugleformede. Blegrød krone. III-V.

T. medium L. ssp. balcanicum Velen. Bugtet kløver. Underarten har stænglen udstående håret foroven. 600-1800m. V-VIII.

T. pignantii Hauché & Chaub. Langhåret kløver. 15-45cm. Stænglerne ofte langhårede, indtil 3½mm. Småbladene 1-2,3 x så lange som brede. Kronen 13-20mm. 550-2200m. mV-fVIII. TA,PR,KY,KH,ER.

T. alpestre L. Skovkløver. 300-2300m. VI-VIII. KH.

T. angustifolium L. Smalbladet kløver. 8-20(-50)cm. Opret, tiltrykt dunet stængel. Småbladene smalt linjeformede. Bægertænderne med stikkende, glat spids. Kronen lyserød til rødlilla. IV-VII.

T. intermedium Guss. (T. infamia-ponertii) 5-20cm. Som den foregående, men småbladene lancetformede. Bægertænderne ikke stikkende, spidsen med 2-3 lange hår. Kronen hvid eller blegrød. III-V.

T. ochroleucon Hudson ssp. roseum (C.Presl) Bleggul kløver. 20-50cm. Vækst som en Bugtet kløver, men med lidt brederе blade. Kronen 15-20mm, gullighvid eller lyserød. 500-1500m. V-VI.

T. echinatum Bieb. Pindsvinekløver. 10-60cm. Hovederne 8-15mm. Nederste bægertand stiv og tornagtig. Kronen lyserød eller flødefarvet, mindst 2 x bægeret. 0-600m. V-VII.

T. leucanthum Bieb. Hvidblomstret kløver. 15-30cm. Tæt udstående håret. Hovederne langstilkede, ofte to og to, hvidhårede forneden. Frugtbægerets tænder udstående. Kronen 6-8mm. 0-1400m. IV-V.

T. squamosum L. Pigget kløver. 10-40cm. Bægertænderne udstående og fortykkede i frugt, tornagtige, den nedre 2 x resten. Kronen blegrød, lidt længere end bægeret. 0-300m. IV-V.

T. squarrosum L. Krogkløver. 20-80cm. Ofte opret. Bægeret som hos squamosum. Kronen blegrød eller hvid. Småbladene 2-4x¾-1½cm. 0-600m. IV-VI.

T. clypeatum L. 8-35cm. Småbladene 10-20mm. Bægertænderne udstående, bladagtige, mangeribbede. Kronen 20-25mm, lyserød. II-V.

T. globosum L. 10-40cm. Stænglerne liggende til opstigende med udstående hår. Blomsterne 6-9mm, i 2 rækker; de golde bægre udvikles sammen med de frugtbare blomster. II-VI.

T. subterraneum L. Ankerkløver. 3-15cm. Liggende. 2-5 hvidlige blomster på 8-14mm, omgives senere af flere golde bægre. Modne hoveder tiltrykte jorden eller underjordiske. 0-1200m. IV-VI.

Dorycnium. Hanefod. 5 småblade, nederste par grundstillede.

D. hirsutum (L.) Ser. Håret hanefod. 20-50cm. Tæt udstående håret. Bladskaftet meget kort. 5-10 hvide eller lyserøde blomster på 10-20mm i løse hoveder. 0-1300m. V-VI.

Dorycnium rectum (L.) Ser. Opret hanefod. 30-150cm. Tiltrykt dunet. Hovederne med 15-30 hvide eller blegrøde blomster på 5-6 mm. Mellemste blades skaft mindst 5mm. Sumpplante. 0-900m. IV-V.

D. pentaphyllum Scop. ssp. herbaceum (Vill.) Rouy Snerrehanefod. 20-65cm. De smalle og m.m. fingerstillede blade giver planten et snerrelignende præg. 12-25 3-5mm store blomster i langstilkede hoveder. 0-2000m. V-VII. TA,KY,KH,PN m.m.

Lotus. Kællingetand.

1. Flerårig ..... 2.
   Enårig 7.
2. Bægeret tolæbet med korte sidetænder ..... 3.
   Bægertænderne nogenlunde lige store 5.
3. Sidestillede bægertænder butte, meget kortere end de øvre cytisoides
   Sidestillede bægertænder spidse, kun lidt kortere end de øvre 4.
4. Kølen med rødlillat næb ..... creticus
   " " gult eller brungult næb collinus
5. Øvre småblade smalle, 4-8 x længere end brede ..... tenuis
   " " bredere 6.
6. Bægertænderne mindst 1½ x røret ..... preslii
   " højst " " " corniculatus
7. Bægeret tolæbet med korte sidetænder ..... 8.
   Bægertænderne nogenlunde lige store 10.
8. Bladskaftet under ½ x de nedre småblade ..... halophilus
   " over ½ x " " " 9.
9. Bægertænderne 1½ x røret ..... ornithopodioides
   " 3-4 x røret peregrinus
10. Bælgen 4-8mm bred og tyk, med furet ryg ..... edulis
    " 1-2mm " , uden fure 11.
11. Bælgen 2-3 x bægeret, 10-16mm ..... subbiflorus
    " over 3 x bægeret, 15-60mm 12.
12. Kronen hvid eller blegrød med lilla køl ... conimbricensis
    " gul angustissimus

Lotus tenuis W.& K. Smalbladet kællingetand. 0-800m. V-VIII.

L. corniculatus L. Alm. kællingetand. 0-2400m.TA,PR,KY,KH,ER.

L. preslii Ten. Rudekællingetand. 15-80cm. Hovederne med 1-6 blomster på 10-15mm med stilke på ca. 1½mm. Våde steder. V-VII.

L. subbiflorus Lag. Håret kællingetand. 10-50cm. Tæthåret. Hovederne med 2-4 blomster. Kølen butvinklet bøjet.0-600m.IV-VI.

L. angustissimus L. Tveblomstret kællingetand. 10-50cm. Hovederne med (1)2-3 blomster. Kølen retvinklet bøjet.0-1100m.IV-VI.

L. edulis L. Tyk kællingetand. 10-40cm. Let kendelig ved sin tykke bælg på 2-4cm. 0-900m. III-V.

L. conimbricensis Brot. Hvid kællingetand. Bælgen 2-6cm x 1-2 mm, seglkrummet. Planten 10-30cm. 0-1300m. IV-VI.

L. cytisoides L. Skævtandet kællingetand. 5-20cm. Halvglat til grå silkedunet. Bladene let kødede. Kølen med rødlilla spids. Vingerne lidt længere end den kortnæbbede køl. Kystklipper.

L. creticus L. Sølvkællingetand. 10-40cm. Tæt sølvhåret. Vingerne meget længere end den langnæbbede køl. Klitter. III-VI.

L. collinus (Boiss.) Heldr. Bakkekællingetand. Som foregående, men bladene halvglatte til dunede. Indlandsplante. IV-VI.

L. halophilus Boiss.& Spr. Strandkællingetand. 5-20cm. Opstigende og lådden. Bladskaftet ofte ganske kort. Bælgen 2-3cm, let knudret, krum fortil. Fugtig strand. 0-300m. III-IV.

L. ornihtopodioides L. Fuglekloskællingetand. 10-50cm. Blomsterne 2-3 sammen. Bælgene 2-3cm, knudrede og let krumme. IV-V.

Lotus peregrinus L. Sandkællingetand. 10-30cm. Bælgens stilk kortere end bladet. Bælgen kun let knudret, mest ret. 0-1100m. III-V.

Tetragonolobus purpureus Moench Rød kantbælg. 10-40cm. Dunet enårig. 1-2 mørkerøde blomster sammen på 16-20mm. Bælgen 2½-3½x½cm, dunet, men 4 vinger på 2-4mms bredde. 0-1200m. IV-V.

Hymenocarpus circinnatus (L.) Savi Skjoldbælg. 5-25cm. Enårig. Nedre blade enkle, øvre med 2-3 par små småblade. Bælgen 10-15mm bred, fladt nyre-skiveformet. Kronen 5-7mm, gul. 0-600m. III-IV.

Securigera securidaca (L.) Deg.& Dörfl Hagebælg. 30-100cm. Enårig. 4-7 par småblade. Langstilkede hoveder med 4-7 gule blomster. Bælgen 5-10cm, tilspidset i et m.m. hageformet næb på 1-3cm.IV-VI.

Anthyllis hermanniae L. Tornet rundbælg. 10-50cm. Busk med vredne grene med tornspidsede ender. Bladene 10-13mm, enkle eller trekoblede. Blomsterne i en mellembrudt klase. 0-1600m. V-VII.

A. vulneraria L. Alm. rundbælg. 0-2700m. III-VII. 3 underarter:
ssp. bulgarica (Sagorski) Cullen: Opstigende til opret. Kronen gul. Nedre blade med 1-3 småblade. Svøbblade mindst lig kronen.
ssp. pulchella (Vis.) Bornm.: Liggende til opstigende. Nedre blade med 1-5 småblade. Svøbblade ca. = bægeret. TA,KY,KH. Rød krone.
ssp. praepropera (A.Kerner) Bornm. (ssp. rubriflora): Opstigende til opret. Kronen hvid til rød. Nedre blade mest med 1 småblad.

A. tetraphylla L. (Tripodion t.) Blærerundbælg. 7-35cm. Liggende enårig. Ofte tilsyneladende kun med 4 småblade. Blomsterne 2-7 sammen i bladhjørnerne. Frugtbægeret oppustet, op til 12mm bredt, ofte rødspidset. 0-1000m. III-V.

Ornithopus compressus L. Fladtrykt fugleklo. 3-30cm. Gulblomstret enårig. Øvre blade siddende. Hovederne med et finnet højblad under sig. Bælgen 2-5cm, krum, m.m. fladtrykt. 0-1100m. IV-VI.

O. pinnatus (Miller) Druce Gul fugleklo. 10-40cm. Gulblomstret enårig. Alle blade stilkede. Hovederne uden egentlige højblade. Bælgen 2-3½cm, krum og trind. 0-600m. IV-V.

Coronilla. Kronvikke.

1. Busk. Kronen 14-20mm, gul; fanens negl 2-3 x bægeret emerus
   Urter 2.
2. Nedre blade enkle eller trekoblede med stort endesmablad .. 3.
   " " uligefinnede; småbladene nogenlunde ens 4.
3. Øvre blade enkle eller trekoblede ..... scorpioides
   " " uligefinnede med 2-4 par småblade repanda
4. Flerårig. Kronen hvid til lyserød. 7-12 par småblade .. varia
   Enårig. 3-8 par småblade 5.
5. Kronen 4-7mm. Bælgen m.m. ret, krumnæbbet ..... cretica
   " 7-11mm. " stærkt krummet, retnæbbet parviflora

Coronilla emerus L. ssp. emeroides (Boiss.& Spr.) Hayek Perlebælg. 10-60(-200)cm. 2-4 par småblade. 3-8 blomster sammen. Bælgen mest 7-14cm. 0-2000m. III-IX. TA,PR,ME,KY,KH,ER.

C. varia L. Giftvikke. 30-120cm. Hovederne med 12-20 blomster på 6-10cm lange stilke. Kronen 7-11mm. 1000-2150m. VI-IX. 1 gl. fund.

C. cretica L. Hvid kronvikke. 10-90cm. Bælgen med 5-kantet tværsnit. Kronen hvid eller lyserød. Fodfligene linjeformede. V-VI.

C. parviflora Willd. (C. rostrata) 8-40cm. Fodfligene ægformede. Kronen lyserød, hvid eller gul. 0-1100m. IV-VI.

C. scorpioides (L.) Koch Skorpionsvikke. 5-20cm. Bladene elliptiske, enten enkle eller med 2 små, runde sidesmåblade. Bælgene krumme, skorpionshaleagtige, med m.m. rette led. 0-800m. IV-V.

C. repanda (Poiret) Guss. Bølget skorpionsvikke. 5-20cm. Nær foregående, men bælgens led tydeligt krumme. 0-600m. IV-V.

Hippocrepis. Hestesko. Gulblomstrede. Bælgens led måne- til hesteskoformede.

1. Flerårig ..... comosa
   Enårige 2.
2. 2-6 blomster i skærme, stilken mindst 1½cm ..... 3.
   1-3 m.m. siddende blomster 4.
3. Kronen 3-5mm. Bælgen langvortet-randfrynset ..... ciliata
   " 5-8mm. " m.m. glat .. multisiliquosa
4. Bægertænderne spidse og glatte ..... unisiliquosa
   " butte og randhårede biflora

Hippocrepis comosa L. Almindelig hestesko. 10-33cm. 3-8 par småblade. 3-8 blomster sammen i skærme med stilke på 4-13cm. 1100-2350m. sV-IX. TA,PR,ME,KY,KH,ER.

H. unisiliquosa L. Bælgens indbugtninger med over 0,2mm lange frynser. Kronen indtil 5mm. Fanen rundagtig, med afstudset grund. 5-40cm. II-V.

H. biflora Sprengel (H. unisiliquosa p.p.) Enblomstret hestesko. 5-35cm. Bælgens indsnøringer m.m. glatte. Kronen indtil 6½ mm. Fanen trapezformet med m.m. kileformet grund. 0-1200m.III-V.

H. ciliata Willd. Børstehestesko. 5-30cm. Frøene på bælgens konvekse side. Småbladene ½-3mm brede. 0-600m. III-V.

H. multisiliquosa L. Flerblomstret hestesko. 5-30cm. Frøene på bælgens konkave side. Småbladene 2-5mm brede. 0-600m. III-V.

Hammatolobium lotoides Fenzl (Tripodion graecum) 8-20cm. Med flere, liggende, lådne stængler. Med (3-)5 uens småblade. 1-5 gule blomster sammen. Bælgen 1-3cm. 1350-2200m. sV-sVII.TA,ME,KH

Scorpiurus. Skorpionshale. Enårige med enkle, m.m. spatelformede blade. Blomsterne gule med brunåret fane i langstilkede, 1-5-blomstrede hoveder. Bælgen cylindrisk, uregelmæssigt snoet, med længderibber og ofte med torne og knuder.

S. muricatus L. Flerblomstret skorpionshale. 5-15(-40)cm. Hovederne med 2-5 blomster. Bælgen glat eller med knuder og torne. 0-1200m. IV-V.

S. vermiculatus L. Enblomstret skorpionshale. Blomsterne 1(2) sammen. Bælgen med paddehatformede knuder. 0-600m. IV.

Hedysarum spinosissimum L. Tornet hanekløver. 10-30cm. Liggende enårig. 4-8 par småblade. Kronen hvid eller blegrød, 8-11mm, 1½-2 x bægeret. Bælgen 2-4-leddet med krogede torne og skiveformede led. 0-600m. IV-V.

H. glomeratum Dietrich Rødstænglet hanekløver. 10-30cm. Som foregående, men 8-10 par småblade. Kronen 14-20mm, 2½-5 x bægeret. Bælgen oftest med 2 led. 0-1000m. III-V.

Onobrychis. Fruespejl. Bælgen m.m. rund og fladtrykt, med grubede eller netårede, ofte tornede sider. Kronen rød eller hvid.

1. Enårig. Blomsterne rødlilla ..... 2.
   Flerårig 4.
2. Kronen 10-12mm. Randtornene bredt trekantede aequidentata
   " 7-8mm. 3.
3. Bælgen med 3-4 bredt trekantede, tandede tænder crista-galli
   " " 4-9 smalle tænder caput-galli
4. Bælgen helt uden tænder ..... aliacmonia
   " med tandet rand 5.
5. Fanen mindst 1,2 x kølen ..... ebenoides
   " kortere end til lidt længere end kølen 6.
6. Bælgen lådden, hårene mindst ½ mm ..... alba
   Bælgens hår højst ½ mm 7.
7. Kronen 10-12mm ..... montana
   " 5-9 mm lasiostachya

Onobrychis ebenoides Boiss.& Spr. -45cm. Tiltrykt grådunet. Kronen 7-10mm, lyserød. Bægertænderne 2-3 x røret. Bælgen tætfiltet, med 4-5 randtænder.

O. alba (W.& K.) Desv. Hvidt fruespejl. -60cm. Kronen 8-14mm, hvid eller lyserød. Bælgens sider tandede. Bægertænderne 2-3 x røret. 900-2000m. sV-fIX. 2 underarter:
ssp. alba: Nedre blades småblade 8-35mm. Kronen mest hvid. Bægeret hvidhåret.
ssp. laconica (Orph.) Hayek (ssp. pentelica): Nedre blades småblade 5-12mm. Kronen rød. Bægeret brunhåret. TA,PR,OL,KY,KH.

O. montana DC. ssp. macrocarpa Strid Bjærgfruespejl. Klasestilken liggende, 4-15cm. Ofte kun 1 udviklet bælg i hver klase. Bælgen ca. 9mm, randtornene 2-3mm. 1700-2300m. VII-VIII. KY,KH.

O. lasiostachya Boiss. (O. arenaria ssp. l.) 15-30cm. 5-6 par småblade. Kronen ca. 7mm. Blomstrende klase højst 7cm.

O. aliacmonia Rech.f. 15-20cm. 3-4 par småblade. Kronen blegt gullig-lyserød med røde striber. Modne bælg 12-14mm, nyre-kredsformet. VI-VII.

O. caput-galli (L.) Lam. Hanehovedfruespejl. 5-45cm. Klasestilken mest kortere end bladet. Bælgen 7-10x7-10mm. 0-800m. IV-V.

O. aequidentata (Sm.) d'Urv. 5-45cm. Klasestilken mest 2-3 x bladet. Bælgen 10-16x8-12mm. 0-800m. IV-V.

O. crista-galli (L.) Lam. 5-40cm. Bælgen 12-15x9-12mm. III-IV.

Ebenus sibthorpii DC. 15-30cm. Flerårig urt. 2-4 par småblade; forlænget bladskaft. Fodfligene med 3-4-delt spids. 10-15mm lange rødlilla blomster i hoveder. Bælgen indesluttet i bægeret.

OXALIDACEAE

Oxalis corniculata L. Nedliggende surkløver. 5-30cm. Liggende, ofte lillaanløben flerårig. Småbladene 5-18x8-23mm. Gule blomster. Kronbladene 4-7mm. 0-800m. IV-VI.

O. pes-caprae L. Svovlgul surkløver. 5-20cm. Ingen overjordisk stængel. 5-12 store, svovlgule blomster i skærme med kronblade på 20-25mm. 0-600m. XI-V.

GERANIACEAE

Geranium. Storkenæb.

1. Kronbladene hele ..... 2.
   " udrandede til tolappede 7.
2. Flerårig ..... 3.
   Enårig 4.
3. Bægeret opret. Kronen kraftigt rødlilla ..... macrorhizum
   " ikke opret. Kronen blegt rødlilla asphodeloides
4. Bladets omrids femkantet ..... 5.
   " " rundt 6.
5. Støvknapperne rødbrune. Kronen længere end bægeret robertianum
   Støvknapperne gule. Kronen ca. = bægeret purpureum
6. Bægeret opret i blomst. Bladoversiden skinnende .... lucidum
   " m.m. udstående i blomst. Mat overside rotundifolium
7. Bladets omrids 5-kantet ..... 8.
   " " rundt 13.
8. Kronen blålilla ..... 9.
   " rødlilla eller bleg 10.
9. Flerårig. Kronbladene ca. 15mm ..... peloponesiacum
   1-2-årig. " 8-9mm bohemicum
10. Med nogle grundstillede blomsterstandsstilke subcaulescens
    Uden grundstillede blomsterstandsstilke 11.
11. Bladafsnittene rudeformede og tandede ..... versicolor
    " fligede 12.

12. Blomsterstilkene kirtelhårede ..... macrostylum
" ukirtlede tuberosum
13. Bægeret langt brodspidset ..... 14.
" kort " 15.
14. Blomsterstilkene 5mm, i frugt 15mm ..... dissectum
" 2-4cm columbinum
15. Delfrugterne jævne og hårede ..... pyrenaicum
" rynkede og glatte 16.
16. Nederste skærmstilk kortere end bladet ..... molle
" " lig eller længere end bladet brutium

Geranium macrorhizum L. Klippestorkenæb. 20-50cm. Bladene med mest 7 fjerlappede flige, 8-10cm brede. Bægeret rødligt. Kronbladene 15-17mm. Mest på urer. 1500-2100m. VI-VIII. TA.

G. subcaulescens DC. 5-25cm. Grundbladene m.m. grå, 1½-4cm brede. Kronbladene 10-16mm, mest mørkt rødlilla med mørkere årer og ofte sortlilla grund. 1500-2400m. mV-sVIII. TA,OL,KY,KH,ER,PN.

G. versicolor L. Året storkenæb. 15-50cm. Bladene 5-8cm brede. Kronen noget trompetformet, kronbladene 15-16mm, bleglilla og mørkårede. 500-1400m. IV-VI.

G. peloponesiacum Boiss. Stænglen kirtlet foroven. Bladene 8-12 cm brede, 65% delte. Blomsterstilkene kirtlede, bægeret ligeså.

G. tuberosum L. Knoldstorkenæb. 20-50cm. Grundbladene 6-8cm brede, med 5-7 dybt fligede afsnit. Bægeret 4-7mm. Kronbladene 8-13mm og rødlilla. 0-1000m. II-V.

G. macrostylum Boiss. 10-30cm. Grundbladene som hos tuberosum. Kronbladene 11-15mm, lyserøde med mørkere årer. 1000-2100m. mV-fVII. PR,ME,KY,KH,ER,PN.

G. asphodeloides Burm.f. Tenstorkenæb. 30-75cm. Med tenformede rødder. Bladene med 5-7 kileformede afsnit med trespidset forkant. Kronbladene ca. 15mm, blegt rødlilla med mørkere årer.V-VI.

G. bohemicum L. Klæbrigt storkenæb. 25-60cm. Udstående håret og klæbrig. Bladafsnittene kileformede og dybt lappede. Bægerbladene med en stak på 2-3mm. 1000-1900m. VII-IX.

G. pyrenaicum Burm.f. Pyrenæisk storkenæb. 900-2200m. V-VIII.

G. rotundifolium L. Rundbladet storkenæb. 5-40cm. Stængler og blade med korte og lange hår samt kirtelhår. Blomsterstilke mørkkirtlede. 0-2000m. IV-sVIII.

G. molle L. Blødt storkenæb. Bladene grågrønne. Kronbladene 5-6mm. 0-1900m. III-VIII.

G. brutium Gasp. Grønt storkenæb. 20-70cm. Ligner foregående, men bladene grønne og kronbladene (6-)9-11mm. 0-1900m. IV-VIII.

G. columbinum L. Storbægret storkenæb. 0-1200m. III-X.

G. dissectum L. Kløftet storkenæb. 0-1300m. IV-IX.

G. lucidum L. Skinnende storkenæb. 0-1400m. IV-IX.

G. robertianum L. Stinkende storkenæb. Kronens plade 6-9mm. Støvkornene orange. Frugten med 1-2 tværrynker foroven. V-X.

G. purpureum Vill. Purpurstorkenæb. 5-20cm. Kronens plade 3-5 mm. Støvkornene gule. Frugten med 4 tværrynker foroven. Ellers meget lig foregående. 0-1200m. IV-IX.

Erodium. Hejrenæb.

1. Kronbladene citrongule ..... chrysanthum
" ikke gule 2.
2. Skærmene med 2 brede støtteblade ..... laciniatum
" " 3-flere støtteblade 3.
3. Frugtens næb 5-11cm ..... 4.
" " 1-4½cm 6.

4. Små lapper på skaftet mellem bladafsnittene ..... ciconium
   Bladene anderledes 5.
5. Støttebladene brune. Frugten 8-11mm ..... botrys
   " hvidlige. Frugten 12-15mm gruinum
6. Grundbladene ikke helt snitdelte ..... 7.
   " fjersnitdelte helt til skaftet 8.
7. Frugtens topgrube med en dyb fure under sig .... malacoides
   " " uden nogen " " " chium
8. Bladafsnittene højst 50% indskårne ..... moschatum
   " delte helt til skaftet cicutarium

Erodium chium (L.) Willd. Lappet hejrenæb. 5-50cm. Bladene ægformede, meget forskelligt indskårne. Kronbladene 5-9mm, lidt længere end bægeret. 0-600m. III-IV.

E. laciniatum (Cav.) Willd. Fliget hejrenæb. 7-50cm. Bladene meget forskelligt indskårne: fra udelte og savtakkede til næsten 2 x fjersnitdelte. Frugtens næb 3½-9cm. 0-750m. III-V.

E. malacoides (L.) L'Hér. Blødt hejrenæb. 10-60cm. Bladene oftest svagt 3-lappede, undertiden mere delte. Bæger 5-7mm, krone 5-9mm, mørkrosa. 0-1000m. II-V.

E. botrys (Cav.) Bertol. Langhåret hejrenæb. 10-40cm. Nedre blade fra fjerlappede til 1-2 x fligede. Frugtens topgrube med 2 tydelige furer under sig. Kronbladene ca. 15mm, blalilla. III-V.

E. gruinum (L.) L'Hér. Storblomstret hejrenæb. 10-50cm. Grundbladene m.m. tredelte. Bægerbladene 15-22mm, heraf er 2-7mm en stak. Kronbladene 15-25mm. 0-1200m. III-V.

E. ciconium (L.) L'Hér. Mellembrudt hejrenæb. 10-70cm. Bægeret 10-15mm, heraf en stak på 4-6mm. Kronen 7-8mm, blålilla (rød?). Frugtens topgrube uden fure under sig. 0-500m. III-V.

E. chrysanthum L'Hér. Svovlhejrenæb. 3-12cm. Tvebo flerårig. Grundbladene sølv-silkehårede, 2 x fjersnitdelte. Kronbladene 8-10mm. Frugtens næb 4-5cm. 1000-2200m. V-VIII. TA,PR,ME,KY,KH.

E. cicutarium (L.) L'Hér. Alm. hejrenæb. 0-2100m. XI-V.

E. moschatum (L.) L'Hér. Moskushejrenæb. 10-50cm. Moskuslugtende. Kronen 13-14mm, rødlilla. Frugterne udstående brun- eller hvidhårede. Næbbet 2-4½cm. 0-1300m. XI-V.

Biebersteinia orphanidis Boiss. 35-60cm. Opret, kirteldunet flerårig. Bladene indtil 35cm, 3 x delte, de nedre trekantede. Stænglen ender i et enkelt, ret tæt aks. Bægerbladene taglagte, lidt uens, indtil 20mm i frugt. Kronbladene ca. 5mm, lyserøde, kortere end bægeret, med frynset rand. 1400-1750m. V-VI. S.f. OL.

ZYGOPHYLLACEAE

Tribulus terrester L. Korstorn. 10-60cm. Dunet, liggende enårig. Bladene modsatte, ligefinnede, med 5-8 par småblade. Stilkede, gule, akselstillede blomster. Kronbladene 4mm. Frugten tornet, kan minde om en femtakket malteserkors. 0-800m. VI-X.

LINACEAE

Linum. Hør.

1. Alle blade modsatte. Kronen hvid ..... catharticum
   I det mindste de øvre blade spredte 2.
2. I det mindste de øvre blade med et par kirtler ved grunden 3.
   Bladene uden kirtler ved grunden 7.
3. Enårig. Bladranden ru, fint savtakket ..... nodiflorum
   Flerårig. Bladranden jævn, helrandet 4.
4. Kronen gul ..... elegans
   " rød eller hvid 5.
5. Kronen lyserød ..... hellenicum
   " hvid 6.

6. Bægerbladene med bred hvid rand og hvid, vinget midterribbe ..... leucanthum
Bægerbladene anderledes phitosianum
7. Planten dunet, hårene over 1mm. Kronen lyserød .. pubescens
" glat, eller hårene under 1mm 8.
8. Kronen blå ..... 9.
" gul, lyserød eller hvid 13.
9. Bladranden ru ..... aroanium
" jævn 10.
10. Griflerne sammenvoksede næsten til spidsen ..... hologynum
" helt eller næsten frie 11.
11. Støvfangene hovedformede ..... 12.
" linjeformede bienne.
12. Planten udstrakt. Bladene meget tætstillede .... punctatum
" opstigende/opret. Bladene tætstillede austriacum
13. Kronen lyserød til hvid ..... tenuifolium
" gul 14.
14. Flerårig. Nedre blade modsatte ..... maritimum
Enårig. Nedre blade spredte 15.
15. Bladranden jævn ..... trigynum
" ru 16.
16. Blomsterstilkene tykke, mest kortere end bægeret strictum
" tynde, mindst lig bægeret corymbulosum

Linum elegans Spruner Lav hør. 5-15cm. Med golde,rosetbærende skud. Kvasten mest med 1-6 blomster. Kronbladene 15-23mm. -2500m. V-VII. TA,PR,ME,KH.

L. leucanthum Boiss.& Spr. Ligner den foregående, men bladene m.m. dækkede af meget korte, stive hår.

L. phitosianum Christodoulakis & Iatrou -28cm. Bladene glatte eller fintdunede, de mellemste omvendt lancetformede, 14-30mm. Blomsterne i en meget åben dobbeltsvikkel. 100m. IV-V. Nær Vlakhiotis i Lakonien.

L. hellenicum Iatrou 8½-15cm. Stængelbladene aflangt-spatelformede til æg-lancetformede, glatte til dunede. Kvastene ret tætte. Kronbladene 18-20mm. 400-500m. sIV-V. SØ-halvøen: mellem Monemvasia og Neapolis.

L. aroanium Boiss.& Orph. Tyndstænglet hør. 10-30cm. Bladene 8-15x1½-3mm. Bægeret 6-8mm. Kronen 12-15mm. 1200-1900m.V-VI.KY,KH

L. hologynum Rchb. Engriflet hør. 10-60cm. Bægeret 6-9mm, smalt hindekantet, med gullig midterribbe. Kronen 8-13mm. VI-VII. KH.

L. austriacum L. ssp. collinum Nyman Østrigsk hør. Frugtstilkene nedbøjede. Mest mangeblomstrede kvaste. 0-2000m. V-VII. PR,KY.

L. punctatum Presl ssp. pycnophyllum (Boiss.+ Heldr.) Gustavsson Mangestænglet hør. -18cm. Med mange, liggende, golde skud på indtil 10cm. Blomstrende skud 2-8cm, for enden af foregående års skud. Bladene 3-8x¾-1½mm. Kvastene med 1-3 blomster.V-VII. KY,KH.

L. bienne Miller Toårig hør. 10-20cm. Bladene 10-45mm, indtil 10mm brede, med 3-5 ribber. Frugtstilke oprette. 0-700m. V-VII.

L. nodiflorum L. Soløjehør. 10-40cm. Nedre blade spatelformede. Blomsterne næsten siddende i næsten akselignende stande. Kronbladene gule, ca. 20mm. 0-600m. V-VI.

L. pubescens Banks & Sol. ssp. sibthorpianum (Margot & Reuter) P.H.Davis 7-35cm. Med 1-2 stængler. Bægeret 8-10mm. Kronen 16-20mm. Øverste blade mest kirtelrandede. 0-500m. III-VI.

L. maritimum L. Strandhør. 10-40cm. Bægeret 3mm, svagt kirtelrandhåret. Kronen 8-15mm. Nedre blade 3-strengede, øvre 1-strengede. Om. VI-IX.

L. trigynum L. Fint hør. 10-30cm. Opret og grenet. Bladene 1-2

mm brede. Bægeret 3-4mm, kort kirtelrandhåret, med børsteformet spids. 0-1350m. III-V.

Linum tenuifolium L. Smalbladet hør. 20-40cm. Opstigende flerårig med forveddet grund. Bladene linjeformede, tætsiddende på de golde skud. Kronen 15mm. Bægeret kirtelrandhåret. 0-1900m. V-VI.

L. strictum L. Rubladet hør. 10-45cm. Kronen 6-12mm. Blomsterstanden aksformet, blomsterne m.m. siddende. 0-1150m. IV-V.

L. corymbulosum Rchb. 10-40cm. Kronen 6-12mm. Blomsterstanden åben og halvskærmagtig. 0-1250m. IV-V.

L. catharticum L. Vild hør. 1200-2200m. VI-VII.

Radiola linoides Roth Tusindfrø. 0-1050m. VI-IX.

EUPHORBIACEAE

Andrachne telephioides L. Avneblad. 20-40cm. Lidt mælkurteagtig plante. Bladene 4-6x2-3½mm, med sølvskinnende akselblade. Blomsterne små, 5-6-tallige med gule kronblade, i de øvre bladhjørner. Kugleformet 3-delt frugt på 2-3mm. 0-700m. III-VII.

Chrozophora tinctoria (L.) Juss. Lakmusplante. 10-30cm. Nærmest mældeagtig enårig, tæt stjærnefiltet. Bladene grågrønne, æg- til rudeformede. Frugten tydeligt tretallig, tæt dækket af skjoldformede hår. 0-700m. V-IX.

C. obliqua (Vahl) Juss. Hvid lakmusplante. 10-50cm. Som den foregående, men hvidlig og meget tæt stjærnefiltet. Bladene med afskåret til svagt hjærteformet grund. 0-600m. VI-VIII.

Mercurialis annua L. Enårig bingelurt. 10-50cm. Glat eller lidt håret, oftest opret og grenet enårig med bredt lancetformede, afrundet savtakkede blade på 1½-5cm. Stænglen firkantet. Tvebo. Oprette hanaks. 0-1300m. I-XII.

Ricinus communis L. Kristpalme. 1-4m. Enårig eller busk. 20-30cm brede, stjærneformede blade med 5-8 lancetformede takker. Blomsterne i smalle, oprette toppe. Frugterne 1-2cm, runde og småpiggede. 0-300m. VII-X. Forvildet.

Euphorbia. Vortemælk.

1. Stængelbladene modsatte. Liggende enårige arter ..... 2.
" spredte 5.
2. Bladstilken 2-3mm. Kapslen næsten glat. Glatte frø peplis
" ½-1mm. De modne frø rynkede 3.
3. Kapslen kun håret på kølene ..... prostrata
" håret over det hele 4.
4. Kapslen tiltrykt håret ..... maculata
" udstående håret chamaesyce
5. Kirtlerne m.m. afrundede, med udadbuet yderkant ..... 6.
" med indadbuet eller ret yderkant 17.
6. Enårig ..... 7.
Flerårig 10.
7. Kapslen jævn ..... 8.
" vortet 9.
8. Kapslen vinget ..... pterococca
" uden vinger helioscopia
9. Kapslens vorter halvkugleformede ..... platyphyllos
" " trådformede akenocarpa
10. Busk ..... 11.
Urt 13.
11. 10-30cm. Tornspidsede grene og skærmstråler acanthothamnos
80-300cm. Ikke tornet 12.
12. Kapslen jævn ..... dendroides
" vortet bivonae
13. Kapslen jævn, med affaldende hår ..... villosa
" vortet 14.

14. Planten 1-20cm, liggende til opstigende ..... 15.
" 30-80cm, tæt håret 16.
15. Glat. 1 skærmstråler. Lilla kirtler ..... capitulata
Dunet. 3-5 skærmstråler. Gule kirtler apios
16. Kapslen glat. Frøene jævne ..... oblongata
" mest håret. Frøene fint knudrede pubescens
17. Enårig ..... 18.
Flerårig 22.
18. Bladene brede: bredt lancetformede til næsten runde .... 19.
" smalt lancet- til linjeformede 20.
19. Kapslen med 2 vinger på hver klap ..... peplus
" uden vinger falcata
20. Støtte- og højbladene linjeformede ..... exigua
Højbladene æg-rudeformede 21.
21. Bladene meget tætstillede, 0,2-3mm brede ..... aleppica
" spredtstillede, 3½-5mm brede taurinensis
22. Højbladene sammenvoksede ved grunden ..... 23.
" indbyrdes frie 24.
23. Kapslen med udstående hår ..... characias
" glat heldreichii
24. (15-)20-30 skærmstråler ..... seguierana
2-12 skærmstråler 25.
25. Kirtlerne med korte, m.m. udvidede horn. Kapslen 5-8mm 26.
" " spidse horn. Kapslen 2½-5mm 27.
26. Bladene omvendt ægformede til m.m. runde ..... myrsinites
" lancetformede rigida
27. Skærmenes støtteblade lig bladene og ulig højbladene ... 28.
" " m.m. lig højbladene 29.
28. Kirtlerne korthornede. Bladene læderagtige ..... paralias
" langhornede. " ikke læderagtige terracina
29. 2-3 skærmstråler ..... herniariifolia
(3)4-5 skærmstråler deflexa

Euphorbia peplis L. Sandvortemælk. 5-20cm. Kapslen 4-5mm bred. Bladene lidt kødede, blågrønne, stærkt usymmetriske. Om. VI-X.

E. chamaesyce L. Skævbladet vortemælk. 5-30cm. Bladene usymmetriske, spidsen but eller udrandet. Kapslen 2x2mm. 0-700m. VI-X.

E. maculata L. (E. supina) Pletvortemælk. 5-20cm. Stænglerne dunede. Bladene med skævt afskåren grund, oftest med en lilla plet midtpå. Frøene med 3-4 tværfurer. 0-600m. V-X.

E. prostrata Aiton Kølhåret vortemælk. 5-20cm. Bladene ofte rødlige. Nedre fodflige ofte sammenvoksede. Frøene med 5-7 furer.

E. dendroides L. Trævortemælk. 1-3m. Halvkugleformet, gaffelgrenet busk. Bladene 2½-6½cm x 3-8mm, kun på de unge grene. Skærmen med 5-8 stråler. Støttebladene som stængelbladene. 0-500m.XI-IV.

E. villosa W.& K. Håret vortemælk. 50-100cm. Bladene m.m. lancetformede, 2-6x1-2cm. Planten mest håret. 5- flere skærmstråler, først 3- og så 2-delte. 0-600m. V-VI.

E. akenocarpa Guss. (E. zahnii) Børstevortemælk. 15-45cm. 2-5 skærmstråler. Kapslen forveddet, mest uopspringende. Vorterne med børsteformet spids. 0-600m. IV-V.

E. oblongata Griseb. Bladene smalt omvendt ægformede. Støttebladene ægformede, ca. = skærmstrålerne eller lidt kortere. Kapslens vorter få og korte. 0-100m. V.

E. apios L. Roevortemælk. 5-20cm. Med roeformet rodknold på 2-7 cm. Nederste blade skælformede. Liggende til opstigende. Kapslens vorter korte og kegleformede. 0-800m. V-VI.

E. bivonae Steudel Rødgrenet vortemælk. 80-150cm. Stænglerne bladløse forneden, tætbladede foroven. Kapslen 3½-5mm, med lave, brede knuder. 4-5 skærmstråler. Kystklipper. 0-300m. XI-IV.

Euphorbia acanthothamnos Heldr.& Sart. Hjortetaksvortemælk. Halvkugleformet dværgbusk, tornet af stive, gaffelgrenede skærmstråler. 3(4) skærmstråler. 0-2000m. III-V.

E. capitulata Rchb. Knopvortemælk. 1-20cm. Mange, liggende stængler. Bladene 5-8x3-4½mm. Kapslen ca. 3½-4½mm, med lilla knuder. 950-2800m. sV-VII. KH.

E. platyphyllos L. ssp. literata Rottevortemælk. 15-80cm. Lancetformede blade med let hjærteformet grund og finttandet spids. Ofte noget lillaanløben. Mange ekstrastråler. 0-1000m. VI-IX.

E. pubescens Vahl Dunet vortemælk. Opret og mest tætdunet. Bladene lancetformede, grågrønne og finttandede. Kapslen med aflange knuder. 0-500m. V-X.

E. pterococca Brot. Vinget vortemælk. 10-30cm. Bladene lancet- til spatelformede. De 5 skærmstråler først 3- og så tvegrenede. Kapslen med 2 bølgede vinger på hver klap. 0-500m. IV-V.

E. myrsinites L. Blågrøn vortemælk. 20-30cm. Bladene tykke og kødede, blågrønne. Liggende til opstigende. 5-7(-12) skærmstråler. 600-1900m. V-VI.

E. rigida Bieb. Rank vortemælk. 30-50cm. Stærkt blågrøn. Bladene noget tykke og kødede. Svøbet med oprette, trekantede lapper mellem kirtlerne. Kapslen trekantet. 500-1100m. III-VIII.

E. helioscopia L. Skærmvortemælk. 0-1200m. XII-V.

E. exigua L. Liden vortemælk. 0-1000m. IV-VIII.

E. falcata L. Seglvortemælk. 8-30cm. Bladene bleggrønne, de nedre kileformede med afskåret spids, de øvre lancet- til omvendt ægformede. Frøene med 5-6 tværfurer. 0-1000m. IV-VIII.

E. aleppica L. Granvortemælk. 10-30cm. Bladene linjeformede, meget tætstillede foroven, væk forneden. 2-4 op til 5 x delte skærmstråler. Frøene hvidknudrede. 0-600m. V-VII.

E. peplus L. Gaffelvortemælk. 0-1700m. XI-IV.

E. taurinensis All. Udrandet vortemælk. 10-30cm. Bladene ofte med udrandet spids. Mest 4 skærmstråler. Kirtlerne gule med lyserøde horn. Frøene gråhvide, ret dybt grubede. 0-1300m. V-VI.

E. deflexa Sm. Småbladet vortemælk. 12-20(-45)cm. Bladene kort, men tydeligt stilkede, runde til aflange. Kapslen dybt furet. Frøene dybt furede. Planten blågrøn. 0-1800m. IV-VI. KY.

E. herniariifolia Willd. Brudurtsvortemælk. 5-15(-25)cm. Glat eller filtet, liggende til opstigende, stærktgrenet. Bladene ½-10 x ½-5mm, kortstilkede. Kapslen med 2 vinger på hver klap.1400-2600m.

E. seguierana Necker ssp. niciciana (Borbas) Rech.f. Steppevortemælk. 20-50cm. Bladene m.m. smalt lancetformede, blågrønne, lidt læderagtige. Indtil 30 ekstrastråler. 0-1700m. V-VIII.

E. paralias L. Klitvortemælk. 30-60cm. Stængler og blade noget kødede. Bladene 4-25mm, de øvre tætstillede og noget taglagte. 3-6 skærmstråler. Klitter. IV-VIII.

E. terracina L. Langhornet vortemælk. 10-50cm. Kirtlerne med 2 lange horn på 2 x kirtlens bredde eller mere. Kapslen 4-5mm. Frøene jævne. 0-600m. III-V.

E. heldreichii Orph. Kransvortemælk. 30-100cm. Dunet eller halvglat. 2-5 kranse af ekstrastråler under endeskærmen. Kransene med 5-9 stråler. Bladene 4-8x1-2cm. V-fVII. TA,PR.

E. characias L. ssp. wulfenii (Hoppe) A.R.Sm. Stor ulvemælk. 30-80(-180)cm. Kraftig, tætlådden flerårig. Bladene 4½-9cm, smalt lancetformede. 13-30 ekstrastråler. 10-20 skærmstråler. Kapslen 5-6mm. 0-1350m. XII-IV.

RUTACEAE

Ruta. Rude. Flerårige urter. Bladene 2-3 x fjersnitdelte, spredte og kirtelprikkede, med omvendt lancetformede afsnit. Blomsterne grønliggule, i halvskærme, 4-tallige. 8 støvdragere.

R. graveolens L. Haverude. 14-45cm. Kronbladene finttandede. Bægerbladene lancetformede og spidse. 0-1100m. V-VII.

R. chalepensis L. Frynset rude. 20-60cm. Kronbladene langfrynsede. Bægerbladene trekantet-ægformede. 0-800m. III-VII. 2 ssp.:
ssp. chalepensis: Forh. høj. Bladene kortstilkede. Halvskærmen mangeblomstret, meget længere end bladene.
ssp. fumariifolia (Boiss.& Heldr.) Nyman: Forh. lav. Bladene længere stilkede med ganske små afsnit. Halvskærmen fåblomstret, næppe længere end bladene.

Dictamnus albus L. Moses brændende busk. 50-80cm. Flerårig med askeagtige, fjersnitdelte blade. Endestillet kort- og mørkkirtlet top med ret store, lyserøde, mørkårede 5-talsblomster. Kronbladene 2-2½cm, spidse. 10 let opadbøjede, lange støvdragere.

SIMAROUBACEAE

Ailanthus altissima (Miller) Swingle Skyrækker. 5-15m. Træ med spredte, fjerfinnede, m.m. glatte blade på 45-60cm med 13-25 småblade på 7-12cm, der er lancet- til ægformede, tilspidsede, randhårede med 2-4 tænder nær grunden med en stor kirtel under sig. 0-500m. V-VII. Forvildet.

MELIACEAE

Melia azedarach L. Paternostertræ. 5-15m. Barken furet. Bladene spredte, 40-90cm, 2 x fjersnitdelte med spidst ægformede, savtakkede småblade på 2½-5cm. Blomsterne syrenagtige i farve og stand, men 5-tallige og frikronede. V-VI. Dyrket og forv.

POLYGALACEAE

Polygala. Mælkurt.

1. Opret enårig ..... monspeliaca
   Flerårig 2.
2. Alle blade butte. Klaserne med 1-3 blomster ... subuniflora
   Ihvertfald de øvre blade spidse 3.
3. Klaserne samlede i en halvskærmagtig top ..... crista-galli
   " enlige 4.
4. Støttebladene ca. 2 x blomsterstilken i blomst ..... 5.
   " ca. = eller kortere end blomsterstilken 6.
5. Støttebladene rager op over blomsterknopperne ..... comosa
   " " næppe op over blomsterknopp. nicaeensis
6. Bladranden indrullet ..... helenae
   Bladene flade 7.
7. Kronrøret mindst 2/3 x vingerne. Kølen udragende venulosa
   " under 2/3 x " . " ikke udragende 8.
8. Øvre blade tætstillede, større end de nedre ..... alpestris
   " " ej " , ikke større end de nedre vulgaris

Polygala subuniflora Boiss.& Heldr. Butbladet mælkurt. 4-8cm. Alle blade omvendt ægformede, 2½-7x2-4mm. Blomsterne blå. Vingerne 4-5mm. 2000m. VII. KH (øvre del af Styx-dalen).

P. monspeliaca L. Enårig mælkurt. 9-20cm. Grundbladene spatelformede, ca. 8mm, stængelbladene linje-lancetformede, ca. 15mm. Vingerne 6-8mm, hvidliggrønne. 0-800m. IV-V.

P. helenae Greuter Sandmælkurt. Blomsterstilkene meget korte, 1-1½mm i frugt. Vingerne ca. 9x4mm, hvidlige. Kronen blegblå, lidt længere end vingerne. Kythæra: S.f. Kalamos.

P. venulosa Sm. 5-30cm. Stænglen dunet. Vingerne hvide eller lyslilla med grønne årer, 7½-9½mm. Kronen blålig. Bladene fintdunede. 0-1300m. III-V. Grønåret mælkurt.

Polygala nicaeensis Risso ssp. mediterranea Chodat Opstigende mælkurt. 10-35cm. Alle blade linje-lancetformede. Kronen længere end vingerne, disse 6½-9mm i blomst, 10-14mm i frugt. VI-mVIII.

P. comosa Schkuhr Topmælkurt. 7-20(-40)cm. Nedre blade bredere, ofte væk under blomstringen, øvre smallere. Klasen med 15-50 mest lyserøde blomster. Vingerne 4-6mm. 0-1800m. V-VII.

P. vulgaris L. Alm. mælkurt. 0-2200m. V-VII.

P. alpestris Rchb. Bjærgmælkurt. 7-15cm. Fåstænglet. Klaserne med 5-20 blå eller hvide blomster. Vingerne 5-6½mm, kronen ca. lige så lang. 1800-2300m. VI-VIII. som ssp. croatica (Chodat) Hayek.

P. crista-galli Chodat Duskmælkurt. 15-20cm. Klaserne 1-2cm, samlede foroven. Vingerne 5x1½cm.

ANACARDIACEAE

Rhus coriaria L. Garvesumak. 1-4m. Minder om Hjortetakstræ, men næsten stedsegrøn. Bladene 10-18cm, fjerfinnede. Endestillet top. 0-900m. III-IV.

Cotinus coggygria Scop. Parykbusk. ½-2m. Glat busk med spredte, bredt elliptiske, 3-8cm lange, helrandede, lyskantede blade. Tætte, endestillede, grønlighvide toppe, hvis grene bliver langhårede i frugt. Selve frugten 3-4mm, hjærteformet. 0-900m. V-VI.

Pistacia. Pistacie. Buske eller træer med mest finnede blade. Blomsterne reducerede, i tætte, sidestillede toppe.

P. terebinthus L. Terpentintræ. 1-5m. Træ med uligefinnede blade med 3-9 noget læderagtige, elliptiske småblade, der er mørkegrønne ovenpå, grågrønne nedenunder, 3-4½cm, med en kort brod. Frugterne 5-6mm, først koralrøde, senere brune. 0-900m.

P. vera L. Pistacie. 2-5m. Nær foregående, men med 3 (1-5) tynde bredt elliptiske, 4cm store småblade med brod og fremtrædende ribber på undersiden. 0-700m. V-VI. Forvildet.

P. lentiscus L. Mastikstræ. 1-3(-6)m. Stedsegrøn busk med ligefinnede, læderagtige blade med 8-12 småblade på 1-5x½-1½cm. Bladskaftet tydeligt vinget. Frugten ca.4mm, rød, senere sort. 0-700m.

Schinus molle L. Peruviansk pebertræ. 2-8m. Stedsegrønt træ eller busk med tynde, hængende grene. Uligefinnede blade med 7-13 par linje-lanceetformede, ofte savtakkede småblade, der er dunede som unge. Hvidlige blomster i top. VI-VII. Forvildet.

ACERACEAE

Acer. Løn.

1. Bladet med 3 helrandede lapper eller udelt ..... 2.
   " " (mest) 5 m.m. tandede lapper 3.
2. Bladene stedsegrønne med grøn underside ..... sempervirens
   " løvfældende, grågrønne nedenunder monspessulanum
3. Midterlappen næsten helt fri ..... heldreichii
   Bladene højst 2/3 indskårne 4.
4. Bladene randhårede, 4-7cm ..... campestre
   " ikke randhårede, 2-3x2½-3½cm hyrcanum

Acer campestre L. Navr. 0-800m. IV-V.

A. heldreichii Orph. -25m. Bladene 7-10x9-14cm med lidt indskårne tandede eller smålappede lapper. -2100m. VI-VII. KY,KH,ER.

A. hyrcanum Fischer & C.A.Meyer -8m. Kvistene mørklilla, senere gulbrune. Mellemste bladlap oftest parallelsidet, svagt lappettandet; de nedre lapper små og oftest helrandede. TA,KY,KH.
ssp. intermedium (Pancic): Bladene tynde.
ssp. reginae-amaliae (Orph.) Murray: Bladene tykke i det.

A. monspessulanum L. Trelappet løn. 1-12m. Bladet 3-8cm, 3-lappet, skinnende ovenpå, langstilket. 0-1000m. IV-V.

Acer sempervirens L. Stedsegrøn løn. 1-5m. Bladet 2-5cm, 3-lappet eller udelt, læderagtigt, kortstilket. 200-1600m. IV-V.

SAPINDACEAE

Cardiospermum halicacabum L. Saltbøsse, Ballonvin. -2m. Slyngtrådsklatrende enårig. Bladene spredte, 2 x trekoblede med rudelancetformede, uregelmæssigt indskåret-tandede afsnit. Kapslen indtil 3x3cm, trerummet, hjærteformet opblæst. Forvildet.

CELASTRACEAE

Euonymus europaeus L. Benved. 0-800m. IV-VI.

RHAMNACEAE

Paliurus spina-christi Miller Skjoldhat. 1-4m. Busk med tornformede fodflige. Ydre kviste zigzagbøjede. Bladene 2-4cm, toradede og ægformede. Topformet frugt på 7-8mm med en bred, bølget vinge, der gør den 18-30mm bred. 0-500m. V-VI.

Rhamnus. Vrietorn.

1. Alle blade spredte. Ingen torne ..... 2.
   Bladene oftest modsatte. Planten tornet 3.
2. Bladene stedsegrønne og glatte ..... alaternus
   " løvfældende, filtede på begge sider sibthorpianus
3. Bladene stedsegrønne og læderagtige ..... oleoides
   " løvfældende, ikke " 4.
4. Bladene fint rundtakkede, aflange eller ægformede prunifolius
   " helrandede, omvendt ægformede graecus

Rhamnus alaternus L. Stedsegrøn vrietorn. 1-5m. Barken rødlig. Unge kviste dunede. Bladene elliptiske eller bredt lancetformede med en hvidlig hindekant, 2-6cm, læderagtige, helrandede eller med svage, småkirtlede tænder. 0-700m. II-IV.

R. oleoides L. (R. lycioides ssp. o.) Olivenvrietorn. 60-100cm. Bladene 10-23(-40)mm, helrandede eller 1-2-tandede yderst; undersiden mørkt netåret. 0-1400m. IV-V.

R. graecus Boiss.& Reuter (R. lycioides ssp. g.) Som den foregående, men mere nedliggende. Bladene 6-18mm, tyndt fintdunede, til sidst glatte.

R. prunifolius Sm. Småbladet vrietorn. -30cm. Lav og tæt, meget tornet. Kortskuddene talrige, med tætstillede bladfæster, dækkede af blivende fodflige. Bladene mest 6-13mm. 1200-2100m. KY,KH.

R. sibthorpianus Roem.& Sch. Opret, ret lav busk. Kvistene tæt grådunede eller -filtede. Bladene 2-4x1½-3cm, med 5-7(4-11) årer, oftest helrandede. 1500-2450m. sV-VII. TA,ME,OL,KY,KH.

Frangula rupestris (Scop.) Schur Klippetørst. 30-100cm. Krybende til opstigende busk. Bladene 3-6½x2-4½cm, randen svagt kirtelrundtakket, læderagtige, grønne ovenpå, gullige og noget skinnende nedenunder. Kvasten stilket. 500-1500m. sV-VII. KH.

VITACEAE

Vitis vinifera L. ssp. silvestris (Gmelin) Hegi Vild vinranke. Afviger fra de dyrkede former ved at være tvebo og ved at frøene er m.m. runde. 0-800m. V-VII.

TILIACEAE

Tilia tomentosa Moench (T. argentea) Sølvlind. Bladundersiden hvidfiltet. V-VII.

T. rubra DC. Skævbladet lind. Bladene svagt dunede på undersidens ribber, med m.m. brodspidsede tænder.

T. vulgaris Hayne Parklind. Bladtænderne ikke brodspidsede; undersiden glat, dog med hvidlige hår i ribbevinklerne.

MALVACEAE

1. Yderbæger mangler. Kronen gul ..... Abutilon
" forefindes 2.
2. Yderbægeret 2-3-bladet ..... 3.
" 5-13-bladet 5.
3. Yderbægerbladene sammenvoksede ved grunden ..... Lavatera
" frie 4.
4. Yderbægerbladene større end bægerbladene, stilkede ... Malope
" mindre " " Malva
5. Yderbægerbladene indbyrdes frie. En ægformet kapsel Hibiscus
" sammenvoksede ved grunden. Spaltefrugt 6.
6. Blomsterne næsten siddende. Kronbladene 3-5cm ..... Alcea
" stilkede. Kronbladene 1½-3cm Althaea

Malope malacoides L. Håret trompetkatost. 20-50cm. Mest flerårig. Nedre blade 2-5cm, ægformede; de øvre lige sådan eller trelappede. Yderbægerbladene hjærteformede. Rødlilla krone. V-VI.

Malva. Katost.

1. Bægerbladene smalle, over 3 x så lange som brede ... cretica
" ægformede eller trekantede 2.
2. Yderbægerbladene ægformede eller trekantede ..... 3.
" smalle, mindst 3 x så lange som brede 5.
3. Nedre blomster enlige. Øvre blade ofte dybt fligede .. alcea
" " 2-flere sammen. Bladene ikke fligede 4.
4. Kronbladene rødlilla, 12-22mm ..... silvestris
" hvidlige eller blålige, 10-12mm nicaeensis
5. Bladene dybt smalfligede ..... aegyptia
" svagt lappede 6.
6. Kronen ca. 2 x bægeret eller mere ..... neglecta
" ca. = bægeret parviflora

Malva aegyptia L. 5-20cm. Tiltrykt stivhåret enårig. 2 yderbægerblade. Kronen 5-8mm, blegrød, lig bægeret. 0-550m. I-IV.

M. cretica Cav. Smalbægret katost. 10-40cm. Stivhåret enårig. Nedre blade m.m. runde, øvre 3-fligede. Yderbæger og bæger linjeformede. Kronen 8-15mm, lyserød, 1-1½ x bægeret. 0-750m. III-VI.

M. alcea L. Rosenkatost. 0-2000m. VI-IX.

M. silvestris L. Alm. katost. 0-1400m. II-VI.

M. nicaeensis All. Bleg katost. 30-60cm. Oftest enårig. Bægeret ofte glat på undersiden. Kronen uden mørkere årer. 0-800m. V-VII.

M. parviflora L. Småblomstret katost. 20-50cm. Opret enårig. Kronen 4-6mm, hvid med mørkere årer. Frugtstilken mest under 1cm.

M. neglecta Wallr. Rundbladet katost. 0-1800m. V-VIII.

Lavatera. Katost.

1. Blomsterne i nøgler ..... 2.
" enlige (sjældent parvise) 3.
2. Yderbægeret længere end bægeret, ihvertfald i frugt arborea
" kortere " " cretica
3. Enårig, spredt stjærnehåret. Blomsterstilke 3-8cm punctata
Busk, tæt stjærnefiltet som ung. bryoniifolia

Lavatera cretica L. Vejkatost. Ligner meget Alm. katost, men er ofte opret, har bredere yderbægerblade og ikke netrynkede frugter.

L. arborea L. Kæmpekatost. 1-3m. Opret toårig, forveddet ved grunden. Bladene op til 20cm, svagt 5-7-lappede. Yngre dele stjærnefiltede. 0-600m. IV-IX. Vild på kystklipper, ellers forv.

L. bryoniifolia Miller Galdebærkatost. 1-3m. Øvre blade spydformet 3-lappede. Blomsterstilkene 2-15mm. Kronen 1½-3cm, rødlilla. 0-1000m. IV-VI.

L. punctata All. Rødstænglet katost. 20-90cm. Opret. Stænglen ofte m.m. rød. Nedre blade runde, svagt lappede, øvre spydformet 3-

lappede. Kronbladene 1½-3cm. 0-600m. V-VI.

Althaea hirsuta L. Håret stokrose. 10-25cm. Opstigende eller liggende, håret og stjærnehåret enårig. Nedre blade runde, øvre smalt 3-5-fligede. Kronen 15mm, bægeret 13mm. 0-1200m. III-VIII.

A. officinalis L. Lægestokrose. 40-120cm. Tæt gråt stjærnedunet flerårig. Bladene trekantet-ægformede, m.m. lappede. VI-VIII.

Alcea rosea L. Havestokrose. 1-3m. Modne stængel svagt stivhåret eller m.m. glat. Kronbladene 3-5cm, rører hinanden. Frugterne med en smal og dyb fure. 0-800m. V-VIII. Dyrket og forvildet.

A. pallida (Willd.) W.& K. (A. biennis) Bleg stokrose. ½-2m. Modne stængel stjærnefiltet. Kronbladene 3-4½cm, rører ikke hinanden, dybt udrandede. Frugterne 4½-5mm, sortagtige, med glatte sideflader. 0-600m. V-VII.

A. cretica Weinm. ½-2m. Modne stængel tæt stjærnefiltet. Kronbladene 3-4½cm, rører ikke hinanden, mindre dybt udrandede. Frugterne 5½-6mm, lysebrune, med stivhårede sideflader. V-VII.

Abutilon theophrasti Med. Kinajute. 50-100cm. Opret enårig. Bladene rent hjærteformede. Blomsterne i tætte nøgler. Kronbladene 7-13mm, gule. 0-300m. VII-IX.

Hibiscus syriacus L. Syrisk rose. 1-2m. Busk. Bladene 3-7cm, rudeformede, tandede og ofte ret dybt 3-lappede. Kronbladene 4-5cm, blå, røde eller hvide. VI-VIII. Dyrket og forvildet.

H. trionum L. Timeviser. 20-40cm. Opstigende enårig. Stænglerne ru af grove knuder. Bladene delte næsten til grunden i 3(5) fjerlappede afsnit. Kronbladene 15-20mm, lysegule med sortlilla grund. Fugtig jord. 0-600m. VIII-IX.

THYMELAEACEAE

Mindre buske med spredte, endestillede blade. Blomsterne 4-tallige, med enkelt, farvet blomster med m.m. rørformet grund.

1. Bladene helt glatte, 8-11x1½-3mm ..... D. jasminea
   " hårede, i hvert fald som unge 2.
2. Bladundersiden glat og skinnende, oversiden håret T. hirsuta
   Bladene anderledes behårede 3.
3. Blomsterne i endestillede hoveder, 11-19mm .... D. oleoides
   " 2-5 sammen i bladhjørnerne, 4mm T. tartonraira

Daphne oleoides Schreber Olivenkælderhals. 30-50cm. Unge bladundersider lådne. Blomsterne 3-6 sammen, hvide eller flødefarvede. Bladene 13-20 (8-34)mm. 1400-2200m. sV-VIII.TA,ME,OL,KY,KH

D. jasminea Sm. -30cm. Stedsegrøn. Bladene omvendt lancetformede, brodspidsede. Blomsterne mest 2 sammen og endestillede, mest rødlilla udvendigt og hvidlige indvendigt. NØ-Pelop.

Thymelaea hirsuta (L.) Endl. Skællet spurvetunge. 40-100cm. Grenene tæt dækkede af skællignende blade, hvis indadvendte overside er hvidfiltet. Blosteret gult og tætfiltet, 4-5mm.X-III.

T. tartonraira (L.) All. Sølvspurvetunge. 20-50cm. Unge kviste ofte silkehårede. Bladene 9-18mm, silkehårede. Blomsterne gullighvide, ca. 4mm, dunede. 0-1050m. IV-V. 2 underarter:
ssp. tartonraira: Bladene 2-4 x så lange som brede, 2½-7mm brede, svagt til tæt silkehårede.
ssp. argentea (Sm.) Holmboe: Bladene 4-10 x så lange som brede, 1½-3mm brede, tæt sølvsilkehårede.

ELAEAGNACEAE

Elaeagnus angustifolia L. Sølvblad. 2-7m. Grenene dækkede af sølvskæl, ofte noget tornede. Bladene 4-8x1-2½cm, med grøn over- og sølvskællet underside. 1-3 gule, 7-8mm lange blomster i bladhjørnerne. Frugten 1-2cm, gul og sølvskællet. V-VI. Forvildet.

GUTTIFERAE

Hypericum. Perikon.

1. Busk helt uden sorte kirtler på blade og blomster ..... 2.
   Med sorte kirtler på blade eller blomster 3.
2. Bladene 2-6½cm. Planten 30-100cm høj ..... hircinum
   " 3-10mm. " 20-30cm " aegypticum
3. Bladene i kranse på 3 ..... empetrifolium
   " modsatte 4.
4. Bægerbladene helt eller næsten helrandede ..... 5.
   " tandede eller frynsede 9.
5. Bægerbladene bredt overlappende, bredt ægformede olympicum
   " lidet " , smallere 6.
6. Stænglen med 4 vinger ..... tetrapterum
   " trind eller med 2 lister 7.
7. Blomsterstandene 1-blomstrede ..... taygeteum
   " mangeblomstrede 8.
8. Bladene bølgede og stængelomfattende ..... triquetrifolium
   " hverken bølgede eller stængelomfattende perforatum
9. Bladene dunede ..... 10.
   " glatte 12.
10. Bladene uden sorte kirtler ..... hirsutum
    " med " " 11.
11. Bægerbladene langfrynsede ..... delphicum
    " korttandede atomarium
12. Bladene helt uden sorte kirtler inden for randen vesiculosum
    Nogle blade med " " " " " 13.
13. Kronbladene ukirtlet frynsede ..... barbatum
    " kirtel-frynsede eller -tandede 14.
14. Kronbladene højst med nogle sorte kirtler på fladen perfoliatum
    Kronbladene med mange sorte kirtler på fladen 15.
15. Kapslen med mange, tydelige, orange blærer ..... spruneri
    " " svage blærer eller næsten glat rumeliacum

Hypericum hircinum L. ssp. albimontanum (Greuter) Robson Bukkeperikon. Bladene bredt ægformede til ægformet-lancetformede, bukkelugtende ved knusning. 5 grifler. Bægerblade 3-6mm. Kronblade 11-18mm. 0-1000m. VI-VIII.

H. aegypticum L. Klintperikon. Bladene læderagtige og blågrønne, ofte tætsiddende, 3-10x2-3mm. Kronbladene 8-14mm. 0-200m. I-VI.

H. empetrifolium Willd. Rævlingeperikon. 10-60cm. Bladene 2-12 mm, mest linjeformede med omrullet rand. Kun bægeret kirtlet. Blomsterstanden pyramideformet, rigt forgrenet. 0-2300m. IV-VIII.

H. hirsutum L. Lådden perikon. 0-1600m. VI-VIII.

H. taygeteum Quézel & Contandr. 5-10cm. Stænglerne mest liggende. Bladene 2-7mm, med blege kirtler, ægformede til elliptiske.TA.

H. olympicum L. 10-50cm. Bladene lidt blågrønne, med gennemskinnelige kirtler. Kvasten ret åben, med 1-5 blomster. Bægerbladene 9-16x4-7mm. Kronbladene 15-30mm. 0-2200m. sVI-mVIII. TA,PR,KY,KH.

H. delphicum Boiss.& Heldr. 11-35cm. Stænglerne trinde, opstigende. Bladene 12-35mm, m.m. ægformede.

H. atomarium Boiss. 15-75cm. Opret eller opstigende. Bladene 1½-4½cm, ægformede til aflange. Toppen cylindrisk, glat. Kronbladene 9-12mm. V-VII.

H. vesiculosum Griseb. 30-70cm. Bladene 12-25mm, ægformede. Bægerbladene ægformede og butte. Planten opret. Bladgrunden omfattende. Kronbladene sortstribede over hele fladen. V-VI.

H. perfoliatum L. Gennembrudt perikon. 25-75cm. Bladene 13-60mm, ægformede til smalt lancetformede, ofte stængelomfattende. Kronen kan have nogle sorte prikker mod spidsen. IV-V.

Hypericum spruneri Boiss. Tungeperikon. Opret. Bladene 2-4cm, trekantet-lancetformede til smalt aflange. Bægeret med mange sorte prikker.

H. barbatum Jacq. Skægget perikon. 15-40cm. Bægerbladene spidse med mange sorte prikker og streger. Kronbladene ofte sortprikkede. 1000-2200m. fVI-fVIII. KH.

H. rumeliacum Boiss. Kalkperikon. 5-40cm. Opstigende til opret. Bladene 6-35mm, æg-lancet- til linjeformede. Bægeret med mange sorte prikker og streger. mV-VII. 10-1800m.

H. tetrapterum Fries (H. quadrangulum) Vinget perikon. VI-VIII.

H. perforatum L. Prikbladet perikon. 0-1600m. V-VIII.

H. triquetrifolium Turra Risperikon. 13-55cm. Meget stærkt grenet med nærmest pyramideformet udstående grene. Bladene 5-15x2-5 mm. Bægeret uden sorte kirtler, kronen ofte også. 0-900m. VI-X.

VIOLACEAE

Viola. Viol.

1. Stænglerne forveddede forneden ..... 2.
   " ikke forveddede 3.
2. Kronen gul ..... scorpiuroides
   " rød delphinantha
3. De sidestillede kronblade nedadrettede ..... 4.
   " " " opadrettede (Stedmoderblomster) 10.
4. Med bladbærende stængler ..... 5.
   Uden " " 8.
5. Bægervedhængene højst 1mm ..... reichenbachiana
   " 2-3mm 6.
6. Kronen blålilla. Hindeagtige fodflige ..... riviniana
   " blegblå, bleglilla eller hvidlig. Urteagtige fodfl. 7.
7. Nedre fodflige 1-1,2mm brede, langfrynsede ..... oligyrtia
   Fodfligene 2½-4½mm brede, frynsede til tandede sieheana
8. Bladgrunden med afskåret eller meget svagt indbugtet grund ..... chelmea
   Bladgrunden med tydelig indbugtning 9.
9. Fodfligene ægformede. Bladene runde og butte ..... odorata
   " lancetformede. Bladene æg-hjærteformede alba
10. Enårig ..... 11.
    Flerårig 16.
11. Nedre kronblad med spore 5-13mm ..... 12.
    " " " " 14-25mm 17.
12. Lådden med lange, bløde, krusede hår ..... parvula
    Dunet af korte, stive hår, eller glat 13.
13. Kronen 1½-2 x bægeret ..... 14.
    " 0,8-1,2 x bægeret 15.
14. Stivhåret. Kronen gul eller flerfarvet ..... hymettia
    Glat eller svagt dunet. Kronen bleggul mercurii
15. Nedre kronblad ialt 5-8mm, sporen 2-3mm ..... kitaibeliana
    " " " 9-13mm, " 3-5mm phitosiana
16. Fodfligene med mange sideflige ..... 17.
    " " 0-2 par sideflige 18.
17. Kronen bleggul. Bægerbladene ca. 3 x så lange som brede aetolica
    Kronen lilla eller flerfarvet (sj. gul). Bægerbladene 5-6 x så lange som brede tricolor
18. Bladene dunede. Sporen 10mm ..... parnonia
    Planten glat til svagt håret 19.
19. Bladene højst 1cm lange, helrandede ..... brachyphylla
    Med længere blade 20.
20. Bladene noget læderagtige. Taygetos ..... sfikasiana
    " ikke " . Khelmos og Kyllænæ graeca

Viola odorata L. Martsviol. 0-2000m. III-V. TA,PR,KY.

Viola alba Besser Hvid viol. Fodfligene 4-8 x så lange som brede, langfrynsede. Mest med lange udløbere. 0-1950m. IV-VI. 3 ssp.:
ssp. dehnhardtii (Ten.) W.Becker: Blomsterne lilla. Bladene glatte til svagt hårede, med mest konveks rand.
ssp. scotophylla (Jordan) Nyman: Blomsterne mest hvide. Bladene blødhårede, med ret eller konkav rand, -1000m.
ssp. thessala (Boiss.& Spr.) Hayek: Som foregående, men bladene indtil 2 x så lange som brede (1-1½ x hos scotophylla).

V. chelmea Boiss.& Heldr. Ingen udløbere. En kort, opret rodstok, ofte dækket af bladrester. Bladet trekantet til ægformet-aflangt, but, 1-2cm. Blomsterne lugtløse. 1400-2200m.V-VII. TA,ME,KY,KH.

V. reichenbachiana Jordan Skovviol. 0-1950m. IV-VI.

V. riviniana Rchb. Kratviol. Øvre fodflige bleggrønne, 1-2mm brede, bliver ikke større mod stænglens spids. 0-2000m.IV-VI. KH.

V. sieheana W.Becker Fodfligene bliver større, grønne og bladagtige mod stænglens spids. Kronen bleglilla. -1900m. IV-VI. PR.

V. oligyrtia Tiniakou Fodfligene bliver større mod stænglens spids. Kronen blegt rødlilla til hvidlig. Bladene 1,3-2x1-1,6cm, med svagt indskåret grund. 1100-1500m. V-VI. OL (sydsiden).

V. brachyphylla W.Becker Kortbladet stedmoderblomst. 5-10cm. Helt glat. Bladene linje- til aflangt-spatelformede, kortstilkede. Fodfligene lige sådan, men kortere, mest helrandede. Gul blomst.

V. graeca (W.Becker) Hal. 5-20cm. Glat eller svagt håret. Bladene smalle, jævnt tilsmalnede mod grunden, de øvre 6-10 x så lange som brede. Fodfligene smalle, 3-5-delte. Blomsten lilla, gul eller flerfarvet. Sporen 6-10mm. 1700-2300m. V-VIII. KY,KH.

V. sfikasiana Erben 4-10cm. M.m. glat. Bladene grågrønne, helrandede, som hos graeca. Fodfligene 2-3-delte. Blomsten gul. 1850-2280m. TA. VI.

V. parnonia Kit Tan & al. 5-15cm. Nedre blade elliptiske, rundtakkede og langstilkede, øvre smalle. Fodfligene 3-5-delte. Kronen mørkt blålilla, nedre kronblad blegere. 1850-1930m. VI. PR.

V. tricolor L. Alm. stedmoderblomst. 800-2300m.

V. aetolica Boiss.& Heldr. 10-30cm. Nedre blade ægformet-runde, langstilkede. 1200-2000m. IV-VIII. KH.

V. kitaibeliana Schultes Dværgstedmoderblomst. 2-10cm. Bladene ofte under 1cm, svagt rundtakkede. Sporen lidt længere end bægerbladsvedhængene. Frøene 1,2-1,4mm 0-1900m. IV-VII.

V. phitosiana Erben 5-23cm. Bladene 8-32mm. Frøene 1,5-1,7mm. Ellers nær foregående.

V. hymettia Boiss.& Heldr. Stivhåret stedmoderblomst. 3-15cm. Fodfligene fjerfligede. Nederste blade rundagtigt-ægformede, rundtakkede. Nederste kronblad 8-12mm med sporen. 500-1400m. IV.

V. mercurii Orph. 2-6cm. Mest glat. Bladene højst svagt rundtakkede. Fodfligene enkle eller tredelte. 1400-2000m. IV-VII.PR,KY.

V. parvula Tineo Spinkel stedmoderblomst. 2-7cm. Bladene m.m. helrandede. Øvre fodflige 3-4-delte. Kronen bleggul. Nedre kronblad med spore 5-6mm; sporen meget kort. 1000-2350m. TA,PR,KH.

V. scorpiuroides Cosson Gul buskviol. 10-20cm. Bladene lancet- til spatelformede. Fodfligene små, 1-2mm. Kronen kraftigt gul, med lille, sort svælgplet. sXII-fIV. 0-600m.Kythæra,Antikythæra.

V. delphinantha Boiss. Snerreviol. 5-12cm. Bladene siddende, linje-lancetformede, helrandede, 7-14x1-1½mm, fodfligene lige sådan. Sporen meget lang, 16-18mm. 1500-2500m. V-VIII. KH.

CISTACEAE

1. Kapslen med 5,6 eller 10 klapper. Kronen hvid eller lyserød ..... Cistus
   Kapslen med 3 klapper. Blomsterne mest gule, sj. hvide 2.
2. Griflen meget kort eller manglende ..... 3.
   " veludviklet 4.
3. Gulblomstret enårig ..... Tuberaria
   Hvidblomstret småbusk Halimium
4. Alle støvtråde med støvknapper ..... Helianthemum
   Ydre " perlesnorsformede, uden støvknapper Fumana

Cistus. Stenrose. Oprette buske.

1. Kronen lyserød ..... 2.
   " hvid 3.
2. Bladene med 3 parallelle hovedribber ..... parviflorus
   " fjerstrengede creticus
3. Bladene smalle, 3-strengede ..... monspeliensis
   " fjerstrengede, m.m. ægformede salviifolius

Cistus creticus L. Kruset stenrose. 30-100cm. Bladene elliptiske, 1½-2½(-5)cm, grågrønne. Kronen 4-6cm bred. 0-1200m. XII-VI.
ssp. creticus: Bladene klæbrigt-kirtlede, med bølget rand.
ssp. eriocephalus (Viv.) Greuter & Burdet (C. incanus): Bladene lidet kirtlede, flade.

C. parviflorus Lam. Småblomstret stenrose. 30-70cm. Bladene 1-3cm, ægformede, gråfiltede. Kronen 2-3cm bred. 0-550m. IV-V.

C. monspeliensis L. Smalbladet stenrose. 30-100cm. Planten klæbrig. Bladene 15-50x3-6mm, mørkegrønne og fåhårede ovenpå, stjærnefiltede nedenunder. Blomsten 2-3cm bred. 0-700m. IV-V.

C. salviifolius L. Ægbladet stenrose. 30-50cm. Bladet 15-30 x 8-15mm, grønt, med rynket overside og stjærnehår på begge sider. Kronen 3-5cm bred. 0-1000m. IV-V.

Halimium voldii Kit Tan (H. umbellatum p.p.) 15-25cm. Bladene smalle, 5-12x1½-2mm, samlede i grenenderne, mørkegrønne, med omrullet rand. 3-6 blomster sammen i skærmagtige kvaste. IV-fV.

Tuberaria guttata (L.) Fourr. Plettet soløje. 5-30cm. Lådden enårig. Grundbladene i roset, elliptiske, ofte visne under blomstringen. Blomsterne i oprette klaser. Kronbladene ca. 5mm, oftest med en sort plet ved grunden. 0-800m. III-V.

Helianthemum. Soløje.

1. Enårig ..... salicifolium
   Flerårig 2.
2. Halvskærme af 3-5 tætte svikler ..... lavandulifolium
   Blomsterne i løse klaser 3.
3. Kronen hvid ..... apenninum
   " gul 4.
4. Blomsterne siddende ..... stipulatum
   " stilkede 5.
5. Alle blade uden fodflige ..... canum
   Alle eller øvre blade med fodflige 6.
6. Alle blade med fodflige ..... nummularium
   Øvre " " " på 2-3mm, nedre uden hymettium

Helianthemum lavandulifolium Miller (H. syriacum) Langklaset soløje. 10-50cm. Tæt gråfiltet. Bladene 1-5cm x 3-8mm, med hvidfiltet underside. 0-800m. IV-VI.

H. nummularium (L.) Miller Alm. soløje. 0-2500m. V-VIII. 4ssp:
ssp. nummularium: Bladundersiden filtet. Bladene 2-5mm brede. Kronbladene 6-10mm.
ssp. tomentosum (Scop.) Sch.& Th.: Bladundersiden filtet. Bladene 5-15mm brede. Kronbladene 10-15mm.
ssp. glabrum (Koch) Wilczek: Bladundersiden grøn og glat.KH,ER.
ssp. obscurum (Celak.) Holub: Bladundersiden grøn og langhåret.

Helianthemum apenninum (L.) Miller Hvidt soløje. 20-40cm. Fodfligene 1/3 x bladpladen. Denne grøn til hvidfiltet oventpå, grå- til hvidfiltet nedenunder. 0-1800m. IV-VI.

H. stipulatum (Forsskål) C.Chr. Blegt soløje. Grenene kraftige. Bægermidterribben langt hvidhåret, mellemrummene stjærneharede. Kronen bleggul. Sandstrand. I-VII.

H. salicifolium (L.) Miller Enårigt soløje. 5-25cm. Bladene omvendt lancetformede, svagt dunede. 6-25mm. Blomsterstilkene opstigende. Kronbladene (0-)4-9mm. 0-1600m. II-V.

H. canum (L.) Baumg. Gråfiltet soløje. 4-20cm. Bladene æg- eller lancetformede, grønne eller gråfiltede ovenpå, gråfiltede nedenunder. Kronbladene 4-8mm. 1800-2700m. sVI-sVIII. TA,KY,KH.

H. hymettium Boiss.& Heldr. Lav soløje. 5-10cm. Grenene udstrakte. Bladene 7-15x3-6mm, tæt hvidfiltede på begge sider eller grønne ovenpå. Kronbladene 3-4mm. Kort griffel. 1500-2300m. IV-VII.

Fumana. Hedesoløje. Dværgbuske. De 2 ydre bægerblade små, de 3 indre hindeagtige.

1. Bladene uden fodflige ..... 2.
   " med " 3.
2. Blomsterstilken krum, ca. = støttebladet ..... procumbens
   " ret, 2-3 x " ericoides
3. 2 fodflige. Bladene lancetformede ..... arabica
   6-8 fodflige i knippe. Bladene smalle 4.
4. Bladene modsatte, 1-1½mm tykke, ofte kirtlede ... thymifolia
   " spredte, ½mm tykke, glatte, ofte blågrønne laevipes

Fumana arabica (L.) Spach Bredbladet hedesoløje. 15-25cm. M.m. kirteldunet. Bladene 5-12x2-5mm. 0-1100m. III-VI.

F. procumbens (Dunal) G.& G. Nedliggende hedesoløje. 5-15cm. Liggende. Bladene linjeformede, 8-12x1mm, randhårede, med et noget trekantet tværsnit. 0-800m. V-VI.

F. thymifolia (L.) Spach Timianhedesoløje. 10-20cm. De øvre blade tæt kirtlede eller kirtelbørstede. 0-1100m. II-VI.

F. laevipes (L.) Spach Tyndbladet hedesoløje. 8-15cm. Bladene 4-8x0,3-0,4mm, klart grønne eller blågrønne, glatte eller med enkelte spredte kirtelhår. 0-600m. IV-V.

F. ericoides (Cav.) Gand. Opret hedesoløje. 10-50cm. Ofte med oprette grene. Ofte kirtlet. Bladene 6-13x1mm. IV-VI.

TAMARICACEAE

Tamarix. Tamarisk. Mindre træer på 1-5m med slanke grene, der er dækkede af ganske små, skælformede blade på 1-5mm. Hvide blomster i tætte, cylindriske klaser. Ofte langs kysten.

T. tetrandra Pallas Sort tamarisk. Barken sortagtig. Bladene 3-5 mm, hindekantede. Klaserne 6-7mm brede. Kronbladene 2-2½mm. Støttebladene butte og urteagtige. V.

T. parviflora DC. Hindebladet tamarisk. Barken brun til brunlilla. Bladene 3-5mm. Klaserne 3-5mm brede. Støttebladene næsten helt hindeagtige. 0-300m. IV-VI.

T. hampeana Boiss.& Heldr. Tykakset tamarisk. Barken brun eller rødlig. Bladene 1¾-4mm. Klaserne 10-12mm brede. Støttebladene kortere end eller lig blomsterstilkene. IV.

FRANKENIACEAE

Frankenia. Nellikelyng. Liggende planter med hele, modsatte, ofte lyngagtige blade uden fodflige. Oftest lyserøde, noget nellikeagtige blomster med sambladet bæger.

F. pulverulenta L. Enårig nellikelyng. 5-25cm. Enårig. Bladene

flade og spatelformede. Blomsterne i tætte, ensidige, korte aks. Om. IV-V.

Frankenia hirsuta L. Skærmnellikelyng. 10-30cm. Pudedannende flerårig. Bladene smalle med omrullet rand. Blomsterne i endestillede, halvskærmagtige knipper. Om. IV-VI.

ELATINACEAE

Elatine macropoda Guss. Langstilket bækarve. 2-15cm. Ligner de hjemlige Bækarver. Blomsterne 4-tallige, deres stilke op til 23mm. 0-600m. III-V.

CUCURBITACEAE

Ecballium elaterium (L.) Rich. Æselagurk. 20-80cm. Kraftigt stivhåret flerårig med trekantet hjærteformede blade. Gule agurkeblomster på 18-20mm. Grøn, elliptisk, stivhåret frugt på 4-5 cm. 0-800m. V-IX.

Bryonia alba L. Enbo galdebær. Bladene ensfarvede. Sorte bær.

Bryonia cretica L. Spættet galdebær. Hvidbrogede blade. Røde bær.

CACTACEAE

Opuntia ficus-indica (L.) Miller Ægte figenkaktus. 2-5m. Ofte med stamme. Torne mangler, eller sjældent 1-2, indtil 1cm. Nålepuderne små og hvidlige. Frugt 5-9cm. 100-500m. IV-VI. Forv.

LYTHRACEAE

Lythrum. Kattehale.

1. Kronen 8-12mm. Blomsterne i endestillede aks .... salicaria
   " 0-6 mm. " spredte mellem bladene 2.
2. Kronen 5-6mm ..... junceum
   " 0-3mm 3.
3. Bladene omvendt lancetformede, bredest foroven borysthenicum
   " linjeformede eller elliptiske, bredest midtpå 4.
4. Bægertænderne m.m. ens ..... tribracteatum
   " skiftevis korte og lange 5.
5. 6 støvknapper. Kronbladene 2-3mm ..... hyssopifolia
   2 " . " 1-2mm thymifloia

Lythrum salicaria L. Kattehale. 0-1200m. VI-IX.

L. junceum Banks & Sol. Slangekattehale. 20-70cm. Glat, ofte flerårig med liggende grene. Bladene bredt til linjeformet aflange. Underbægeret 5-6mm. 0-700m. V-IX.

L. hyssopifolia L. Isopbladet kattehale. 10-60cm. Enårig, oftest opret og m.m. glat. Blomsterne oprette og tiltrykte.IV-IX.

L. thymifolia L. Lav kattehale. 5-12cm. Opret til liggende, ofte noget ru. Bladene 5-9x1-2mm. Blomsterne oprette og tiltrykte, mest 4-tallige. Underbægeret 3-4mm. 0-600m. IV-V.

L. tribracteatum Salzm. Gaffelkattehale. 5-30cm. Enårig, opret eller liggende, glat eller ru. Stænglen med 4 ribber. Grenene modsatte, udstående. 0-300m. IV-VI.

L. borysthenicum (Schrank) Litv. Ru vandportulak. 3-10cm. Mest opret, oftest m.m. ru enårig. Bladene 5-20x2-8mm, modsatte eller spredte. Underbægeret 2-3mm. Kronen meget lille. 0-500m. VI-VII.

MYRTACEAE

Myrtus communis L. Myrte. Busk op til 5m med modsatte, stedsegrønne, lancetformede, læderagtige, kirtelprikkede blade. Langstilkede hvide, parvise femtalsblomster med mange støvdragere i de øvre bladhjørner. 0-700m. V-VIII.

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Højt træ med affaldende, hvid bark. Bladene lancetformede, 12-22x1-1½cm, lidt seglformede, med

en m.m. tydelig randribbe langs kanten. Blosteret lågformet, falder af og afdækker de mange støvdragere. Plantet.

PUNICACEAE

Punica granatum L. Granatæble. Busk op til 5m. Tornet og stærkt grenet, løvfældende med firkantede kviste. Bladene modsatte, lancetformede, glatte, helrandede og blanke. Blomsterne skarlagenrøde, 3-4cm brede med et stort og kødet bægerrør, 5-7-tallige. 0-800m. V-IX. Dyrket og forvildet.

ONAGRACEAE

Epilobium. Dueurt.

1. Alle blade spredte ..... 2.
   I det mindste de nedre blade modsatte 3.
2. Bladene lancetformede, 1-3cm brede ..... angustifolium
   " linjeformede, 2-5mm brede dodonaei
3. Støvfanget tydeligt 4-lappet ..... 4.
   " kølle- eller hovedformet, ikke lappet 6.
4. Stænglerne tiltrykt dunede ..... lanceolatum
   " udstående hårede eller dunede 5.
5. Bladene halvt stængelomfattende. Kronen 10-16mm ... hirsutum
   " ikke " . " 4-9mm parviflorum
6. Stænglen tætkirtlet forneden og midtpå ..... gemmascens
   " m.m. glat eller med flest alm. hår 7.
7. Blomsterstandsaksen m.m. kirtelhåret ..... roseum
   " ikke " 8.
8. Øvre stængelblade helt uden hår, ofte lysegrønne tetragonum
   " " med hår på bladranden, mat mørkegrønne.
   Ofte med udløbere obscurum

Epilobium angustifolium L. Gederams. 600-2200m. VI-VIII.

E. dodonaei Vill. Sandgederams. 50-100cm. Opret. Bladene 2-2½cm, grønne på begge sider, tæt tiltrykt hårede. Knopperne let nikkende før blomstringen. 0-1700m. VI-IX.

E. hirsutum L. Lådden dueurt. 0-1650m. VII-IX.

E. parviflorum Schreber Dunet dueurt. 0-1900m. VI-VIII. PR,KH.

E. lanceolatum Seb.& Mauri Lancetbladet dueurt. 20-50cm. Bladene 3-5cm x 8-15mm, med kileformet grund, stilken 3-10mm. Kronen først hvid, senere lyserød. 0-1900m. VI-VII. TA,PR,KH.

E. tetragonum L. Kantet dueurt. 0-1500m. V-VIII.

E. obscurum Schreber Risdueurt. 0-2000m. VI-IX. TA,KH.

E. roseum Schreber Rosendueurt. 500-1700m. VII-VIII. 2 ssp.?:
ssp. roseum: Bladstilken 4-15mm.
ssp. subsessile (Boiss.) Raven: Bladstilken 1-3mm.

E. gemmascens C.A.Meyer Knopdueurt. 10-50cm. Nogle bladhjørner med små, kortskudslignende yngleknopper. Stænglen med lister. Bladene 15-25x7-10mm, ofte kortstilkede. 1000-1800m. TA,KY,KH,ER.

HALORAGACEAE

Myriophyllum alterniflorum DC. Hårtusindblad. 0-1000m. VII-IX.

THELIGONACEAE

Theligonum cynocrambe L. Hundekål. 2-15cm. Fuglegræslignende, stinkende enårig med opsvulmede stængelled. Nedre blade modsatte, øvre spredte. Stærkt reducerede, særkønnede blomster i bladhjørnerne. 0-800m. II-V.

CORNACEAE

Cornus sanguinea L. Rød kornel. Kvistene mørkerøde. 0-1300m.

C. mas L. Kirsebærkornel. 2-8m. Kvistene gulgrønne. Bladene 4-10

cm, med 3-5 ribbepar, oversiden lidt skinnende, undersiden mørkegrøn. Kronen gul. Frugten mørkerød. Skærmene sidestillede.

ARALIACEAE

Hedera helix L. ssp. helix Vedbend. 0-1450m. IX-X.

UMBELLIFERAE

1. Bladene helrandede og oftest ligestrengede ..... Bupleurum
" rundtakkede, fligede eller snitdelte 2.
2. Planten tornet ..... 3.
" uden torne (undtagen evt. på frugterne) 4.
3. Blomsterne i dobbeltskærme ..... Echinophora spinosa
" " hoveder Eryngium
4. Blomsterne gule ..... 5.
" hvide eller lyserøde 25.
5. Frugtens randribber tydeligt vingede eller fortykkede .... 6.
" " ikke " " " 16.
6. Randribberne danner en fortykket ring om frugten Malabaila
" ikke ringformet fortykkede 7.
7. Mange storsvøbblade ..... 8.
0(-3) " 10.
8. Randribbernes vinger bredere end rygribberne ..... Ferulago
" og rygribbernes vinger lige brede Cachrys
9. Bladafsnittene bredt ægformede ..... Heptaptera
" trådformede Cachrys
10. Bladafsnittene ægformede, store og brede ..... 11.
" smalle 12.
11. Bladene 2 x delte, stjærnehårede nedenunder ..... Opopanax
" 1 x " Pastinaca
12. Enårig ..... Anethum
Flerårig 13.
13. Vingerne mindst af frugtens bredde ..... 14.
" smallere end frugtens bredde 15.
14. Frugten med hvælvet ryg ..... Elaeoselinum
" flad Thapsia
15. Øvre bladskeder stærkt opblæste ..... Ferula
" " lidet " Peucedanum
16. 0-få storsvøbblade ..... 17.
Mindst 3 storsvøbblade 21.
17. Nedre blade med brede, ægformede afsnit ..... Smyrnium
Smalle bladafsnit 18.
18. Planten m.m. grådunet ..... Pimpinella rigidula
" glat 19.
19. Bladafsnittene linje-lancetformede, flade ..... Johrenia
" trådformede 20.
20. Skærmstrålerne lige lange. Enårig ..... Ridolfia
" uens. (2-)flerårig Foeniculum
21. Frugten mindst 3 x så lang som bred ..... Kundmannia
" under 3 x " " " " 22.
22. Planten m.m. gråfiltet ..... Echinophora tenuifolia
" stort set glat 23.
23. Kødet strandplante ..... Crithmum
Ikke kødet bakkelands- eller bjærgplante 24.
24. Mest 10-15 skærmstråler. Mange svøbblade ..... Bonannia
4-8 skærmstråler. 3-5 storsvøbblade Carum rupestre
25. Frugtens randribber tydeligt vingede eller fortykkede .. 26.
" " ikke " " " 30.
26. Frugtens rand ringformet fortykket ..... Tordylium
" " vinget 27.
27. Rygribberne vingede ..... Laserpitium
" ikke vingede 28.
28. Bladundersiden håret. Frugten med oljekanaler ... Heracleum
Planten m.m. glat 29.
29. Vingernes bredde $\frac{1}{2}$ x selve frugten .... Peucedanum achaicum
Vingerne så brede som " " Angelica

30. Nedre bladstilke delvist underjordiske ..... 31.
" " ikke underjordiske 32.
31. Griffelfoden jævnt tilsmalnet i griflen ..... Geocaryum
" brat " " " Bunium
32. Frugten mindst 3 x så lang som bred ..... 33.
" under 3 x " " " " 37.
33. Frugtens næb mindst så langt som den frøbærende del Scandix
" " meget kortere end " " " 34.
34. Frugten uden ribber, bortset fra på næbbet ..... Anthriscus
" ribbet. Næbbet meget kort eller manglende 35.
35. 4-15 storsvøbblade. Bladranden bruskagtig ..... Falcaria
0(-5) " . " ikke bruskagtig 36.
36. 1-3 skærmstråler. Frugten dunet ..... Myrrhoides
6-24 " . " glat Chaerophyllum
37. Store fjersnitdelte bægerblade. 1-blomstrede småskærme.
Enårig med røllikeagtige blade ..... Lagoecia
Bægerbladene ikke fjersnitdelte 38.
38. Frugten tornet, stivhåret eller dunet ..... 39.
" glat 48.
39. Bladene håndfligede ..... Sanicula
" anderledes delte 40.
40. Storsvøbbladene fjersnitdelte ..... Daucus
" hele 41.
41. Frugten tornet; tornene med udvidet grund ..... 42.
" dunet til stivbørstet 45.
42. Med hindekantede storsvøbblade ..... 43.
Uden " " 44.
43. Storsvøbet mindst $\frac{1}{2}$ x de glatte skærmstråler ..... Orlaya
" under $\frac{1}{4}$ af de bebørstede skærmstråler Turgenia
44. Frugten 6-13mm, med hagekrummede torne ..... Caucalis
" 7-10mm, med rette torne Pseudorlaya
45. Frugten med tydelige ribber ..... 46.
" uden " " 47.
46. Bladafsnittene 1-3cm og ægformede ..... Athamantha
" smalle Seseli
47. Småsvøbet veludviklet ..... Torilis
" mangler (sj. 1-2 blade) Pimpinella
48. Frugten med tydelige, blivende bægerspidser ..... Oenanthe
" uden eller med små bægerspidser 49.
49. Frugten næsten 2 x så bred som lang, som 2 kugler .. Bifora
" ikke meget bredere end lang 50.
50. 3-mange storsvøbblade ..... 51.
0-3 storsvøbblade 55.
51. Bladene 1 x fjersnitdelte ..... Berula
" 2-4 x delte 52.
52. Storsvøbet fjersnitdelt eller tredelt ..... Ammi
" udelt 53.
53. Frugten omvendt hjærteformet, bredest forneden Physospermum
" bredest omkring midten 54.
54. Frugtens ribber bølgede. Stænglen rødplettet ..... Conium
" " ikke bølgede Carum
55. Vand- eller sumpplanter ..... Apium
Tørbundsplanter 56.
56. Planten tvebo. Stængelgrunden stærkt trævlet ..... Trinia
Blomsterne tvekønnede. Stængelgrunden næppe trævlet 57.
57. 2-4 skærmstråler ..... Thamnosciadium
5-mange skærmstråler 58.
58. Nedre blade med m.m. ægformede afsnit ..... Scaligeria
" " " smalle afsnit 59.
59. Enårig med trådformede bladafsnit ..... Ammoides
2-flerårig med flade bladafsnit 60.
60. Stænglen trind, blådugget, hul ..... Conium divaricatum
" stribet, marvfyldt Cnidium

Sanicula europaea L. Sanikel. 500-1500m. V-VII.

Eryngium. Mandstro.

1. Storsvøbbladene m.m. ægformede ..... maritimum
" lancet- til linjeformede 2.
2. Grundbladene nedløbende på stilken ..... amethystinum
" ikke nedløbende på stilken 3.
3. Alle småsvøbblade helrandede ..... campestre
Ihvertfald de ydre småsvøbblade trespidsede creticum

Eryngium maritimum L. Strandmandstro. Om. VI-IX.

E. creticum Lam. Brodmandstro. 25-100cm. Grundbladene netårede, hele og takkede eller tredelte. Oftest mange ½-2cm store, m.m. kugleformede hoveder i en åben, blå stand. 0-500m. VII-VIII.

E. campestre L. Bjærgmandstro. 20-70cm. Grundbladene tredelte med fjersnitdelte afsnit. Standen bleggrøn, ofte halvskærmformet.

E. amethystinum L. Blå mandstro. 20-45cm. Svøbbladene med 1-4 tornpar. Småsvøbbladene helrandede eller 3-spidsede. Blomsterstanden blå. 500-2030m. sVI-VIII.

Lagoecia cuminoides L. Haresæde. 10-30cm. Skærmene ½-1½cm brede, kugleformede. 1-blomstrede småskærme med store, fjersnitdelte bægerblade. Røllikeagtige blade. 0-1500m. IV-VI.

Echinophora spinosa L. Hvid pigskærm. 20-50cm. M.m. dunet flerårig. Bladene 2 x delte med stive, tykke, tornspidsede flige. Tornet storsvøb. Sandstrand. VI-IX.

E. tenuifolia L. ssp. sibthorpiana (Guss.) Holmboe Gul pigskærm. 20-50cm. M.m. grafiltet flerårig. Bladene 2-3 x delte, noget kødede. 2-5 skærmstråler. Svøbbladene tornagtige i frugt. VIII-IX.

Myrrhoides nodosa (L.) Cannon Knudeskærm. 30-100cm. Stivhåret enårig med opsvulmede nedre bladfæster. 2-3 skærmstråler. Frugten 4-10mm, med hvide børster. 0-900m. V-VI.

Chaerophyllum heldreichii Orph. Storfrugtet hulsvøb. 40-150cm. Skvalderkålslignende plante med afsnit på indtil 8x5cm. 12-24 skærmstråler på 5-12cm. Frugten 17-28mm. 1200-1800m. V-VI. KY,KH.

C. temulum L. (C. temulentum) Alm. hulsvøb. 0-1200m. V-VII.

Anthriscus nemorosa (Bieb.) Sprengel Lundkørvel. 1-2m. Flerårig. Ligner Vild kørvel, men frugterne knudrede eller stivhårede, grønne eller sortgrønne som modne. 400-1850m. V-VI. TA,PR.

A. tenerrima Boiss.& Spr. Spinkel kørvel. -40cm. Enårig. 2-4 skærmstråler. Frugtstilkene fortykkede. Frugten glat eller håret. Kronbladene veludviklede. IV-V.

Scandix. Jomfrukam.

1. Småsvøbbladene tydeligt hindekantede. Småskærmens midterfrugt m.m. siddende. Kronbladene m.m. butte australis
Småsvøbet næppe hindekantet. Småskærmens midterfrugt stilket. Kronbladene tilspidsede 2.
2. Griflen 1-2½mm. Næbbet 3-4 x selve frugten pecten-veneris
" 0,4-0,75mm. Næbbet 2-3 x selve frugten macrorhyncha

Scandix australis L. Udspærret jomfrukam. 10-30cm. IV-VI. 3ssp:
ssp. grandiflora (L.) Thell.: Randkronerne meget større end de andre. Griflen 4-6 x så lang som griffelfoden.
ssp. australis: Skærmstrålerne glatte. Frugten 2-3cm. Næbbet m.m. ret. Griflen 2-3 x griffelfoden.
ssp. curvirostris (Murb.) Vierh.: Skærmstrålerne ruhårede. Frugten 2½-4cm. Næbbet m.m. krummet. Griflen 3-4 x griffelfoden.

S. pecten-veneris L. Alm. jomfrukam. 5-50cm. 0-1800m. III-V.

S. macrorhyncha C.A.Meyer 500-2100m. IV-mVI. PR,KH.

Bifora testiculata (L.) Roth Stinkende hulfrø. 20-40cm. Glat enårig med linjeformede bladflige. 1-3 skærmstråler. Frugten

2½-3½x4½-7mm, rynket. 0-800m. III-V.

Scaligeria napiformis (Willd.) Grande (S. cretica) 10-50cm. Glat, tykrodet toårig. Nedre blade 2-3 x delte med rude-ægformede afsnit. Stængelbladene smalfligede. 10-15 skærmstråler. Frugten 1½-2mm, bredt ægformet med hjærteformet grund. Grundbladene med trekantet omrids. Få småsvøbblade. 0-1600m. IV-VI.

S. moreana Engstrand. 40-60cm. Som foregående, men grundbladenes omrids lancetformet. Frugten elliptisk. 5-10 småsvøbblade. V-VI.

Smyrnium olusatrum L. Stor guldskærm. 30-120cm. Toårig. Bladene 3-koblede, derefter 1-2 x fjersnitdelte med brede, ægformede afsnit. Frugten 7-8mm, bredt ægformet og sort. 0-800m. I-V.

S. rotundifolium Miller Rundbladet lundgylden. 20-60cm. Toårig. Øvre blade bredt æg-hjærteformede, stærkt omfattende, m.m. helrandede. Stænglen uvinget. Frugten ca. 3x5mm. 0-1400m. III-V.

S. perfoliatum L. Lundgylden. 30-120cm. Som den foregående, men de øvre blade rund-savtakkede og stænglen smalvinget.0-1500m.III-V.

Bunium ferulaceum Sm. Ribbet jordkastanje. 15-60cm. Med rund rodknold. Bladene 1-3 x delte med smalle afsnit, bredt omskedende. Frugtstilkene fortykkede og stive, stjærneformet udstående. Frugten 5-6mm, aflang. 0-1300m. IV-VI.

Geocaryum. Med rodknold. Smalt aflange frugter. Intet storsvøb.

G. parnassicum (Boiss.& Heldr.) Engstrand 15-30cm. Blomsterstilkene oftest med tænder i spidsen. Frugten 2,6-4,0mm. 3-6 småsvøbblade. Støvknapper hvide eller grønlige. TA,ME,KY,KH,ER,PN. V-VII.

G. peloponnesiacum Engstrand 4-22cm. Blomsterstilkene uden tænder i spidsen. Frugten 5-6mm. 2-3 småsvøbblade. Mørkerøde støvknapper. Bladfligene 1-2mm brede. 1400-2300m. V-VII. TA,KY,KH,ER.

G. divaricatum (Boiss.& Orph.) Engstrand 24-35cm. Opret. Blomsterstilkene uden tænder i spidsen. Frugten 4,4-6,2mm. 1-3 småsvøbblade. Bladfligene mindst 2½mm brede. Skærmstrålerne 23-45mm. 1000m. V-VI. KY (Trikala) - 1 fund fra forrige århundrede.

Pimpinella. Pimpinelle. Alle arter med dunede frugter.

1. Kronen gul ..... rigidula
   " hvid 2.
2. Flerårig. Stængelgrunden med skællede bladrester ... tragium
   1-2-årig. " uden " " 3.
3. Mest over 15 skærmstråler. Frugten udstående håret peregrina
   5-10 skærmstråler. Frugten tiltrykt håret cretica

Pimpinella rigidula (Boiss.& Orph.) H.Wolff -100cm. Grådunet flerårig. Nedre blade ca. 30cm, 3 x delte. Små stængelblade. Talrige skærme. 4-8 skærmstråler. Frugten ca. 1½mm.

P. peregrina L. Hårfrugtet pimpinelle. 50-100cm. Fintdunet toårig. Nederste blade hjærteformede, følgende fjersnitdelte, øvre 2 x delte. Frugten 1½-2mm. 0-1000m. V-VII.

P. cretica Poiret 10-30cm. Fintdunet eller halvglat enårig. Nederste blade udelte, efterfølgende trekoblede, øvre 1-2 x smalfligede. Frugten 1-1½mm. 0-1000m. IV-VI.

P. tragium Vill. Skællet pimpinelle. 10-80 cm. Nedre blade 1 x delte. Få og små stængelblade. 5-15 skærmstråler. 2 underarter:
ssp. tragium: 10-40cm. Grundbladene 5-10cm lange, afsnittene ½-1 cm. 5-8 skærmstråler. 1000-2425m. mVI-VIII. TA,PR,OL,KY,KH.
ssp. polyclada (Boiss.& Heldr.) Tutin: 30-80cm. Grundbladene 10-30cm lange, afsnittene 1-4cm. 7-15 skærmstråler.800-2250m.PR,ER.

Berula erecta (Hudson) Coville Sideskærm. 0-1500m. VI-VIII.

Crithmum maritimum L. Stranddild. 10-50cm. Glat flerårig med 1-2 x delte blade med kødede, linje-lancetformede flige. 8-36

skærmstråler. Mange svøbblade. Grønliggule blomster.Om.VI-VIII.

Seseli aroanicum Hartvig 15-18cm. Trævlet stængelgrund. Nedre blade 5-8(-25)cm, 3-4 x delte, fligene ½-¾mm tykke. Øvre blade med tydelige skeder. 6-11 skærmstråler. Ca. 12 hindekantede småsvøbblade. 1800-2000m. VIII. KH.

Thamnosciadium junceum (Sm.) Hartvig (Sclerochorton j.) Risskærm. 15-45cm. Risformet grenet flerårig. Fjærntfligede blade med stængelagtige stilke og skafter. Frugterne 8-10x3½-4mm, kun 2-3 modnes i hver småskærm. 1500-2425m. VII-VIII. TA,KY,KH.

Oenanthe. Klaseskærm.

1. 2-4 skærmstråler. Frugterne siddende ..... fistulosa
   4-16 " . " stilkede 2.
2. Skærmstråler og blomsterstilke ikke tykkere i frugt banatica
   " " " fotykkede i frugt 3.
3. Grundbladenes afsnit kile- til ægformede pimpinelloides
   " " linje-lancetformede 4.
4. Frugten cylindrisk eller omvendt kegleformet ... silaifolia
   " elliptisk tenuifolia

Oenanthe fistulosa L. Vandklaseskærm. 0-800m. V-VII.

O. pimpinelloides L. Valseklaseskærm. 40-100cm. Stænglen marvfyldt (hul hos de andre arter). Frugten cylindrisk; griflen over 2/3 x frugten. 6-15 skærmstråler. 0-800m. V-VII.

O. tenuifolia Boiss.& Orph. -60cm. Rodknoldene cylindriske eller tenformede. Grundbladene 1-2 x delte. 5-7 skærmstråler. Griflen mindst af frugtens længde.

O. silaifolia Bieb. Knoldklaseskærm. 20-100cm. Rodknoldene ægformede. Grundbladene 2-4 x delte. 4-10 skærmstråler. Griflen næsten af frugtens længde. 0-800m. VI-VII.

O. banatica Heuffel Furet klaseskærm. -100cm. Stænglen dybt furet. Grundbladene 1-3 x delte, med smalle flige. 9-16 skærmstråler. Griflerne højst ¼ x frugten. Valseformede rodknolde.

Athamantha macedonica (L.) Sprengel Stenøjenrod. 80-200cm. Stærktgrenet, dunet, grågrøn. Bladene 2-3 x delte med savtakkede, ægformede afsnit på 1-3cm. Mange skærme. 12-25 skærmstråler på 1-2cm, dunede. Frugten 2½-5mm, stivhåret-dunet. VI-VII. ER.

A.arachnoidea Boiss.& Orph. Spindelvævshåret øjenrod. Som foregående, men bladafsnittene 2-5cm, groft rundtakkede. Skærmstrålerne 2-5cm, tæt spindelvævshårede. Frugten 4-7mm, med lange, bløde hår. 1000-1300m. VII. TA.

Foeniculum vulgare Miller Fennikel. 40-150cm. 2-flerårig. Blågrøn. Bladene 3-4 x delte med trådformede flige. Oftest uden stor- og småsvøb. 0-1000m. VI-VIII. 2 underarter:
ssp. vulgare: 12-25 skærmstråler. Oftest 2-årig. Bladfligene oftest over 10mm lange. Dyrket og forvildet.
ssp. piperitum (Ucria) Cout.: 4-10 skærmstråler. Flerårig. Bladafsnittene oftest under 10mm. Den vilde form.

Anethum graveolens L. Dild. VI-VII. Dyrket og forvildet.

Kundmannia sicula (L.) DC. Guldmærke. 30-70cm. Glat flerårig. Stor- og småsvøb mangebladede. Frugten 6-10mm, næsten cylindrisk. Bladene 1-2 x delte med ægformede afsnit. 0-1400m. V-VI.

Physospermum cornubiense (L.) DC. Stjærnesvøb. 30-120cm. Næsten glat flerårig. Grundbladene 2 x trekoblede med fjerfligede afsnit. Stængelbladene reducerede til bladskeder. VI-VIII.

Conium maculatum L. Skarntyde. Stænglen mest rødplettet. 3-5 storsvøbblade. Frugtens ribber fremtrædende, mest rynkede.

C. divaricatum Boiss.& Orph. Udspærret skarntyde. Stænglen

uplettet, udspærret grenet. 0-1 storsvøbblade. Skærmstrålerne vidt udspærrede. Frugtens ribber affladede, ej rynkede. VI-IX.

Cachrys ferulacea (L.) Calestani Vinget nøddeskærm. 30-150cm. Bladene 3-5 x delte med trådformede flige. Frugten 10-20mm. Hver delfrugt med 5 lige store, helrandede eller finttandede vinger. 1000-2200m. VI-VII. KY,KH,ER.

Heptaptera colladonioides Margot & Reuter Græsk kølleskærm. -60 cm. Stænglen m.m. rukantet. Bladene med æg- til lancetformede afsnit. Frugten 12-18mm, ydre delfrugt 4-vinget, indre 3-vinget.

Bupleurum. Hareøre.

1. Busk. Bladene fjerstrengede ..... fruticosum
   Urter. " ligestrengede 2.
2. Bladene gennemvoksede. Intet storsvøb ..... lancifolium
   " ikke gennemvoksede. Med (evt. affaldende) storsvøb 3.
3. Flerårig ..... falcatum
   Enårig 4.
4. Stor- og småsvøb æg-lancetformet, over 1mm brede ..... 5.
   " " " smalle og brodspidsede, under 1mm brede 9.
5. Småsvøbbladene grønbrune ..... baldense
   " gulgrønne eller hindeagtige 6.
6. Småsvøbbladene helt hindeagtige og gennemskinnelige gracile
   " gulgrønne og hindekantede 7.
7. Småsvøbbladene ca. 2 x så lange som brede ..... flavicans
   " ca. 3 x " " " " 8.
8. Småsvøbbladene 10-25(-30)mm ..... greuteri
   " mindre glumaceum
9. Frugten 4-6mm. Nedre bladundersider kølede ..... praealtum
   " 1½-3mm. " " ikke kølede 10.
10. De fleste skærme med mindst 4 stråler ..... semicompositum
    " " " " 2-3 stråler 11.
11. Frugten finvortet ..... euboeum
    " ikke finvortet trichopodum

Bupleurum lancifolium Hornem. Blomsterhareøre. 10-50cm. Enårig. Stængelbladene elliptisk-ægformede. 2-3 skærmstråler. Store, gulgrønne, rundagtige småsvøbblade. 0-800m. IV-VI.

B. gracile d'Urv. Hindehareøre. 5-50cm. 3-6 skærmstråler. 5 småsvøbblade uden tværrårer. Kronbladenes indbøjede spidser 0,4-0,6mm. Frugten 1,3-1,8mm, glat. 0-1150m. IV-V.

B. glumaceum Sm. Avnehareøre. 30-60cm. 3-8 skærmstråler. Storsvøbbladene indtil så lange som den længste skærmstråle , med bred, hvid, hindekantet rand. Småsvøbbladene uden tværribber.

B. greuteri Snogerup 6-20cm. 5(4) storsvøbblade, der m.m. omslutter småskærmene. Mest 5 småsvøbblade på 5-12x1-4mm, med utydelige tværrårer. 0-650m. fV-VI. Mani- og Maleahalvøerne, Kythæra.

B. baldense Turra ssp. gussonei (Arc.) Turra Stakhareøre. 30-75 cm. Friskgrøn, ret stærkt grenet. 5-8 skærmstråler. Storsvøbet gulligt, over ½ x de længste stråler. 0-1400m. IV-VIII.

B. flavicans Boiss.& Heldr. Storsvøbet gulligt, under ½ x de længste skærmstråler, med fremtrædende ribber samt tværrårer. Småsvøbet også med mange, tydelige tværrårer.

B. praealtum L. Sivhareøre. 30-50(-150)cm. 2-3(-5) skærmstråler. Storsvøbet mest meget kortere end strålerne. Frugten med fremtrædende ribber. 0-1200m. V-IX.

B. euboeum Beauverd & S.Topali Ca. 10cm. Noget blågrøn. Bladene 3-strengede. Svøbbladene jævne, ikke ru. 2 skærmstråler med 1-3 blomster hver. (Står nær B. tenuissimum).

B. semicompositum L. Hvidknudret hareøre. 3-30cm. Frugten 0,9-1,1 mm, næsten uribbet, men fint hvidvortet. Kronbladene lillaagtige. 5 urteagtige småsvøbblade. III-VI. 0-300m.

Bupleurum falcatum L. ssp. cernuum (Ten.) Arc. Seglhareøre. 5-100cm. 3-9 skærmstråler. 1-4 storsvøbblade, ofte meget kortere end strålerne. Grønt småsvøb. Frugten 3-6mm. 600-2300m.VII-VIII.

B. fruticosum L. Buskhareøre. 1-2m. Stedsegrøn busk med læderagtige blade på 10-11x2-3cm med skinnende overside. Endestillede skærme med 7-11 stråler. 0-1100m. VI-VII.

B. trichopodum Boiss.& Spr. Hårstilket hareøre. 8-40cm. Frugten $2\frac{1}{2}$-3mm. Kronbladenes indadbøjede spids kløvet. 3-6 ret ens skærmstråler. 0-3 storsvøbblade på 5-20mm. 1200-1950m. IV-V.

Apium graveolens L. Vild selleri. Intet småsvøb. 0-1500m. V-X.

A. nodiflorum (L.) Lag. Kortstilket sumpskærm. 30-100cm. Krybende eller opstigende, rodslående. Bladene 1 x delte; ægformede småblade. Skærmene ofte næsten siddende i bladhjørnerne. V-VII.

A. inundatum (L.) Rchb.f. Svømmende sumpskærm. Nedre blade trådformet fligede, ofte nedsænkede; øvre 1 x delte med ofte trelappede afsnit. 0-500m. V-VI.

Ridolfia segetum Moris Smalflig. 30-80cm. Stinkende enårig. Bladene 2-4 x delte med trådformede afsnit. Øvre blade ofte reducerede til den opblæste bladstilk. Frugten $1\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}$mm. 0-1000m. V-VI.

Ammi majus L. Kongekommen. 30-100cm. Nedre blades flige 1-3mm brede, øvre blades $\frac{1}{2}$-1mm brede. 15-30 skærmstråler. Kronbladene hvidgule. Frugten $1\frac{1}{2}$-2mm. 0-1300m. V-VII.

Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. Hårskærm. 10-50cm. Stærkt blågrøn, til sidst rødlig. 5-11 uens skærmstråler. Småsvøbet med 4-6 dels linje- og dels skeformede blade. IV-VI.

Falcaria vulgaris Bernh. Seglblad. 0-800m. VI-IX.

Carum. Kommen.

1. 8-35 skærmstråler ..... 2.
   3-8 " 3.
2. En enkelt opret stængel på 10-50cm ..... multiflorum
   Flere stængler, nogle tiltrykte jorden depressum
3. Grundbladene med 8-15 par 1-ordens afsnit ..... graecum
   " " 4-7 " " " 3.
4. Hvide kronblade. Bladfligene 3-5mm lange ..... heldreichii
   Gullige kronblade. Bladfligene 5-20mm lange rupestre

Carum multiflorum (Sm.) Boiss. Mangeblomstret kommen. 20-60cm. Grundbladene med bredt trekantet omrids, 2-4 x delte, yderste flige ægformede. 15-35 skærmstråler. 0-2300m. IV-VII. Udbredt.

C. depressum Hartvig & Kit Tan Nedtrykt kommen. 8-20 skærmstråler. Langada-kløften ved Taygetos. 700-800m. V.

C. graecum Boiss.& Heldr. ssp. graecum Græsk kommen. 20-60cm. Grundbladene smalt lancetformede, bladfligene 5-15mm. Skærmen sammentrængt i frugt. Griflerne 1-$1\frac{1}{2}$mm. 1300-2500m. Vi-VIII.

C. heldreichii Boiss. Udstrakt kommen. 8-20cm. Med flere opstigende og til dels udstrakte stængler. Grundbladenes omrids smalt aflangt. Blomsterstilkene 2-4mm. 1750-2400m. VI-VII.

C. rupestre Boiss.& Heldr. Gulblomstret kommen. 10-40cm. Aflange grundblade på 3-15cm. Blomsterstilkene 1-2mm. 1300-2650m, sVI-fVIII. KY,KH.

Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonkai ssp. silaifolium (Selinum s.) Klippebrændeskærm. 50-120cm. Nedre blade 3-4 x delte med rukantede flige på 4-10x$\frac{1}{2}$-2mm; med trekantet omrids. 20-45 skærmstråler. Frugten 3-$4\frac{1}{2}$mm. VI-VII. TA,PR,KY,KH. 400-2200m.

Angelica silvestris L. Angelik. 0-1600m. VI-VIII.

Bonannia graeca (L.) Hal. Harpiksskærm. 30-70cm. Grundbladene

med lancetformet omrids, 2 x delte med lancetformede afsnit. Stængelbladene reducerede til skeder. Mange skærme med 10-15(-20) stråler. 350-1500m. VI-VII.

Johrenia distans (Griseb.) Hal. -100cm. Flerårig. Grenet fra grunden. Bladfligene 1-2mm brede. Nedre blade ca. 10x5cm. Øvre blade reducerede til opblæste skeder. 3-5 skærmstråler. Intet storsvøb. Frugten 3mm.

Ferula communis L. Alm. ferle. 1-2m. Stænglen meget kraftig, blågrøn-lilla. Nedre blade 30-60cm, 4-6 x delte med linjeformede afsnit på indtil 5cm. Øvre blade reducerede til store skeder. ssp. communis: Bladfligene højst 1mm brede, begge sider grønne. ssp. glauca (L.) Rouy & Camus: Bladfligene indtil 3mm brede, friskgrønne ovenpå, blågrønne nedenunder.

Ferulago nodosa (L.) Boiss. Knudret birkerod. 50-150cm. Bladfæsterne stærkt opsvulmede, Bladet med trekantet omrids og kort linjeformede flige. Frugten 8-10mm, med noget bølgede vinger.

F. silvatica (Besser) Rchb. Smalbladet birkerod. 40-120cm. Bladene indtil 50cm, med lancetformet omrids, og linjeformede flige. Frugten 6-10mm. 500-2000m. VI-VII. KH.

Opopanax hispidus (Friv.) Griseb. Håret gummirod. 1-3m. Nedre blade 2 x delte, med store, lancetformede, stivhårede afsnit. 6-13 skærmstråler. Orangegule kronblade. V-VII.

Peucedanum longifolium W.& K. Langbladet svovlrod. 60-120cm. Nedre blade 20-50cm, 4-6 x trekoblede med flige på 3-10cm x 1-3 mm. 15-30 skærmstråler. Gul krone. 1500-2000m. mVII-VIII. KH.

P. vittijugum Boiss. -140cm. Nedre blade 2 x fjersnitdelte med aflangt omrids. Bladafsnittene 7-10mm, ægformede og fligede. 10-25 meget uens skærmstråler. Gul krone. 300-1500m.

P. achaicum Hal. -30cm. Nedre blade 1-2 x delte, 1-ordens afsnit 10-13mm. 8-13 skærmstråler. Intet storsvøb. 1-3 småsvøbblade. Hvid krone. 700m. Vuraikos-kløften nær Zakhloru. VI-VII.

Pastinaca sativa L. ssp. urens (Req.) Celak. Pastinak. Planten gråhåret, stænglen trind. 0-1500m. VII-VIII.

Heracleum sphondylium L. ssp. pyreniacum (Lam.) Bonn.& Layens Pyrenæisk bjærneklo. Bladene højst ½ delte, med gråfiltet underside. Hvide kronblade. 700-2200m. mVII-mVIII. TA,ER.

Trinia glauca (L.) Dumort Trævlskærm. 10-50cm. Glat og blågrøn, flergrenet og mangeskærmet. Bladfligene 2-20x½-1mm. Intet småsvøb. 3-7 skærmstråler. Frugtens ribber ikke tandede. V-VII.

T. frigida (Boiss.& Heldr.) Drude 3-25cm. Nær foregående. Eneste sikre kendetegn er de tandede mellemribber på frugten. 1500-2500m. mV-fVI. TA,PR,KY,KH,PN.

Malabaila. Dunede toårige. Bladene 1 x delte med ægformede afsnit på de nedre blade. Frugten skiveformet; vingen hindeagtig inderst, fortykket yderst. Gule blomster.

M. aurea (Sm.) Boiss. 30-50cm. Intet storsvøb. 3-9 skærmstråler. Frugten 8-10mm. VI.

M. involucrata Boiss.& Spr. 40-50cm. 6-8 storsvøbblade. 8-20 skærmstråler. Frugten 9-14mm; vingens hindeagtige del gennemskinnelig.

M. psaridiana Heldr. Som foregående, men frugten 9mm; vingens indre del næppe gennemskinnelig. TA. (En form af involucrata ?)

Tordylium. Skjoldfrø. 1-2-årige. Frøet skiveformet med en tyk og ofte rynket randvulst. Ydre randkroner forøgede. Bladene (0-)1 x delte. Hvid krone.

T. maximum L. Stort skjoldfrø. 30-50cm. Frugten 5-8mm, stivbør-

stet; randvulsten jævn. 0-800m. V-VII.

Tordylium officinale L. Lægeskjoldfrø. 20-50cm. Frugten 2-3mm, blødhåret; randvulsten rynket. Ydre blomster med 2 forøgede kronblade med meget uens lapper. 0-1200m. V-VI.

T. apulum L. Storkronet skjoldfrø. 20-50cm. Frugten 5-8mm, blødhåret; randvulsten rynket. Ydre blomster med 1 forøget kronblade med 2 m.m. lige store lapper. 0-1200m. V-VII.

Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol. Hvidvinget olieskærm. 50-120cm. Flerårig. Stænglen trævlet ved grunden. Nedre blade 20-40 cm, 3-5 x delte med hårtynde, ofte kransstillede afsnit. Frugten 8-15mm, bredt hvidvinget. 8-25 skærmstråler. 0-1200m. VI-X.

Laserpitium siler L. ssp. garganicum (Ten.) Arc. Bjærgfoldfrø. 60-120cm. Stængelgrunden stærkt trævlet. Nedre blade indtil 1m, 2-4 x delte, fligene 3-6x1-4cm, lidt blågrønne og læderagtige. 15-45 skærmstråler. 800-2200m. VI-VII. KY,KH.

L. pseudomeum Orph. Tyndfliget foldfrø. 7-40cm. Grundbladene 2-3 x delte med ægformede afsnit på ½-1cm, der er delte i talrige linje-børsteformede flige. 4-12 skærmstråler. VI-VII. 1500-2450m. KY,KH.

Thapsia garganica L. Storfrugtet vingeskærm. 30-250cm. Nedre blade 10-40cm, 2-3 x delte med smalle afsnit med omrullet rand og lysere underside. Frugten 12-25mm med 3-6mm brede, dybt udrandede, let bølgede vinger. Intet svøb. 0-1400m. V-VII.

Torilis. Randfrø.

1. Skærmstrålerne meget korte; skærmene hovedformede ..... 2.
   Skærmene ikke hovedformede 3.
2. Delfrugterne uens: 1 med børster, 1 med vorter ..... nodosa
   Begge delfrugter med børster webbii
3. Med kortstilkede skærme modsat bladene ..... leptophylla
   Alle skærme langstilkede 4.
4. Bladfligene under 1mm brede ..... tenella
   " mindst 2mm brede arvensis

Torilis nodosa (L.) Gaertner Liggende randfrø. 20-50cm. Oftest liggende. Skærmene siddende eller kortstilkede modsat bladene. Intet storsvøb. 0-1100m. III-VIII.

T. webbii Jury 5-50cm. Ingen grundroset. Bladene mest 1-2 x delte. Skærmstilken 3-10mm. III-IV.

T. arvensis (Hudson) Link Markrandfrø. 20-60cm. V-VIII. 2 ssp.:
ssp. neglecta (Schultes) Thell.: 4-12 skærmstråler.
ssp. purpurea (Ten.) Hayek: 2-3 skærmstråler.

T. tenella (Delile) Rchb.f. Tyndfliget randfrø. -60cm. Bladfligene smalt linjeformede. Frugten linjeformet.

T. leptophylla (L.) Rchb.f. Gultornet randfrø. 10-40cm. Frugten linjeformet-cylindrisk, ca. 5mm, gulbørstet. Skærmstilkene 2-3 cm. 2-4 skærmstråler. 0-800m. V-VI.

Caucalis platycarpos L. Fodangel. 5-30cm. Opret enårig. Bladene 2-3 x delte, fintfligede med trekantet omrids. 2-5 skærmstråler. Kronbladene ca. 2mm. 0-1000m. V-VII.

Turgenia latifolia (L.) Hoffm. Burreskærm. 20-40(-60)cm. Enårig. Bladene 1 x fjersnitdelte med lancetformede, tandede eller fligede afsnit. Langstilkede skærme med 2-5 stråler. Kronbladene ca. 5mm. Bladundersiden dunet til stivhåret. 0-1400m. V-VI.

Orlaya. Bredfrø. Stivhårede enårige med 2-4 x fligede blade.

O. kochii Heyw. (O. daucoides) Fladfrugtet bredfrø. 10-30cm. 2-4 skærmstråler. Ydre kronblade 4-7mm. Frugten 10-15mm, griflen 1-2mm. 0-2050m. V-VI.

Orlaya daucorlaya Murb. Gulerodsbredfrø. 30-80cm. 5-7 skærmstråler, hvoraf 2-4 sætter frugt. Ydre kronblade (5-)7-12mm. Frugten 9-11mm, griflerne 2½-4mm. 700-1900m. mV-mVIII.

Daucus. Gulerod.

1. 3-4 skærmstråler ..... involucratus
   6-mange skærmstråler 2.
2. Nedre blades afsnit mindst 1mm brede. Mest toårig ... carota
   " " " højst 1mm " . Enårig guttatus

Daucus guttatus Sm. Plettet gulerod. 20-60cm. 8-25 skærmstråler. Storsvøbet længere end skærmstrålerne. Midterblomsten oftest sortlilla. Tornene 2 x frugtens bredde. 0-600m. V-VI.

D. involucratus Sm. Langtornet gulerod. 10-20cm. Skærmstilkene længere end den bladbærende stængel. Storsvøbet længere end skærmstrålerne. Tornene 3 x frugtens bredde. 0-1600m. IV-V.

D. carota L. ssp. maximus (Desf.) Ball Vild gulerod. Endeskærmen 12-20 (10-30)cm bred. 0-900m. IV-X.

Pseudorlaya pumila (L.) Grande Sandskærm. 5-20cm. Tætharet enårig. Bladene 2-3 x delte. Oftest 3 skærmstråler. 2-5 grønne storsvøbblade. Frugten 7-10x5-6mm med torne på 2½-3½mm. Sandstrand. IV-V.

PYROLACEAE

Pyrola chlorantha Swartz Grønlig vintergrøn. VI-VII. TA,KY,KH.

Monotropa hypopitys L. Snylterod. 500-2000m. VI-VII. TA m.m.

ERICACEAE

Erica arborea L. Trælyng. 1-5m. Bladene 3-5mm. Støvdragerne indesluttede i den 2½-4mm lange, hvide krone. Blomsterne i sidestillede klaser samlede i en slags top. 0-1200m. III-V.

E. manipuliflora Salisb. Kranslyng. 30-60cm. Kronen lyserød, 3-3½ mm. Støvknapperne udragende. Bladene mest oprette til skrat oprette. 0-600m. VIII-IX.

Arbutus unedo L. Jordbærtræ. 1-8m. Unge kviste med kirtelbørster. Bladene 4-11x1½-4cm, stedsegrønne, læderagtige, skinnende ovenpa, med finttandet rand. Hvidlige krukkeblomster på 6-10cm i hængende klaser. Frugten et rødt bær med finvortet overflade på 2cm. X-XI.

A. andrachne L. Østligt jordbærtræ. 3-5m. Unge kviste glatte. Bladene mest m.m. helrandede. Frugten et orange bær på 8-13mm med affladede vorter. 0-700m. II-IV.

PRIMULACEAE

Primula acaulis (L.) L. (P. vulgaris) Storblomstret kodriver. ssp. acaulis: Bladet jævnt tilsmalnet i stilken. Lysegul krone. ssp. rubra (ssp. sibthorpii): Bladet kileformet, m.m. brat tilsmalnet i stilken. Kronen oftest rød eller rødlilla. II-V.

Cyclamen. Alpeviol.

1. Kronfligene med øret grund. Blomstrer før bladene ..... 2.
   " uden " " . " når " er fremme 3.
2. Bladene tydeligt kantet-lappede ..... hederifolium
   " ikke " " , finttandede graecum
3. Bladene groft tandede, ofte kantede ..... repandum
   " fint " , sjældent kantede persicum

Cyclamen hederifolium Aiton Vedbendbladet alpeviol. Frugtstilken oprullet fra spidsen. Kronen blegrød eller hvid med mørke, kløvede pletter ved grunden. VIII-X.

C. graecum Link Græsk alpeviol. Frugtstilken oprullet fra grunden eller fra midten. Kronen som hos den foregående. IX-XII.

C. repandum Sm. ssp. peloponnesiacum Grey-Wilson Tandet alpeviol. Kronen lyserød, med rødlilla tegning ved grunden; fligene 15-30mm.

Frugtstilken oprullet fra spidsen. 0-1200m. III-V.

Cyclamen persicum Miller Almindelig alpeviol. Kronen hvid eller lyserød, mørkt rødlilla omkring svælget, fligene 2½-4½cm. Frugtstilken krum, ikke indrullet. II-IV.

Lysimachia serpyllifolia Schreber Liden fredløs. 5-20cm. Glat med forveddet grund. Bladene 6-13x3-8mm, æg-hjærte- til æg-lancetformede, m.m. siddende, butte. Enlige, gule blomster i bladhjørnerne. Kronbladene 4-8mm. 1000-2300m. V-VIII. TA,ME,KY,KH.

L. atropurpurea L. Purpurfredløs. 20-65cm. En resedalignende plante med lancetformede blade med kruset rand og lange aks med siddende, 6-7mm lange, rødlilla blomster. V-X.

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby Stjærnehør. 3-12cm. Glat, opret, friskgrøn enårig. Bladene linje-lancetformede, spidse, modsatte og helrandede, 3-7x½-1½mm. Stjærneformet bæger på 3-6mm og en meget lille, hvid krone på nedbøjede stilke. 0-800m.III-V.

Anagallis arvensis L. Rød arve. Kronen med mange randhår. Kan godt være blå, hvorved den ligner A. foemina. Blomsterstilken ofte længere end bladene under blomstringen. 0-1300m. IV-X.

A. foemina Miller Blå arve. Kronen med få til ingen randhår, altid blå. Blomsterstilkene ofte kortere end bladene. IV-X.

A. minima (L.) Krause (Centunculus m.) Knudearve. 1-4cm. Hen ad Asterolinon, men bladene spredte og blomsterne m.m. siddende.

Samolus valerandi L. Samel. 0-1200m. VI-IX.

Coris monspeliensis L. Pigkrans. 10-30cm. 2-flerårig. Virker lyngagtig i vækst og blade. Tætte endestillede klaser af rødlilla blomster. Bægeret klokkeformet med 2 rækker tænder, hvoraf den yderste er sylformet og udstående. Kronen 9-12mm med lilla overlæbe og 5-lappet underlæbe. Krathede. 0-600m. III-V.

PLUMBAGINACEAE

Plumbago europaea L. Blyrod. 30-100cm. Flerårig urt. Nedre blade langstilkede og ægformede, øvre siddende, øreformet omfattende, med melet underside. Bægeret 5-7mm, tæt stilkkirtlet på ribberne. Kronen blålilla med et rør på 1½ x bægeret. 0-800m. VI-X.

Acantholimon echinus (L.) Boiss. 4-15cm. Tornet pudebusk, indtil 60cm bred. Bladene meget tætstillede, 11-21x1mm, linjeformede, trekantede og stikkende. Stænglen indtil 5½cm med 3-9 lyserøde blomster på 10-21mm. 1700-2400m. VII-mVIII. 2 underarter:
ssp. echinus: Stænglerne 2-11mm, lidet længere end bladene. TA,PR,KY.
ssp. lycaonicum (Boiss.& Heldr.) Bokhari: Stænglerne 10-55mm, længere end bladene.

Armeria. Fåreleger. 800-2300m. mVI-sVII.

1. De indre blade kort brodspidsede ..... rumelica
   " " " ikke " 2.
2. Ydre svøbblade meget smalt hindekantede ..... canescens
   " " bredt hindekantede 3.
3. Ydre svøbblade højst brodspidsede. Kronen mest lyserød majellensis
   Ydre svøbblade m.m. langspidsede. Kronen mest hvid undulata

Armeria canescens (Host) Boiss. Grå fåreleger. 25-70cm. Bladene smalt hindekantede, ofte halvbutte. Kurvens skede 18-30mm. Ydre svøbblade mest til- til langspidsede. Kronen mest lyserød.

A. majellensis Boiss. 7-20(-25)cm. Ihvertfald de ydre blade oftest bredt hindekantede, butte. Kurvens skede 7-13mm.

A. undulata (Bory) Boiss. Alle blade halvbutte, de ydre bredt hindekantede. Skaftet 10-50cm. Kurvens skede 8-15mm.

Armeria rumelica Boiss. Alle blade linjeformede, de ydre tilspidsede, de indre 1½-3mm. Kurvens skede 15-45mm. Ydre svøbblade smalt hindekantede. Småaksene kortstilkede.

Limonium. Hindebæger.

1. Bladene lappede ..... sinuatum
" helrandede 2.
2. Enårig. Småaksene ½-2cm adskilte ..... echioides
Flerårig 3.
3. Bladene fjerstrengede, 7-15cm lange ..... 4.
" ligestrengede, mest kortere 5.
4. Ydre dækblad overlapper 1/6-1/5 af det indre, grønt serotinum
" " " 1/3-2/5 " " " , klart gmelinii
5. Toppen højst med få golde grene ..... 6.
" med mange golde grene 8.
6. Bladene askegrået melede, 1½-2½cm ..... ocymifolium
" ikke melede 7.
7. Bladene 18-22mm, omvendt hjærteformede ..... frederici
" 4-6cm, spatelformede pigadiense
8. Småaksene bananagtigt krummede ..... virgatum
" rette 9.
9. Stængel og blade vortet ru ..... graecum
" " " glatte 10.
10. Indre dækblad uden brod ..... sieberi
" " med en brod på 0,7-0,9mm 11.
11. Aksene indtil 1½cm. Småaksene 1-blomstrede ..... melium
" 23-85mm. Småaksene 2-3-blomstrede coronense

Limonium sinuatum (L.) Miller Bugtet hindebæger. 20-40cm. Bladene med 4-7 par lapper. Kronen bleggul eller lyserød, omgivet af et oftest lillat bæger. 0-300m. V-VII.

L. echioides (L.) Miller Enårigt hindebæger. 5-12(-30)cm. Bladene omvendt ægformede, 2-4x1-1½cm, utydeligt fjerstrengede, knudrede. Småaksene bananformet krummede. 0-350m. V-VII.

L. serotinum (Rchb.) Pign. (L. vulgare ssp. s., L. narbonense). 30-70cm. Bladene 10-15x1½-3cm. Få golde grene. Aksene 1-2cm. VI-IX

L. gmelinii (Willd.) Kuntze 20-60cm. Bladene 7-11x2-3cm. 0-få golde grene. Aksene 6-10mm, tætte. Dækbladene tæt knudrede. Ydre dækblad klart med grøn midterribbe.

L. ocymifolium (Poiret) Ktze Melet hindebæger. 18-25cm. Hele planten og især bladene askegrået melede. Aksene med 3-5 toradet stillede småaks/cm. V-VII.

L. frederici (W.Barbey) Rech.f. Hjærtebladet hindebæger. 10-16 cm. Stænglen glat, gaffelgrenet og tyndgrenet. Aksene 1-6cm, løse, med 3 nedadkrummede småaks/cm. VI-VIII.

L. pigadiense (Rech.f.) Rech.f. 10-50cm. Bladene lysegrønne. Indre dækblad 3-farvet: grønt, brunt og klart. Bægeret 5-6½mm, håret forneden. VI.

L. virgatum (Willd.) Fourr. (L. oleifolium) Rishindebæger. 20-45 cm. Bladene 3-8x½-1cm, ihvertfald de større 3-strengede. 4-5 småaks/cm, 30-40° udstående. 0-200m. VI-X.

L. graecum (Poiret) Rech.f. Spredtblomstret hindebæger. 20-45cm. Bladene 20-40x4-12mm. Aksene 3-5cm, med 1-3 småaks/cm. V-VII.

L. sieberi (Boiss.) Ktze. 20-45cm. Planten grå til blågrøn. Bladene tynde, 2-3(-4½)cm. 2-3 småaks/cm. V-VII.

L. coronense Artelari -64cm. Bladene 23-72x3½-12mm, butte og omrullede. Indre dækblad 3,6-4mm. Kronen 6½-8mm. VII-VIII. Messinia: Koroni, nær borgen.

L. melium (Nyman) Pign. 20-40cm. Bladene 25-50x4-7mm, omrullede. Indre dækblad ca. 3mm. Kronen ca. 6mm.

STYRACACEAE

Styrax officinalis L. Jødevirak. 2-7m. Stjærnedunet busk. Spredte, bredt ægformede, helrandede blade på 3-7cm. Hængende klaser med 3-6 hvide, 5-7-fligede blomster på ca. 2cm. Bægeret klokkeformet, ganske korttandet. 0-600m. IV-V.

OLEACEAE

Fraxinus ornus L. Bjærgask. 5-9 kortstilkede småblade, der er 2-3 x så lange som brede. Knopperne grålige eller brunlige, m.m. blåduggede. Kronblade forefindes, 5-6mm lange, linjeformede, i oprette, ofte endestillede toppe. 0-1400m. IV-V.

F. angustifolia Vahl ssp. oxycarpa (Bieb.) Franco Smalbladet ask. 5-15(25)m. 5-13 m.m. siddende, lancetformede småblade med oftest lige så mange takker som sideribber. Brune knopper. 0-1000m.XI-I.

Ligustrum vulgare L. Liguster. 0-1300m. IV-V.

Olea europaea L. Oliventræ. 1-10m. Grå, udstående, ofte noget kantede grene. Bladene modsatte, oftest lancetformede, med noget mørkt grågrøn, glat overside og lysegrå underside, 2-8cm. IV-VI.

Phillyrea latifolia L. Bredbladet stenved. 1-5(-15)m. Stedsegrønne, modsatte blade af 2 slags: de unge ægformede, 2-7cm, m.m. savtakkede; de ældre lancetformede til elliptiske, 1-6cm, helrandede eller fint savtakkede. Små 4-talsblomster i korte klaser. Frugten en rund, blåsort stenfrugt på 6-10mm. 0-800m. III-V.

GENTIANACEAE

Cicendia filiformis (L.) Delarbre Bitterblad. 3-12cm. Opret enårig. Få linjeformede bladpar på 2-6mm. Langstilkede 4-talsblomster med en gul krone på 4-5mm. 0-300m. IV-V.

Blackstonia. Bitterling. Glat, blågrøn enårig på 5-50cm. Kronen hjulformet, gul, 6-8-tallig. Bladene m.m. parvist sammenvoksede.

B. perfoliata (L.) Hudson Spydbitterling. Øvre stængelblade ikke eller næppe tilsmalnede mod grunden. 0-1300m. V-VIII.

B. serotina (Koch) G.Beck (B. acuminata) Høstbitterling. Øvre stængelblade tydeligt tilsmalnede mod grunden. 0-900m. VI-IX.

Centaurium. Tusindgylden.

1. Kronen gul ..... maritimum
   " lyserød 2.
2. Blomsterne i aksformet kvast ..... spicatum
   " " halvskærmformet kvast 3.
3. Toårig. Bladrosetten veludviklet under blomstringen erythraea
   Enårig. " væk under blomstringen eller svag 4.
4. Stænglen oftest med 2-4 stængelled ..... pulchellum
   " " " 5-9 " tenuiflorum

Centaurium erythraea Rafn Marktusindgylden. 0-1500m. V-IX.3ssp:
ssp. rhodense (Boiss.& Reuter) Meld.: Stænglen oftest grenet fra grunden eller midten, ru foroven. Kronfligene spidse.
ssp. rumelicum (Velen.) Meld.: Stænglen oftest kun grenet i øvre halvdel. Kronfligene butte, mest 2½-5mm. Kvasten ret åben.
ssp. erythraea: Stænglen oftest kun grenet i øvre halvdel. Kronfligene butte, mest 5-6mm. Kvasten tæt.

C. pulchellum (Swartz) Druce Liden tusindgylden. Stænglen oftest gaffelgrenet i den nedre halvdel. Blomsterne langstilkede, ofte i en åben gaffelkvast. 0-800m. V-X.

C. tenuiflorum (Hoffm.& Lk.) Fritsch ssp. acutiflorum (Schott) Zeltner Kosttusindgylden. Stænglen grenet i den øvre halvdel. Blomsterne kortstilkede, oftest i en tæt gaffelkvast. IV-IX.

C. spicatum (L.) Fritsch Akstusindgylden. 10-55cm. 1-2-årig, oftest med bladroset. Blomsterne 13-14mm. 0-400m. VI-X.

Centaurium maritimum (L.) Fritsch Gul tusindgylden. 10-20cm. 1-2-årig. Kronen 20-25mm. 0-900m. IV-V.

Gentiana verna L. ssp. balcanica Pritchard Vårensian. 2-12cm. Med bladroset. Enlig og endestillet blomst. Bægeret med 1-2mm bredt vingede kanter. Mellem kronfligene et lille tolappet vedhæng. Kronen 17-27mm, kronfligene 7-12mm. 1800-2800m. VI-VII. KH.

APOCYNACEAE

Nerium oleander L. Nerie. 1-5m. Busk. Bladene oftest i kranse på 3, linje-lancetformede, op til 12cm, læderagtige, noget grågrønne med tætte, kamlignende ribber og bruskagtig rand. 3-4cm brede, lyserøde (sj. hvide) blomster. 0-300m. V-VII. Flodlejer.

Vinca herbacea W.& K. Smalbladet singrøn. 30-60cm. Stængler og blade visner om vinteren. Bladene 1½-4cm, smallere end hos V. minor. Sideribberne udgår under en vinkel på 10-30°.

V. major L. Stor singrøn. 1-3m. Overvintrende blade på 2½-9x2-6 cm. Kronen 3-5cm bred. 250-700m. III-VI. Dyrket og forvildet.

ASCLEPIADACEAE

1. Bladgrunden hjærteformet indskåret ..... 2.
" ikke indskåret 3.
2. Stænglen ikke slyngende ..... Cionura
" slyngende Cynanchum
3. Forveddet slyngplante på 2-10 m ..... Periploca
Urter. Mest oprette 4.
4. Kronen rødlilla med orange bikrone ..... Asclepias
" ensfarvet 5.
5. Bladene smalt lancetformede, 5-10cm x 3-8mm ... Gomphocarpus
" bredt ægformede og spidse Vincetoxicum

Periploca graeca L. Træranke. Bladene bredt elliptiske, 4-12x2-7 cm, hindeagtige, stilkede. Mangeblomstrede akselstillede kvaste. Blomsterne ca. 2cm brede, mørkt brunlilla med grønlig yderside. Om. V-VI.

Gomphocarpus fruticosus (L.) Aiton f. Børstekapsel. 1-2m. Mangeblomstrede, hvide skærme i bladhjørnerne. Kapslen ægformet, 4-6 x 2-3cm, med masser af stive børster på 3-7mm. 0-350m. VI-VIII.

Asclepias curassavica L. Ravsilkeplante. 30-70cm. Bladene lancetformede, 5-15cm, stilkene 1-2cm. IV-VIII. Dyrket og forvildet.

Cynanchum acutum L. Spids svalerod. Slyngplante op til 3m. Bladene spidst ægformede, 3-12cm; stilken 1-5cm. Tætte skærme i bladhjørnerne. Hvid eller blegrød krone, 8-12mm bred.0-300m.VII-VIII.

Vincetoxicum hirundinaria Med. ssp. nivale (Boiss.& Heldr.) Markgraf Svalerod. Kronen gul. 700-2000m. VI-VII. TA,KH.

Cionura erecta (L.) Griseb. Syrenbladet svalerod. -1m. Bladstilkene 1½-5cm. Bladene ca. 7x5cm, spidst ægformede. Kronen hvid, ca. 1cm bred. 0-600m. VI-VII.

CONVOLVULACEAE

1. Klatrende snylteplanter uden bladgrønt ..... Cuscuta
Fritlevende planter med bladgrønt 2.
2. Kronen indtil 5mm, ca. ½ delt ..... 3.
" over 5mm, næppe delt 4.
3. Bladene siddende, lancet- til ægformede, 2-10mm ..... Cressa
" langstilkede, nyreformede til runde Dichondra
4. Forbladene brede og bladagtige, dækker delvist bægeret Calystegia
Forbladene små, dækker næppe bægeret 5.
5. Støvfanget med 1-3 kugleformede lapper ..... Ipomoea
" " 2 tråd- til kølleformede lapper Convolvulus

Cuscuta. Silke.

1. Støvfanget hovedformet ..... campestris
" forlænget 2.
2. Bægerrøret gennemskinneligt og netåret ..... approximata
" mat, ikke netåret 3.
3. Blomsten 4(5)-tallig. Kronfligene oprette ..... palaestina
" (4)5-tallig. " udstående 4.
4. Bægerfligene aflange, længere end røret ..... planiflora
" trekantet-ægformede, ca. = røret 5.
5. Griflen kortere end frugtknuden. Bægeret mest hvidt brevistyla
Griflen ca. = frugtknuden. Bægeret rødligt, kødet epithymum

Cuscuta campestris Yuncker Svinesilke. Stænglerne ret kraftige, gullig. Hovederne 10-12mm. Kapslen 2-3mm. Især på Kløver og Sneglebælg. 0-800m. V-IX.

C. palaestina Boiss. Liden silke. Stænglerne meget tynde, ofte rødlige, stærkt grenede. Nøglerne 4-6mm. På dværgbuske. V-VII.

C. epithymum (L.) L. ssp. kotschyi (Desm.) Arc. Lyngsilke. Stænglerne mest rødlige eller rødlilla. Nøglerne 5-6mm. Blomsterne ca. 2½mm. Mest på dværgbuske. 0-1500m. VI-VII.

C. brevistyla A.Braun Kortgriflet silke. Nøglerne 4-7mm. Blomsterne 2-3mm. Bægeret hindeagtigt. På urter. VI-VII.

C. planiflora Ten. Hvidblomstret silke. Blomsterne 1½-2½mm. Kronen hvid. Bægerlapperne opsvulmede, næsten halvkredsformede i tværsnit. 0-1000m. V-VII.

C. approximata Bab. ssp. macranthera (Boiss.) Feinbrun Fluevingesilke. Stænglerne gullige, ret tykke. Nøglerne 7-12mm. Det tørre bæger gyldengult, fluevingeagtigt. 0-1000m. V-VII.

Cressa cretica L. Strandpude. 10-30cm. Pudeagtig, grådunet 1-flerårig. Bladene med hjærteformet grund. Blegt lyserøde blomster på 3-5mm i korte aks for enden af grenene.Sandstrand.VI-VII.

Calystegia soldanella (L.) R.Br. Strandsnerle. 10-50cm. Stænglerne liggende, lidet klatrende. Bladene nyreformede og noget kødede. Sandstrand. VI-VIII.

C. sepium (L.) R.Br. Gærdesnerle. Forbladene sj. over 15mm brede, overlapper ikke og dækker ikke bægeret helt. 0-1400m. V-IX.

C. silvatica (Kit.) Griseb. Skovsnerle. Som sepium, men blomsterne større, 5-9cm. Forbladene dækker bægeret helt og er 15-40 mm brede i flad tilstand. 0-800m. IV-X.

Convolvulus. Snerle.

1. Bladene jævnt tilsmalnede i den korte stilk ..... 2.
" skarpt afsatte fra stilken 6.
2. Pudeplante på 3-7cm med forveddede stængler .... libanoticus
Planten ikke pudeformet 3.
3. Enårig. Kronen blå med gul grund ..... pentapetaloides
Flerårig. Kronen lyserød (hvid) 4.
4. Stænglerne urteagtige, kun forveddede ved grunden cantabrica
" m.m. forveddede 5.
5. Ret stærkt forveddet. Toppen m.m. bladløs ..... dorycnium
Mindre forveddet. Toppen bladet oleifolius
6. Kronen blå ..... siculus
" lyserød eller hvid 7.
7. Bladene ikke fligede ..... arvensis
Mellemste og øvre blade fligede 8.
8. Planten med udstående, ofte brunlige hår ..... althaeoides
" " tiltrykte, sølvhvide hår elegantissimus

Convolvulus libanoticus Boiss. Dværgsnerle. Bladene 8-20x2-4mm, 1-årede, glatte ovenpå, m.m. tiltrykt dunede nedenunder. Kronen 13-16mm, lyserød, med 5 hårstriber. 1600-2130m. VI-VIII. KY.

Convolvulus dorycnium L. Busksnerle. 30-100cm. Opret, udspærret-grenet, tætdunet busk. Kvaststilkene meget længere end forblade og blomster, 1-få-blomstrede. 0-200m. V-VII.

C. oleifolius Desr. Rød sølvsnerle. 10-50cm. Opret, tæt silkehåret flerårig. Bladene m.m. linjeformede. Kronen 17-20mm. IV-VI.

C. cantabrica L. Rank snerle. 20-50cm. Opret og dunet, udstående håret, i det mindste forneden. Kronen 15-25mm. 0-1300m. V-X.

C. pentapetaloides L. Klokkesnerle. 10-30cm. Kronen 7-10mm, 2 x bægeret og ret indskåren. 0-600m. III-VI.

C. siculus L. Blå snerle. 10-60cm. Svagt dunet 1-flerårig. Bladene lancet- til ægformede med hjærteformet grund. Kronen 7-12mm.

C. arvensis L. Agersnerle. 0-1100m. IV-VIII.

C. althaeoides L. Katostsnerle. 30-60cm. Bladene næsten helt delte i 5-8 flige, hvoraf den midterste er grofttandet. Kronen lyst rødlilla, katostfarvet, 2-3cm bred. 0-500m. IV-VI.

C. elegantissimus Miller (C. althaeoides ssp. tenuissimus) Syvfliget snerle. 30-60cm. Som den foregående, men bladene helt delte i 7 smalle, helrandede flige. 0-1300m. IV-VI.

Ipomoea acuminata (Vahl) R.& Sch. Spidsbladet tragtsnerle. 1-3m. Flerårig. Bladene 4-16cm, hjærteformede, helrandede til trelappede. Kronen 5-8½cm, blå, rød eller hvid. Bægerbladene uden børster. VI-X. Forvildet.

I. purpurea Roth Rød tragtsnerle. 1-4m. Mest enårig. Kronen 4-6 cm. Bægerbladene med lange børster forneden. Bladene mest hele. VI-X. Forvildet.

Dichondra micrantha Urban Skægsnerle. 5-15(-50)cm. Dunet, krybende og rodslående flerårig. Bladene 1-3cm, m.m. skinnende og helrandede. Blomsterne hvidlige eller grønlige, 2-2½mm, enlige i bladhjørnerne på 1-2cm lange stilke. VII-IX. Forvildet.

BORAGINACEAE

1. Kronen spidsfliget hjulformet med et meget kort rør — Borago
   Kronrøret veludviklet — 2.
2. Nødderne tornede og fritsiddende ..... 3.
   " ikke tornede — 4.
3. Griffel og støvdragere udragende ..... Solenanthus
   " " " indesluttede — Cynoglossum
4. Sviklerne ikke bladede ..... 5.
   " bladede — 10.
5. Kronen med skålformet krave ..... 6.
   " " valse- til tragtformet krave — 7.
6. Kronen hvid, mest uden svælgskæl ..... Heliotropium
   " med svælgskæl, mest lyseblå — Myosotis
7. Kronen blå med gule svælgskæl ..... Omphalodes
   " anderledes — 8.
8. Bladene smalt omvendt lancetformede. Nødden 11-15mm — Rindera
   " m.m. ægformede — 9.
9. Støvdragerne fremragende ..... Procopiania
   " indesluttede (men udragende svælgskæl) — Symphytum
10. Kronrøret bøjet. Kronen m.m. uregelmæssig ..... 11.
    " ret. Kronen regelmæssig — 12.
11. Kronen med svælgskæl ..... Anchusa
    " uden " — Echium
12. Kronen valse- eller kegleformet, mest gul ..... 13.
    " med tragt-, skål- eller hjulformet krave — 14.
13. Planten glat ..... Cerinthe
    " bebørstet — Onosma
14. Frugtbægeret forstørret, fladtrykt og tandet ..... Asperugo
    " ikke fladtrykt — 15.

15. Kronen lyseblå med gule svælgskæl ..... Omphalodes
" anderledes 16.
16. Kronen med tydelige svælgskæl, der er mindst så lange som brede. Nødderne med en ringformet krave .. Anchusa
Kronen uden eller med kortere svælgskæl 17.
17. Nødderne uden nogen særligt afsat fod ..... 18.
" med en særligt afsat fod 19.
18. Kronen gul, 22-32mm lang og 14-22 mm bred ..... Macrotomia
" anderledes Lithospermum
19. Nødderne med en tydelig stilk ved grunden ..... Alkanna
" " " ringformet krave ved grunden Nonea

Heliotropium. Skorpionsurt.

1. Flerårig, glat, kødet og noget blågrøn ..... curassavicum
Hårede enårige med bispestavsformede svikler. Ægf. blade 2.
2. Bægeret højst ½ delt ..... supinum
" delt til grunden 3.
3. Stænglen tæt lådden. Kronen med svælgskæl ... hirsutissimum
" m.m. tiltrykt dunet. Kronen uden svælgskæl 4.
4. Støvfanget linje-sylformet, oftest glat ..... europaeum
" kegleformet, mest finvortet eller håret dolosum

Heliotropium europaeum L. Alm. skorpionsurt. 5-40cm. Oftest opret. Bladene mest 2-3x1-2cm, stilken 1-1½cm. Bægerbladene 0,4-0,8mm brede. 0-600m. VI-XI.

H. dolosum De Not. Kystskorpionsurt. 5-40cm. Bægerbladene 0,8-1,1mm brede. Ellers som foregående. 0-500m. VIII-X.

H. hirsutissimum Grauer Lådden skorpionsurt. 10-40cm. Blomsterne duftende. Frugten glat. Stænglens hår ca. 1mm. 0-800m. V-X.

H. supinum L. Lav skorpionsurt. 10-30cm. Ligner europaea, men hvidfiltet, med opret midtergren og udstrakte sidegrene. Bægeret pæreformet fortykket i frugt. 0-600m. VII-IX.

H. curassavicum L. Strandskorpionsurt. 20-50cm. Liggende til opstigende. Bladene linje-spatelformede, m.m. siddende, 1½-2½cm. Aksene 2-6cm, lidet krummede. Kronen 2mm bred. VI-VIII. Forv.

Lithospermum. Stenfrø.

1. Dværgbusk ..... zahnii
Urter 2.
2. Kronen gul. Enårig ..... apulum
" hvid eller blå 3.
3. Flerårig. Kronen først rødlilla, senere mørkeblå purpurocaeruleum
Enårig 4.
4. Bægerhårene gullige. Nøddens grund ½-¾mm bred tenuiflorum
" hvidlige. " " over ¾mm bred arvense

Lithospermum apulum L. (Neatostoma a.) Gult stenfrø. 5-25cm. Stivhåret; halvskærmagtigt grenet foroven. Sviklerne tætte og ensidige. Kronen 6-6½mm. Bladene m.m. linjeformede.0-1000m.III-V

L. purpurocaeruleum L. Blåt stenfrø. 15-60cm. Bueformede stængler i større bevoksninger. Lancetformede, spidse blade på 3½-8 cm. Kronen 14-19mm. 0-1000m. IV-VI.

L. arvense L. Rynket stenfrø. 0-2200m. I-mVII. 3 underarter:
ssp. gasparrinii (Heldr.): Køllestenfrø. Frugtstilkene køllefor-met fortykkede. Kronen mest blå. 1000-2200m. fV-mVII.
ssp. arvense: Bægeret lig eller længere end kronrøret i blomst. Kronen hvid (sj. lilla).
ssp. sibthorpianum (Griseb.): Bægeret tydeligt kortere end kron-røret i blomst. Kronen mest hvid.

L. tenuiflorum L.f. 10-30cm. Mest opret. Sviklerne 2-3 sammen. Blomsterstilkene meget korte. Nødderne med et næb. III-V.

Lithospermum zahnii Heldr. (Lithodora z.) -50cm. Næsten sortgrenet. Bladene 2-4cm x 2-4mm, linjeformede, sidder på grenenderne. Blomsterne 13-18mm brede, blå eller hvide. 50-600m. sIII-VI. Mani-halvøen SØ for Kalamata.

Macrotomia densiflora (Ledeb.) Macbride (Arnebia d.) 8-25cm. Flerårig med smalt lancetformede, tiltrykt hårede, helrandede grundblade. Flere svikler samlede i et hovede. 1200-1900m. mVI-mVII. KH (Styx-kløften).

Onosma. Æselurt.

1. Børsterne enkle med knudret grund ..... 2.
   " med stjærneformet grund 4.
2. Kronen fintdunet. 2-3 bægertænder sammenvoksede ... visianii
   Kronrøret m.m. glat. Bægertænderne oftest frie 3.
3. Golde stængler mest udstrakte. Nødderne jævne ... frutescens
   Stænglerne oprette. Nødderne rynkede til vortede graecum
4. Bladene mest mindst 1cm brede ..... spruneri
   " oftest meget smallere 5.
5. Støvknapperne sideværts forbundne i hele længden leptanthum
   " kun forbundne ved grunden 6.
6. Blomsterne langstilkede ..... sangiasense
   " m.m. siddende 7.
7. Støttebladene mindst lig bægeret ..... erectum
   " kortere end bæger og stilk (undertiden måske på de 1-3 nederste blomster. Lysegul krone 8.
8. Mange golde bladrosetter under blomstringen ..... kaheirei
   0-få " " " " heterophyllum

Onosma frutescens Lam. Buskagtig æselurt. 5-20cm. Udstrakt halvbusk. Kronen 17-20mm, ofte med m.m. orange eller rødbrunt skær fortil. Støvknapperne oftest ¼-½ udragende. III-V.

O. graecum Boiss. 15-40cm. Oftest toårig. Kronen 15-18mm, mørkegul, bliver orange eller brunlig fortil under blomstringen. Støvknapperne indesluttede. 0-850m. IV-VI.

O. visianii Clementi Græsæselurt. 25-50cm. Mest toårig. Kronen 17-20(-25)mm, hvidlig til bleggul. Støvknapperne sideværts forbundne i hele længden. 1000-1650m. VI-VII. TA i 1902.

O. spruneri Boiss. 25-40cm. Halvbusk med forveddet grund. Grundbladene 10-26x½-2cm, med flad rand og tydelige sideribber på undersiden, denne med kraftige tiltrykte hår på midterribben og tynde, udstående hår på fladen. 0-600m. IV-V.

O. leptanthum Heldr. 10-20cm. Flerårig. Stjærnebørsterne med 10-30 stråler, der er mindst ½ x børsten. Støvknapperne lidt udragende. Bægeret med lange, enkle hår indvendigt. 1450-2000m.VI-VII.TA.

O. sangiasense Teppner & Iatrou Flerårig med udstrakt vækst og lidt forlængede golde skud. Bægeret silkehåret indvendigt. Stjærnebørsterne med 5-30 stråler, der er oftest under ½ x børsten. 150-350m. sIV-V. Lakonien: Sangias-bjærgets sydskrænt.

O. erectum Sm. 15-25cm. Flerårig. Stjærnebørsterne meget tætte, med 10-20 stråler. Sviklerne meget tætte først i blomstringen. Kronen 22-30mm, mørkegul (sj. lysere under blomstringen). 2ssp.: ssp. erectum: Kronen indtil 28mm, højst håret på fligene. 150-1700m. IV-V. TA,PR, Stymfaliske Sø.
ssp. malickyi Teppner: Kronen indtil 30mm, røret ihvertfald dunet i 5 længdestriber, sj. glat. 700-1700m. V-VI. TA,OL,KH,PN.

O. kaheirei Teppner Flerårig. Bladene med udstående børster på 3-4mm i nedre 1/2-2/3 af bladet, især langs randen. Nederste støtteblade ca. = bægeret, øvre gradvist mindre. Kronen 20-24mm, citrongul. 500-1200m. mIV-fVI. PN.

O. heterophyllum Griseb. 15-50cm. Stjærnebørsterne m.m. tætte, af meget forskellig størrelse. Støttebladene ofte meget kortere

end bægeret. 0-2150m. mV-VII. TA,PR,KH m.m.

Cerinthe. Voksurt. Oftest blågrønne, m.m. glatte, men ofte hvidknudrede planter med helrandede blade. Stængelbladene med omfattende grund. Kronen gul, ofte med rødt eller lillat anstrøg.

C. minor L. ssp. auriculata (Ten.) Domac Purpurvoksurt. 20-40 cm. Flerårig. Kronen 10-12mm, ½ delt i 5 oprette, spidse flige, med gul grund og lilla flige og svælg. 800-1900m. V-VII.

C. major L. Storblomstret voksurt. 15-60cm. Enårig. Kronen 15-50x5-8mm, ret, gul med en rødbrun ring i svælget, eller helt mørkerød. Korte, tilbagebøjede kronflige. 0-800m. XII-VI.

C. retorta Sm. Mørkspidset voksurt. 10-50cm. Enårig. Kronen 10-15x3-5mm, krummet foroven og indsnøret i svælget, lysegul, lilla fortil. Korte, tilbagebøjede kronflige. 150-700m. III-V.

Alkanna. Stilkfrø. Flerårige. Bægeret delt næsten til grunden.

1. Kronen blå ..... tinctoria
" ikke blå 2.
2. Kronen dunet eller fintdunet udvendigt ..... 3.
" glat udvendigt 5.
3. Kronrøret kun lidt længere end bægeret ..... calliensis
" mindst 1½ x bægeret 4.
4. Nedre støtteblade 2 x bægeret ..... pindicola
Støttebladene højst lidt længere end bægeret methanea
5. Kronen hvidlig ..... sartoriana
" gul 6.
6. Bladranden bølget og bugtet-tandet ..... orientalis
" flad og helrandet graeca

Alkanna orientalis (L.) Boiss. 30-50cm. Bebørstet og kirteldunet. Støttebladene indtil 2 x bægeret, dette 6-8mm i blomst, 10-15mm i frugt. Kronen 9-12mm bred. IV-VIII.

A. graeca Boiss.& Spr. 15-50cm. Stivbørstet. Stængelbladene m. m. linjeformede; grundbladene 6-10x1-1½cm. Støttebladene 2 x bægeret. Nødderne netknudrede. 2 underarter:
ssp. graeca: Stænglen kirtlet. Bægeret langstilket. Kronrøret = bægeret. Mest under 1500m.
ssp. baeotica (DC.) Nyman: Stænglen ukirtlet. Bægeret kortstilket. Kronrøret næsten 2 x bægeret. Mest over 1500m.

A. calliensis Heldr. 20-40cm. Tæt kirteldunet og spredt stivhåret. Nedre støtteblade 2 x, øvre ½ x bægeret. Kronen gul, ca. 6 mm bred. Bægeret tæt kirtlet, 6mm i blomst, 8mm i frugt.

A. methanea Hausskn. 10-30cm. Stivbørstet og tæt kirteldunet. Støttebladene linje-lancetformede. Bægeret tætkirtlet, 6-7mm i blomst, 10-11mm i frugt. Kronen gullig, 6-7mm bred.

A. tinctoria (L.) Tausch Farvestilkfrø. 8-20cm. Kraftigt stivhåret, ukirtlet. Bladene ret smalle. Kronen 6-7mm bred, mest mørkeblå, ellers himmelblå. 0-500m. IV-VI.

A. pindicola Hausskn. 30-50cm. Grundbladene 10-20x3cm. Planten m.m. kirteldunet samt stivhåret. Kronen bleggul til brunlig, 5-6 mm bred. Støttebladene trekantet-hjærteformede.

A. sartoriana Boiss.& Heldr. 10-40cm. Stivbørstet og kirteldunet. Grundbladene 5-7x1cm, aflange. Støttebladene ca. = bægeret. Kronen hvidlig, ca. 10mm bred, kronrøret = bægeret. Frøene ca 2mm, knudrede, med krumt næb. Sandet kyst og bakkeland mellem Nauplion og Tolon på Øst-Pelop. Uddød?

Echium. Slangehoved.

1. Alle støvdragere indesluttede i kronen ..... 2.
Mindst 1-2 udragende støvdragere 3.

2. Bægeret i blomst 6-8mm, i frugt indtil 15mm med ved grunden 3-6mm brede flige ..... parviflorum
   Bægeret i blomst 5-7mm, i frugt indtil 10mm med ved grunden 2-3mm brede flige arenarium
3. Kronen bleg ..... italicum
   " blå eller rødlilla eller rødlig 3.
4. Kronen m.m. glat, kun håret på kanter og årer plantagineum
   " m.m. jævnt håret angustifolium

Echium angustifolium Miller Smalbladet slangehoved. 25-40cm. Børsterne udstående og stikkende. Øvre stængelblade 3-5mm brede. Kronen rødlig til rødliglilla. 0-350m. IV-VIII.

E. italicum L. ssp. biebersteinii (Lacaita) Breuter & Burdet Blegt slangehoved. 40-100cm. Stivhåret toårig. Grundbladene 20-30 cm. Toppen ofte stærktgrenet og smalt kegleformet. Kronen 10-12mm lyst gråbrun, med 4-5 langt udragende støvdragere.0-1000m.IV-VI.

E. plantagineum L. Purpurslangehoved. 20-60cm. Opret 1-2-årig, blødhåret. Kronen 18-30mm, først blå, siden rødlilla, så lyserød. Oftest 2 udragende støvdragere. 0-600m. IV-VI.

E. parviflorum Moench Bladbægret slangehoved. 10-40cm. Opstigende til opret. Bladene med tiltrykte børster. Kronen 10-14mm, blegblå med mørkere rand, m.m. rørformet. 0-400m. III-V.

E. arenarium Guss. Sandslangehoved. 15-25cm. Opstigende. Bladene med korte, hvidlige, tiltrykte børster. Kronen 6-10mm, mørkeblå til blålilla, m.m. rørformet. 0-300m. III-V.

Nonea. Kosakurt.

1. Grundbladene ca. 30x8cm, langstilkede. Flerårig cesatiana
   Bladene mindre, m.m. siddende 2.
2. Kronen ca. ¼ delt. Mest flerårig ..... pulla
   " 1/2-1/3 delt. Enårig 3.
3. Kronen blå, ca. ½ delt ..... obtusifolia
   " bleggul eller hvid, ca. 1/3 delt ventricosa

Nonea cesatiana (Fenzl & Fried.) Greuter & Burdet (Paraskevia c., Pulmonaria auriculata) Rødbrun lungeurt. 25-35cm. Lungeurtlignende plante med klæbrig blomsterstand. Kronen 9-12mm bred, rødlilla til rødbrun. 1000-1400m. I skov af Duneg, Græsk ædelgran og Østrigsk fyr. TA(Norddelen),KH, Andritsena.

N. pulla (L.) DC. Brun kosakurt. 20-50cm. Gråhåret 1-flerårig. Bægeret 1/4-1/3 delt. Kronen 10-14mm, mest mørkebrun eller brunlilla, 5-8mm bred, ca. ¼ lappet. 200-800m. V-VIII.

N. obtusifolia (Willd.) DC. Blå kosakurt. 5-15cm. Ukirtlet.enårig. Bladene 3-5x1cm, halvbutte, m.m. aflange. Nødden skinnende med jævn ring ved grunden. 0-300m. III-V.

N. ventricosa (Sm.) Griseb. Hvid kosakurt. 10-40cm. Stivhåret enårig. Bægeret ofte meget stærkt opblæst i frugt, tænderne ca. 1/3 x røret. Frugten rynket med ribbet ring. 0-250m. III-V.

Symphytum bulbosum Schimper Sylkulsukker. 15-50cm. Krybende jordstængel med knolde. Kronen lysegul, 8-11mm. Kronskællene udragende. 300-1400m. III-IV.

S. ottomanum Friv. Småblomstret kulsukker. 30-80cm. Tenformet rod uden knolde. Kronen hvid, 5-7mm. Kronskællene udragende. 200-1900m. IV-V.

Procopiania cretica (Willd.) Guşuleac 10-50cm. Langstilkede, ægformede blade. Kronen blålilla, sj. hvid; kronrøret 2½-4mm, fligene 2½-4½ x røret. 0-800m. III-V.

Anchusa. Oksetunge.

1. Kronen gul ..... aegyptiaca
   " ikke gul 2.

2. Kronrøret krumt. Kronen lidt usymmetrisk ..... 3.
" ret. Kronen symmetrisk 6.
3. Alle blomster med støtteblade ..... 4.
Kun de nedre blomster med støtteblade 5.
4. Sviklerne tætte, med kortstilkede blomster ..... arvensis
" løse, stilkene 7-10(-20)mm ovata
5. Opstigende eller opret. Kronen mørk ..... cretica
Liggende. Kronen lys variegata
6. Blomsterstilken mindst lig bægeret i blomst ..... spruneri
" kortere end " " " 7.
7. Bægertænderne butte ..... hybrida
" spidse 8.
8. Kronen mørkeblå. Nødderne 7-10x2-3mm ..... azurea
" mørklilla. " 2x4mm officinalis

Anchusa hybrida Ten. Korttandet oksetunge. 20-50cm. 2-flerårig. Bladene spidse, ofte med bølget rand. Bægeret ca. ½ delt. Kronens rør 5-8mm, kraven 3-5mm bred, blå eller lilla.0-1200m.V-IX.

A. officinalis L. Lægeoksetunge. 0-1500m. V-VIII.

A. azurea Miller (A. italica) Blå oksetunge. 30-80cm. Flerårig. Sviklerne forlænges i frugt, så bægrene sidder 1-2cm fra hinanden. Kronen 10-15mm bred. 0-1200m. IV-VII.

A. spruneri Boiss. 10-40cm. Opret enårig. Hårene med knudret grund. Sviklerne korte og parrede. Blomsterstilkene ca. 5mm. Kronen blålilla, 7-10mm bred. IV-VIII.

A. aegyptiaca (L.) DC. 5-30cm. Liggende til opstigende enårig. Børsterne med knudret grund. Sviklerne meget løse. Kronen bleggul, røret ca. 4mm, kraven 3-5mm bred. III-V.

A. arvensis (L.) Bieb. Krumhals. Kronrøret 5-7mm, krummet nær midten. 0-1600m. V-VIII.

A. ovata Lehm. (A. arvensis ssp. orientalis) Nær foregående, men kronrøret 4-5mm, krummet under midten.

A. cretica Miller Hvidåret krumhals. 10-50cm. Kronen 6-9mm bred, først lilla, senere blå med hvide striber. Nødderne rynkede mellem netribberne. 0-1500m. II-VI.

A. variegata (L.) Lehm. Broget krumhals. 10-50cm. Kronen først hvid eller bleglilla, senere blegblå med rødlige pletter. Nødderne glatte mellem netribberne. 0-900m. II-V.

Borago officinalis L. Hjulkrone. 20-60cm. Enårig. Kronen med op til 15mm lange, vandret udstående kronflige. De 6mm lange støvknapper samlede i et fremadrettet rør. 0-600m. IV-V.

Asperugo procumbens L. River. 0-1800m. II-VII.

Myosotis. Forglemmigej.

1. Flerårig ..... 2.
Enårig 3.
2. Frugtbægeret afrundet forneden. Nødderne spidse silvatica
" tilsmalnet " . " butte suaveolens
3. Bægeret kun med rette, tiltrykte, fremadrettede hår ..... 4.
" med udstående kroghår 6.
4. Kronen ca. 5mm bred ..... cadmea
" højst 3mm bred 5.
5. Frugtbægrene tætstillede og tiltrykte ..... litoralis
" ej " , lidt udstående incrassata
6. Sviklens akse med nogle udstående eller skråt oprette hår 7.
" " kun med tiltrykte hår 9.
7. Næsten alle frugtstilke nedbøjede ..... refracta
Øvre frugtstilke oprette til udstående 8.
8. Stængelhårene opadrettede, mange tiltrykte ..... stricta
" udstående minutiflora

9. Blomsterne først gule, så lyserøde eller lyseblå .. discolor
" lyseblå hele tiden 10.
10. Nedre frugtstilke 2 x bægeret eller længere ..... arvensis
" " ca. = bægeret eller kortere 11.
11. Kronrøret forlænges efter blomstringen ..... congesta
" " ikke efter blomstringen ramosissima

Myosotis incrassata Guss. Kølleforglemmigej. 5-20cm. Øvre stængelhår tiltrykte. Frugtstilkene kølleformede. Frugtbægrene toradet stillede. 500-2100m. III-VI.

M. cadmea Boiss. -25cm. Stænglen udstående håret lige til det øverste blad. Frugtstilkene udstående, ikke fortykkede. IV-V.

M. litoralis Steven Strandforglemmigej. 2-7cm. Liggende, ofte pudedannende. Bladene mørkt grågrønne, tæthårede. Frugtbægrene meget tætstillede med noget kølleformet fortykkede stilke.

M. arvensis (L.) Hill Markforglemmigej. 0-1400m. IV-VII.

M. ramosissima Rochel Bakkeforglemmigej. 0-1500m. IV-VI.

M. discolor Pers. Forskelligfarvet forglemmigej. 0-1000m. IV-V.

M. congesta Shuttlew. Vejforglemmigej. 5-25cm. Nødderne mørkebrune, med en kant. Modne frugtstilke mest $\frac{1}{4}$-$\frac{1}{2}$ x bægeret.0-1000m.III-V

M. stricta Link Rank forglemmigej. 800-2000m. V-VII.

M. minutiflora Boiss.& Reuter Krumstilket forglemmigej. -15cm. Blomsterne meget tætstillede, især mod sviklens spids. Kronen næppe 1mm bred, blegblå. Frugtstilkene ofte nedbøjede. IV-VI. KH.

M. refracta Boiss. ssp. refracta Nedbøjet forglemmigej. 5-25cm. Bladundersiden og stængelgrunden med kroghår. 800-2000m. KY,KH.

M. silvatica Hoffm. Skovforglemmigej. Nødderne med en meget lille tilhæftningsflade. 2 underarter:
ssp. subarvensis Grau: Kronen $3\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}$mm bred. Frugtbægeret 2-4mm.
ssp. cyanea (Boiss.& Heldr.) Vestergren: Kronen 5-8mm bred. Frugtbægeret $3\frac{1}{2}$-6mm. 800-2000m. mIV-mVIII. TA,PR,ME,OL,KY,KH,ER,PN.

M. suaveolens W.& K. (M. alpestris ssp. s.) 4-35cm. Nødderne med en stor tilhæftningsflade på 0,3x0,5mm. 1800-2800m. KY,KH,ER.

Omphalodes verna Moench Vårkærminde. 5-20cm. Flerårig med udløbere. Grundbladene 5-20x2-6cm, æg- til hjærteformede, spidse. Sviklen med støtteblade nederst. Bægeret håret. Kronen 8-10mm, blå med gule svælgskæl. 0-800m. III-IV.

O. luciliae Boiss. ssp. scopulorum Edmondson Blågrøn vårkærminde. 6-15cm. Tueformet flerårig. Bladene halvglatte og blågrønne. Sviklerne med 2-7 lyseblå blomster, 15mm brede. Frugtstilkene lange og nedbøjede. 1700-2800m. mVI-sVIII. KH.

Cynoglossum. Hundetunge.

1. Kronen blå ..... 2.
" rødbrun til matrød 3.
2. Kronen mørkeblå ..... columnae
" lys med blå årer creticum
3. Kronen rødbrun. Nødderne med fortykket kant ..... officinale
" matrød. " uden " " hungaricum

Cynoglossum officinale L. Alm. hundetunge. 0-2000m. V-VII.

C. columnae Ten. Enårig hundetunge. 15-40cm. Grågrøn enårig. Nødderne 7-10mm brede, med tydelig kant. 600-1800m. IV-VI.

C. creticum Miller Året hundetunge. 20-60cm. Grågrøn toårig. Frugtstilkene ofte nedbøjede. Nødderne uden tydelig kant. IV-VI.

C. hungaricum Simonkai Rød hundetunge. 20-40cm. Nødderne 4-6mm brede. Kronskællene når ikke kronfligenes grund. 800-1700m. V-VII.

Solenanthus stamineus (Desf.) Wettst. Klippesækkrone. 40cm. Grundbladene 15-30x2-4cm, lancetformede. Stængelbladene blødt grågrønt filtede. Kronen 6-7mm, lyst blålilla, med valseformet rør på ca. 2 x fligene. Nødderne 6½-10mm. 1400-2200m. mV-fVII. KH (over Sudena), KY (Flamburitsa-kløften; Dusia-toppen).

Rindera graeca (A.DC.) Boiss.& Heldr. Gråt skivefrø. 5-20cm. Rosetbladene 4-14cm x 3-8mm, tæt gråhårede. Få og små stængelblade. Kronen 9-12mm, valseformet, mørkt rødlilla. Nødderne 11-15mm, flade og med en bred vinge hele vejen rundt. 1600-2300m. fV-mVI. TA,PR,KY,KH.

VERBENACEAE

Vitex agnus-castus L. Kyskhedstræ. Busk på 1-6m. Unge grene but 4-kantede. Bladene modsatte, 5-7-fingrede med hvidfiltet underside og smalt lancetformede, helrandede småblade. Blomsterne lyslilla i lange, Buddleya-lignende aks. 0-500m. V-VIII.

Lantana camara L. Ildkrone. ½-1⅔m. Stinkende busk. Bladene ægformede, savtakkede, rynkede, m.m. hårede, modsatte. Røde, orange eller gule blomster i halvkugleformede stande på 4-8cm fra bladhjørnerne; rørformede med kort, 4-tallig krave. VI-IX.Forv.

Verbena officinalis L. Jærnurt. 15-60cm. Opret flerårig med modsatte, rude-spatelformede, lappede til fligede blade. Lyslilla læbeblomster i lange, smalle og for neden spredtblomstrede aks. Kronen 4mm, svagt tolæbet. 0-1200m. V-VIII.

Lippia nodiflora (L.) Michx Krybende kølbæger. 10-30cm. Krybende flerårig urt med modsatte, rude-spatelformede blade på 1-2½ cm. Små, hvide blomster i tætte, hovedformede aks på 2-4cm lange stilke fra bladhjørnerne. Bægeret delt i 2 kølede blade. Kronen lidt uregelmæssig. 0-300m. VI-VIII.

CALLITRICHACEAE

Callitriche. Vandstjærne.

1. Undervandsbladene gennemskinnelige ..... truncata
   " matte 2.
2. Frugterne uvingede ..... lenisulca
   " vingede fra grunden til spidsen stagnalis

Callitriche truncata Guss Kortbladet vandstjærne. Ingen flydeblade. Bladene smalner til fremad mod den afskårne eller tvetandede spids. Frugten nyreformet, smalvinget. 0-500m. III-V.

C. stagnalis Scop. Storfrugtet vandstjærne. 0-1200m. IV-IX.

C. lenisulca Clavaud (C. cophocarpa p.p.) Frugten rundagtig set fra siden, 1,1-1,2mm. Støvdragerne indtil 2mm. Støvknappen 0,3mm bred. Frugten med butkantet ryg. V-X.

LABIATAE

1. Kronens overlæbe mangler eller er stærkt reduceret ..... 2.
   " " veludviklet 3.
2. Underlæben 3-delt ..... Ajuga
   " 5-delt Teucrium
3. Støvdragerne helt indesluttede i kronrøret ..... 4.
   " rager frem fra kronrøret 6.
4. Blåblomstret småbusk ..... Lavandula
   Ikke blåblomstrede urter 5.
5. Støttebladene lig bladene. Flerårige ..... Marrubium
   " ulig bladene, eller også enårige Sideritis
6. 2 fungerende støvdragere ..... 7.
   4 " " 10.
7. Kronens overlæbe hvælvet ..... Salvia
   " " flad eller nedadbuet 8.
8. Bladene tandede til fligede ..... Lycopus
   " helrandede 9.

9. Enårig. Kronens overlæbe hel eller udrandet ..... Ziziphora
Busk. Kronens overlæbe kløvet Rosmarinus
10. Støvdragerne udspærrede, m.m. udragende af kronen ..... 11.
" rager ikke ud af kronen 14.
11. Kransenes blomster samlede i stilkede småaks ..... Origanum
" " ikke samlede i småaks 12.
12. Kronen næsten regelmæssigt 4-lappet ..... Mentha
" m.m. uregelmæssig 13.
13. Bægeret m.m. regelmæssigt ..... Satureja
" m.m. tolæbet Thymus
14. Kransene 1(2)-blomstrede. Kronen 17-20mm, mest hvid Prasium
" 2-flerblomstrede 15.
15. Bægeret m.m. regelmæssigt ..... 16.
" tolæbet 22.
16. Underlæbens sideflige mangler eller reducerede til små tænder ..... Lamium
Underlæben med tydelige sideflige 17.
17. De 2 griffelgrene tydeligt uens. Kronen 25-35mm ..... Phlomis
" " " m.m. ens 18.
18. Med krybende og rodslående stængler. Blå krone ..... Glechoma
Ikke " eller rodslående 19.
19. Støvtrådene parallelle ..... 20.
" udspærrede forneden, tilnærmede foroven 29.
20. 15 bægerribber. Indre støvdragere længst ..... Nepeta
5-10 bægerribber. Ydre " " 21.
21. Bægeret skålformet eller udvidet i øvre 1/4 ..... Ballota
" ikke eller næppe udvidet øverst Stachys
22. Bægeret med en pukkel på ryggen ..... Scutellaria
" uden en sådan pukkel 23.
23. Støttebladene helt ulig bladene ..... Prunella
" m.m. lig " 24.
24. De 2 griffelgrene tydeligt uens ..... 25.
" " " m.m. ens 27.
25. Bægeret med buget grund og smallere fortil ..... Acinos
" ikke buget eller indsnævret " 26.
26. Mange blomster i tætte kranse ..... Clinopodium
Stilkede blomster i kvaste Calamintha
27. Kronen 25-40mm ..... Melittis
" 4-15mm 28.
28. Kronrøret krumt ..... Melissa
" ret 29.
29. Bægeret med 13 ribber ..... Micromeria
" " 10 " Satureja

Ajuga. Læbeløs.

1. Bladene 3-fligede. Kronen gul ..... chamaepitys
" hele 2.
2. Bladene 3-6mm brede. Kronen rødlilla, lyserød eller gul .. iva
" 10-40mm brede. Kronen blå 3.
3. Øvre stængelled tvesidet hårede. Med lange udløbere .. reptans
" " trindt hårede. Uden udløbere orientalis

Ajuga orientalis L. Korthannet læbeløs. 10-60cm. M.m. lådden. Støttebladene ofte blåligt anløbne. Støvdragerne indesluttede i kronrøret. Nedre blade indtil 7-9x4cm. 0-600m. III-V.

A. reptans L. Krybende læbeløs. 0-1950m. IV-VI.

A. iva (L.) Schreber Moskuslæbeløs. 5-20cm. Moskuslugtende flerårig. Bladene smalle og helrandede eller kortlappede, lådne. III-VI.

A. chamaepitys (L.) Schreber Gul læbeløs. 10-20cm. Stærktlugtende 1-flerårig. 0-1500m. III-VI. 2 underarter:
ssp. chia (Schreber) Arc.: Flerårig. Bladfligene $1\frac{1}{2}$-3mm brede. Alle blade delte. Kronen 18-25mm.
ssp. palaestina (Boiss.) Bornm.: Grundbladene udelte. Nedre støt-

teblade indtil ½ delte, midterfligen under 6 x så lang som bred. Kronen 15-20mm.

Teucrium. Kortlæbe.

1. Bægeret tolæbet ..... francisci-werneri
   " ikke tolæbet 2.
2. Blomsterstanden længere end bred, ikke hovedformet ..... 3.
   " hovedformet, oftest bredere end lang 8.
3. Bladene helrandede ..... 4.
   " tandede 5.
4. Kvistene grønne til brune. Bladene smalle ..... brevifolium
   " hvidfiltede. Bladene m.m. ægformede aroanium
5. Urt, ikke forveddet forneden ..... scordium
   Dværgbusk eller halvbusk 6.
6. Med udløbere. Kun forveddet forneden ..... chamaedrys
   Uden " . Stænglerne forveddede 7.
7. Kronen gul. Bladstilken = bladpladens bredde ..... flavum
   " rød. " kortere end pladebredden divaricatum
8. Bladene helrandede ..... montanum
   " med 2-5 par rundtakker polium

Teucrium brevifolium Schreber 30-60cm. Stærkt udstående grenet busk. Bladene aflange til linjeformede, gråfiltede og omrullede. Blomsterne ca. 10mm, blå eller lilla. 0-400m. XII-IV.

T. aroanium Orph. 5-15cm. Stærktgrenet og liggende. Bladene 5-15x4-10mm, undersiden tæt hvidfiltet. Kronen 16-20mm, lyslilla med røde striber. 1300-1900m. VI-VIII. TA (1 fund), KH (kløfterne ved Styx og SV for Zarukhla).

T. francisci-werneri Rech.f. -25cm. Uldhåret-lådden flerårig. Bladene bredt ægformede og rundtakkede. Kronen 8-12mm, rødlilla. 20-300m. Kalkklipper. Kythæra, ved Leonidion.

T. scordium L. ssp. scordioides (Schreber) Maire & Petitm. Løgurt. 20-60cm. Med løglugt. Bladene lancetformede med 5-7 par tænder. Kronen lyserød, 7-10mm. 0-1500m. VI-VIII.

T. chamaedrys L. ssp. chamaedrys Ædelkortlæbe. 20-35cm. Bladene op til 2x1cm med 5-8 par tænder. Kronen 12-15mm, oftest rødlilla. 1000-2300m. TA,KY,KH,ER,PN.

T. divaricatum Sieber Vinterkortlæbe. 10-30cm. Bladene ægformede, svagt rundtakkede, 10-25x8-15mm, læderagtige. 2 ssp.: ssp. divaricatum: Hele planten m.m. lådden. 0-1200m. IV-VII. ssp. graecum (Celak.) Bornm.: Bladene m.m. glatte.

T. flavum L. ssp. hellenicum Rech.f. Gul kortlæbe. 30-50cm. Bladene trekantede og rundtakkede, skinnende ovenpå. Bægeret m.m. håret. 0-1000m. V-VII.

T. montanum L. Bjærgkortlæbe. 10-25cm. Halvbusk med liggende til opstigende, hvidfiltede grene. Bladene læderagtige, linjeformede, med omrullet rand. Bleggul krone, 12-14mm. 1600-2400m.

T. polium L. ssp. capitatum (L.) Arc. Hovedkortlæbe. 10-25cm. Dværgbusk med gråfiltet til hvidulden stængel og ret smalle, knippestillede blade. Kronen mest hvid, ca.5mm.0-900m.VI-VIII.

Scutellaria. Skjolddrager.

1. Støttebladene bladagtige. Blomsterne blå .... galericulata
   " ulig bladene 2.
2. Blomsterne gule. Bladene dybt fligede ..... orientalis
   " ikke gule. Bladene ikke fligede 3.
3. Akset m.m. firkantet. Kronen 22-30mm ..... alpina
   " ikke " . " 10-15mm rupestris

Scutellaria orientalis L. ssp. pinnatifida Edm. Gul skjolddrager. 4-20cm. Bladene 5-10x4-7mm, mørkegrønne med gråfiltet underside. Kronen 20-25mm. -2200m. IV-VII.

Scutellaria alpina L. Alpeskjolddrager. 5-20cm. Liggende til opstigende. Bladene ægformede, 10-30x5-15mm. Kronen hvid med lilla overlæbe. 1800-2600m. VI-VIII. TA,ER.

S. galericulata L. Alm. skjolddrager. 0-900m. VI-VIII.

S. rupestris Boiss.& Heldr. Klippeskjolddrager. 5-50cm. Bladene trekantet-ægformede, 20-45x15-35mm. Klasens led 8-12mm. Støtteblade 5-12x2-6mm. Overlæben rødlilla til lyserød. 5 underarter:
ssp. cytherea (Rech.f.) Greuter & Burdet: Kronrøret og underlæben bleggul til flødefarvet (eneste underart). Kythæra. V. 100m.
ssp. adenotricha (Boiss.& Heldr.) Greuter & Burdet: Stænglen halvglat (eneste underart). 20-50cm. 800-2300m. VI-mVIII.
ssp. caroli-henrici Bothmer: Kronens underlæbe bred, ca. 9mm i frisk tilstand (eneste ssp.). Malea-halvøen. 0-300m. V.
ssp. rupestris: 5-12cm. Klasen 2-5cm. Underlæben blegrød. 1900-2200m. VII-VIII. TA,ME.
ssp. parnassica (Boiss.) Greuter & Burdet: 15-40cm. Klasen 7-30 cm. Underlæben hvidlig til blegt rødlilla. 900-2200m. TA,PR,KY,KH.

Prasium majus L. Murgrøn. 30-100cm. Halvbusk med gulliggrå, længdesprukken bark. Bladene 2-5cm, friskgrønne, ægformede. Bægeret med 3-tandet over- og 2-tandet underlæbe, op til 25mm i frugt. Kronen mest hvid, ellers rødlilla. 0-600m. IV-VI.

Marrubium vulgare L. Kransburre. 20-45cm. M.m. filtet. Bladene m.m. runde, uregelmæssigt rundtakkede. Bægeret med 10 ens, krogformede tænder. Kronen hvid, 5-8mm. 0-600m. V-VIII.

M. cylleneum Boiss.& Heldr. -30cm. Hele planten gulfiltet til -uldden. Bladene rundagtige. Forbladene under 7mm. Bægertænderne kortere end røret. Kronen gullig, længere end bægeret. 1200-2100m. VI-VIII. ME,OL,KY,KH,PN.

M. velutinum Sm. Gul kransburre. -40cm. Stænglen gulligfiltet. Forbladene 9-13mm. Bægertænderne = røret. Kronen gul, højst lig bægeret. Bægertænderne lidt uens. 1700-2400m. VI-VIII. PN.

Sideritis. Kortkrone.

1. Flerårig	.....	2.
Enårig		3.
2. Kronens overlæbe med 2 brune striber	.....	clandestina
" " uden " "		raeseri
3. Bægertænderne m.m. ens	.....	4.
Øvre bægertand større og bredere end de 4 nedre		5.
4. Bladene 2-8mm brede, aflangt-lancetformede	.....	montana
" 8-15mm " , ægformede		lanata
5. Stænglen kort kirtelhåret. Kronen gul med sorte læber		lanata
" ikke " . " anderledes		6.
6. Bægertænderne udstående i frugt	.....	purpurea
" krummede " "		curvidens

Sideritis raeseri Boiss.& Heldr. Kirtelkortkrone. 10-50cm. Stængelbladene 1-5cm x 5-8mm. Mellemste støtteblade 5-20x8-19mm, grønliggule, kirtlede. Kronen 8-15mm, bleggul. 1200-2400m. VI-mVIII.

S. clandestina (Bory & Chaub.) Hayek Brunstribet kortkrone. 20-50cm. Stængelbladene 4-6cm x 9-16mm. Mellemste støtteblade hviduldne og ukirtlede, 11-30x6-20mm. Kronen 12-14mm, gul. 2ssp.:
ssp. clandestina: Kransene samlede i en akslignende stand. Mellemste støtteblades spids 6-15mm. 1200-2300m. sVI-VIII. TA,PR.
ssp. peloponnesiaca (Boiss.& Heldr.) Baden: Kransene alle adskilte. Mellemste støtteblades spids 4-6mm. ME,OL,KY,KH,ER. 1600-2000m

S. montana L. Alm. kortkrone. 5-25cm. M.m. lådden-uldhåret. Bægertænderne med en brod på 1-2mm. Kronen sort eller brunsort, oftest med gul underlæbe. 0-1000m. V-VII.

S. lanata L. Sortlæbet kortkrone. 10-30cm. Lådden til håret. Kronen ca. = bægeret, gul med sorte læber. Bægeret mest m.m. tolæbet. IV-VI.

Sideritis purpurea Talbot Purpurkortkrone. 5-25cm. Lådden-uldhåret. Bladene 10-25x5-12mm. Bægerribberne fremtrædende. Bægeret uden buget grund. Kronen rødlilla eller hvid. V-VI.

S. curvidens Stapf Krumtandet kortkrone. Som foregående, men bægeret med buget grund og svage ribber; tænderne ikke stikkende. V-VII. 0-1250m.

Melittis melissophyllum L. ssp. albida (Guss.) Ball Hvid hjærtensfryd. 40-70cm. Ægformede blade på 6-15cm med 20-24 par tænder og hjærteformet grund. Kronen mest hvid, evt. med rødplettet underlæbe. 0-1200m. V-VII.

Phlomis samia L. Storblomstret løvehale. -1m. Stænglen kirtlet. Bladene stjærnefiltede, lancet-ægformede, de nedre 8-18cm. Kronen rød, 30-35mm. Flerårig urt.

P. cretica C.Presl 30-45cm. Busk.Kirtelhåret stængel og bæger. Nedre blade 3-8cm, tofarvede med hvid underside. Kronen gul, 25-27mm. Bægertænderne penselagtigt hårede. 0-1500m. III-V.

P. fruticosa L. Buskløvehale. 100-150cm. Busk. Stængel og bæger ukirtlede. Nedre blade 3-9cm, utydeligt tofarvede. Kronen gul, 23-35mm. 0-1300m. IV-VI.

Lamium. Tvetand.

1. Flerårig ..... 2.
   Enårig 3.
2. Kronrøret ret ..... garganicum
   " krumt maculatum
3. Kronens overlæbe kløvet ..... bifidum
   " " hel 4.
4. Kronrøret krumt forneden. Kronen hvid ..... moschatum
   " ret. Kronen rød amplexicaule

Lamium garganicum L. Stribet tvetand. 5-50cm. Kronen 30-45mm, hvidlig, underlæben ofte rødstribet. 3 underarter:
ssp. garganicum: 30-50cm. Kransene med 6-10 blomster. Kronens overlæbe svagt udrandet. 0-1900m. V-VIII.
ssp. striatum (Sm.) Hayek: 30-40cm. Kransene med 8-15 blomster. Kronens overlæbe kløvet. 0-2100m. V-VIII.
ssp. pictum (Boiss.& Heldr.) Ball: 5-20cm. Kransene med 2-4 blomster. Kronens overlæbe udrandet eller oftere kløvet. 1900-2500m. VI-IX. TA,PR.

L. maculatum L. Plettet tvetand. 20-50cm. Bladene ofte blegplettede. Kronen 20-30mm, med et hvidligt rør og rød, ofte plettet underlæbe; ovelæben hel. 0-2100m. VI-VIII.

L. moschatum Miller Moskustvetand. 10-60cm. Kronen 16-25mm, underlæben med tydelige, trekantede sidelapper. Støttebladene ofte lyserødt eller hvidt plettede. 0-700m. IV-V.

L. bifidum Cyr. Kløvet tvetand. 10-40cm. Bladene uregelmæssigt indskårne. Bægertænderne kortere end røret. Kronen 20-25mm.2ssp:
ssp. bifidum: Nedre blade med hjærteformet til afskåret grund. Kronen hvid. Bægertænderne tydeligt kortere end røret. 0-1200m.
ssp. balcanicum Velen.: Nedre blade med afrundet grund. Kronen rød. Bægertænderne lidt kortere end røret. 1500-2200m. V-VII.

L. amplexicaule L. Liden tvetand. 0-1200m. I-V.

Ballota acetabulosa (L.) Bentham Gråfiltet skålbæger. 30-60cm. Bægeret skålformet, 15-20mm bredt, med bølget, jævn eller brodspidset , flertandet rand. Kronen 15-18mm, rødlilla og hvid. 0-800m. IV-VI.

B. pseudodictamnus (L.) Bentham Gulfiltet skålbæger. 30-50cm. Stænglen gulfiltet. Bægeret 7-8mm bredt, udbredt foroven, bredt buttandet. Hele planten tætfiltet. Bladene hen ad Martsviols. Kronen 14-15mm, hvid og rødplettet. 0-1200m. VI-VII.

Ballota nigra L. Tandbæger. 0-1300m. V-VIII. 2 underarter:
ssp. uncinata (Fiori & Bég.) Patzak: Bægertænderne udstående og krumme. Planten uden siddende kirtler.
ssp. foetida Hayek: Bægertænderne rette. Planten med siddende kirtler.

Stachys. Galtetand.

1. Enårig ..... 2.
   Flerårig 4.
2. Bægertænderne ca. ½ x røret ..... spinulosa
   " ca. = røret 3.
3. Kronen 6-8mm, kun lidt længere end bægeret ..... arvensis
   " 12-15mm, tydeligt " " " ocymastrum
4. Forbladene lig eller længere end bægerrøret ..... 5.
   " mangler eller er meget små 9.
5. Kronen bleggul ..... 6.
   " rød 7.
6. De blomstrende stængler sidestillede ..... alopecurus
   " " " endestillede obliqua
7. Kronens overlæbe kløvet ..... acutifolia
   " " hel eller udrandet 8.
8. De fleste blade med hjærteformet grund ..... germanica
   " " " " m.m. kileformet grund cretica
9. Kransene med 2 blomster ..... 10.
   " " 3-flere blomster 12.
10. Nedre og mellemste blade smalfligede. Gul krone angustifolia
    Bladene hele 11.
11. Kronen længere end bægeret, ofte noget lyserød swainsonii
    " ca. så lang som bægeret, hvid virgata
12. Kronen rød ..... 13.
    " gul 15.
13. Bladene over 1½ x så lange som brede ..... swainsonii
    " under 1½ x " " " " 14.
14. Bægertænderne (2-)4 x så lange som brede ..... candida
    " ¾-1½(-2) x så lange som brede 18.
15. Planten hvidfiltet ..... chrysantha
    " halvglat til håret 16.
16. Nedre og mellemste blade med hjærteformet grund canescens
    Bladene med m.m. kileformet grund 17.
17. De 2 øvre bægertænder = røret ..... parolinii
    Bægertænderne kortere end røret recta
18. Dværgbbusk med tornede grene ..... spinosa
    Ikke tornet flerårig urt spreitzenhoferi

S. germanica L. ssp. heldreichii (Boiss.) Hayek Filtet galtetand. 30-90cm. Bladene 3-9cm, m.m. aflange, med gråfiltet underside. Nedre kranse adskilte. 1200-2000m. VII-IX. TA,KY,KH.

S. cretica L. ssp. cretica Kilebladet galtetand. 20-80cm. Bladene aflangt ægformede, filtede, grågrønne ovenpå, grå eller hvide nedenunder. Bægertænderne ca. ½ x røret, lidt uens. 0-1500m.

S. acutifolia Bory & Chaub. (S. graeca) 15-70cm. M.m. uldhåret. Bladene ægformet-aflange. Kronen 18-25mm, lyserød, tæt hvidhåret. Underlæben hvid med lyserøde tegninger.

S. obliqua W.& K. 20-50cm. M.m. uldhåret. Bladene aflangt-lancetformede. Kronen ca. 15mm, tæthåret. V-VII.

S. canescens Bory & Chaub. (S. messenica) 10-30cm. M.m. opret. Bladene 15-50x8-30mm, rundtakkede og hårede. Kransene i et tæt aks. Kronen 15-20mm, dunet.

S. recta L. Bleggul galtetand. 10-40cm. Bladene 10-50x1-20mm, helrandede til tandede. Forbladene trådformede, uanselige. Kronen 12-20mm, dunet. Kransene med 6-16 blomster. VII-IX.

Stachys parolinii Vis. 20-40cm. Stængelhårene stærkt nedadrettede. Bladene 20-40x7-20mm, lancetformede til elliptiske. Kransene med 4-6 blomster. Bægeret 9-10mm.

S. angustifolia Bieb. 30-60cm. Glat og opret med forveddet grund. Øvre blade udelte og linjeformede. Kronen 12-16mm, gul med lyserødt skær. VI-VII.

S. virgata Bory & Chaub. 60-90cm. Opret, tiltrykt håret. Bladene ca. 25x5mm, linjeformede, de nedre butte, de øvre spidse, helrandede. Bæger og krone ca. 10mm, silkehårede.

S. spinosa L. Tornet galtetand. 10-30cm. Lille, tornet kugle-busk. Bladene 10-35x3-8mm, affaldende, tæt silkeuldne. Kronen ca. 15mm, blegrød, silkehåret. 0-850m. V-VII.

S. swainsonii Bentham 10-20cm. Liggende til opret. Bladene 10-30 x 5-18mm, med kileformet grund, oftest tydeligt netårede. Kronen 14-18mm, hvid eller blegrød med lyserøde tegninger. 2 underarter: ssp. argolica (Boiss.) Phitos & Damboldt: Kransene med 4-10 blomster. Planten grøn eller gulgrøn. Argolis, Hydra. IV-V.
ssp. melangavica Persson: Kransene med 2 blomster. Planten grågrøn. IV-V.

S. chrysantha Boiss.& Heldr. 10-20cm. Liggende til opstigende. Bladene 10-25x8-15mm, ægformet-rundagtige, svagt rundtakkede. Kronen 12-14mm, filtet. Kransene med 4-6 blomster. Lakonien.

S. candida Bory & Chaub. Som den foregående, men kronen hvid med rødlilla pletter. TA.

S. spreitzenhoferi Heldr. Som chrysantha, men kronen hvid med lyserøde prikker. 2 underarter:
ssp. spreitzenhoferi: Hvidfiltet. Kythæra, omkring Neapoli.
ssp. virella D.Persson: Grøn eller grågrøn. Monemvasia-borgen på SØ-halvøen. V-VI.

S. ocymastrum (L.) Briq. Håret galtetand. 20-50cm. Opret og udstående håret. Bladene aflangt til bredt ægformede. 4-6-blomstrede kranse. Kronen 12-13mm. Overlæben kløvet. 0-800m. III-VI.

S. spinulosa Sm. 10-60cm. Stivhåret og kirteldunet med ægformede blade. Bægeret 9-11mm. Kronen 20-22mm, hvid eller bleggul med røde prikker, kirteldunet. 0-550m. IV-VI.

S. arvensis (L.) L. Agergaltetand. 0-600m. IV-V.

S. alopecuros (L.) Bentham Rævehalegaltetand. 15-70cm. Med grundroset. Grundbladene trekantet-hjærteformede, 3-10x3-8cm.1-2 par stængelblade. Tæt aks på 1-7cm. 1300-2500m.VI-VIII. OL,KY,KH.

Nepeta. Katteurt. Overlæben flad og noget tvedelt. Underlæben ofte indadhvælvet og bugtet-rundtakket. Ofte rynkede blade.

1. Forbladene $\frac{1}{2}$ x bægeret. Stænglen med lillat anstrøg ... nuda
" mindst lig bægeret. Stænglen uden lillat anstrøg 2.
2. Kronen blå ..... scordotis
" hvid med røde prikker 3.
3. Stænglen foroven med opad tiltrykte hår ..... argolica
" " " udstående eller nedadrettede hår 4.
4. Nedre yderste forblade 6-10x0,8-1,5mm ..... parnassica
" " " $3\frac{1}{2}$-7x0,4-0,6mm 5.
5. Bægeret 7-8mm, tænderne 2/3 x røret ..... orphanidea
" 5-$6\frac{1}{2}$mm, " 1/2 x " camphorata

Nepeta scordotis L. 25-60cm. Støttebladene 10-13x7-13mm, spidse og bredt ægformede. Bægertænderne næsten = røret. Kronen 13-16mm. Bladene 3-6cm, æg-hjærteformede. 0-400m. III-V.

N. argolica Bory & Chaub. ssp. argolica (N. sibthorpii) 40-80cm. Stængelhårene mest tiltrykte. Forbladene 6-9x1-2mm. Stænglen ikke kirtlet. 0-1800m. V-IX. KY,KH.

Nepeta parnassica Heldr.& Sart. 30-60cm. Stænglen klæbrig, med udstående hår på ½-1mm. Bladene kirtel-filtede til -lådne. Bægeret 6½-8mm, tænderne ca. = røret. 1600-2200m. V-IX. KH.

N. camphorata Boiss.& Heldr. 15-60cm. 4-10 adskilte kranse. Nedre kranse tydeligt stilkede. Nedre yderste forblade 3½-5mm. Kronen mørkprikket. 1500-2200m. VI-IX. TA.

N. orphanidea Boiss. 20-60cm. Stænglerne med udstående hår på ¾-1mm. Nedre yderste forblade 4-7½mm. 1500-1650m. VI-VIII. PR.

N. nuda L. Glat katteurt. 20-90cm. Stænglen tiltrykt dunet til halvglat. Blomsterstanden grenet. Bægeret ofte lillaanløbent. Kronen blå til lilla, 6-10mm. 300-2100m. VI-IX. KY,KH.

Glechoma hirsuta W.& K. Håret korsknap. 10-50cm. Ligner vor hjemlige Korsknap, men ofte større og tættere håret. 0-1000m. III-VI.

Prunella vulgaris L. Alm. brunelle. 200-2100m. IV-X.

P. laciniata (L.) L. Hvid brunelle. 5-30cm. Kronen gullighvid. I det mindste de øvre blade fjerfligede. 300-1200m. IV-VIII.

Melissa officinalis L. ssp. altissima (Sm.) Arc. (M. romana) Høj hjærtensfryd. 40-150cm. Stinkende. Bladene med grå- eller hvidfiltet underside. Frugtbægerets øvre midtertand utydelig. VI-VIII.

Ziziphora capitata L. Hovedflaskebæger. 5-20cm. Enårig med m.m. lancetformede blade på 5-30mm. Halvskærmformet endestillede hoveder med svagt tolæbede, lyserøde blomster på 10-15mm. Bægeret 6-11 mm, krumt og lidt buget, tolæbet. 0-800m. V-VIII.

Satureja og Micromeria. Fællesnøgle.

1. Kransene med 20-40 blomster ..... S. thymbra
   " " 2-20 " 2.
2. Kronen hvid (evt. med lyserødt skær) ..... S. parnassica
   " rød 3.
3. Bægertænderne ca. så lange som brede ..... M. taygetea
   " meget længere end brede 4.
4. Blomsterne siddende ..... 5.
   " stilkede 6.
5. Stænglen udstående ruhåret. Kvasten 1-2mm stilket M. juliana
   " nedadrettet dunet. " siddende M. myrtifolia
6. Støttebladene ægformede, m.m. lig bladene ..... M. nervosa
   " smalle, ulig bladene M. graeca

Satureja thymbra L. Rødstænglet bønneurt. 20-35cm. Stærktgrenet, ofte grådunet dværgbusk med rødlige stængler. Bladene 7-12x2-9mm. Talrige forblade af bægerets længde. Rød krone. 0-1650m. IV-VII.

S. parnassica Heldr.& Sart. ssp. parnassica 5-10cm. Lav, tæt, stærktgrenet busk med vreden grund. Bladene 5-10x2-5mm, kølede og kirtelprikkede. Støvdragerne noget udragende. 1800-2400m. VII-IX.

Micromeria taygetea P.H.Davis 4-15cm. Bladene 5-10x3-6mm, ægformede og butte, kirtelprikkede. Bægertænderne bredt trekantede, 1/3 x røret. 1500-1900m. VII-IX. TA.

M. nervosa (Desf.) Bentham Ægbladet murtråd. 10-40cm. Bladene 7-10x4-5mm, m.m. ægformede. Bægeret udstående håret.0-950m.III-V.

M. juliana L. Aksmurtråd. 10-40cm. Bladene 3-8x1-2½mm, de nedre smalt ægformede, de øvre og mellemste linjeformede. Klasen mest 5-10cm. Bægertænderne 2/5-1/2 x røret. 0-1900m. V-VII.

M. myrtifolia Boiss.& Hohen. 10-40cm. Nedre blade ægformede, øvre aflangt-lancetformede. Klasen mest 10-20cm. Bægertænderne 1/5-1/4 x røret. 0-400m. V-VII.

M. graeca (L.) Bentham Alm. murtråd. 20-30cm. Nedre blade ægformede, øvre m.m. smalt lancetformede. Kronen 6-8mm (4-6mm hos de andre arter). 0-1200m. V-VI.

Acinos. Voldtimian. Lilla blomst.

1. Flerårig med forveddet grund ..... 2.
   Enårig 3.
2. Bladene 1,2-1,5 x så lange som brede ..... alpinus
   " mest 2-3 x " " " " suaveolens
3. Bladene ca. 2 x så lange som brede ..... arvensis
   " 1,1-1,5 x så lange som brede rotundifolius

Acinos alpinus (L.) Moench Alpevoldtimian. 5-45cm. Bladene 6-20x4-16mm. Kronen 8-18mm. Bægeret 5-8mm. V-VIII. 2 underarter:
ssp. majoranifolius (Miller) Ball: Stængelhårene ½-1mm. Kronen 12-18mm. Bægeret med udstående hår på ½-1mm. 500-1700m.
ssp. meridionalis (Nyman) Ball: Stængelhårene ¼-½mm. Kronen 8-12 mm. Bægeret med fremadrettet-krusede hår på 0,2-0,7mm. 1500m-

A. suaveolens (Sm.) Loudon Citronvoldtimian. 10-30cm. Citronduftende. Bladene 10-20x3-7mm, med smalt kileformet grund. 0-1200m. V-VI.

A. arvensis (Lam.) Dandy Voldtimian. 0-1300m. IV-VI.

A. rotundifolius Pers. (A. graveolens) Rundbladet voldtimian. 3-30cm. Bladene 7-10mm, med stærkt fremtrædende ribber på undersiden, m.m. tydeligt takkede fortil, pludseligt tilspidsede.

Calamintha grandiflora (L.) Moench Bøgemynte. 20-60cm. Bladene ægformede og savtakkede, 3-5x2-4cm. Ensidige, 1-5-blomstrede kranse med lyserøde blomster på 25-40mm. 500-1700m. VII-VIII.

C. nepeta (L.) Savi Grå bjærgmynte. 20-40cm. Bladene bredt ægformede med 5-9 par tænderBlomsterne i åbne kvaste med 10-20 hvide til lyslilla blomster på 10-15mm. 0-1500m. V-X.

Clinopodium vulgare L. ssp. arundanum (Boiss.) Nyman Kransbørste. 300-2200m. VI-VIII.

Origanum. Merian.

1. Kronen hvid (sj. med lyserødt skær). Bægeret ikke tolæbet 2.
   " rød 3.
2. Bægeret regelmæssigt femtandet ..... vulgare
   " 1-læbet, m.m. helrandet onites
3. Bladene med hjærteformet grund ..... scabrum
   " " afrundet grund lirium

Origanum vulgare L. Merian. 0-1500m. VI-IX. 2 underarter:
ssp. hirtum (Link) Ietswaart (O. heracleoticum): Blade og bægre tæt og iøjnefaldende kirtelprikkede.
ssp. viridulum (Martin-Donos) Nyman: Ikke kirtelprikket.

O. onites L. Skærmmerian. 30-60cm. Stænglen vortet og håret. Kirtelprikkede blade. Aksene meget tætte, samlede i en tæt halvskærm. Kronen 4-5½mm. 0-850m. IV-VII.

O. scabrum Boiss.& Heldr. 10-30cm. Bladene ægformede, ofte rukantede. Blomsterne ofte i et enkelt, ægformet, nikkende hovede. Støttebladene 7-8mm brede og glatte. Kronen 7-14mm. TA,PR. 1000-1900m. VI-VIII. Nikkende merian.

O. lirium Heldr. -40cm. Aksene nikkende. Støttebladene 3mm brede og hårede. TA. (= O. scabrum x O. vulgare ssp. hirtum).

Thymus. Timian.

1. Bladene kølede, med noget trekantet tværsnit .... capitatus
   Bladtværsnittet ikke trekantet 2.
2. Bladranden omrullet, ihvertfald på bladknippernes blade, eller bladene med en fortykket, halvt omrullet rand 3.
   Bladranden flad, ikke omrullet 6.
3. Bladene over 3mm brede, æg- til rudeformede ..... 4.
   " under 3mm " , smalle 5.

4. Mest med lange udløbere. Endestillede klaser oftest m.m. hovedformede, ½-1½cm (sj. til 7cm) ..... rechingeri
Aldrig med lange udløbere. Endestillede klaser forlængede, 6-10cm lange teucrioides
5. Bladene tæt lådne med enkelte længere hår ..... leucotrichus
" ensartet hårede parnassicus
6. Stænglen kun håret på kanterne ..... pulegioides
" trindt eller tvesidet håret 7.
7. Støttebladene ulig bladene, mindst 2 x så brede ... striatus
" m.m. lig bladene longicaulis

Thymus capitatus (L.) Hoffm.& Lk. (Coridothymus c.) Hovedtimian. 20-50cm. Dværgbusk med grenede stængler. Bladene nåleformede, 6-10mm. Ægformede hoveder med tæt taglagte støtteblade. Bægerrøret med flad ryg. 0-600m. V-VI.

T. teucrioides Boiss.& Spr. Bladene finttandede fortil, med afskåret til bredt kileformet grund. 500-1700m. VI-VII.

T. rechingeri Hartvig ssp. rechingeri Som den foregående. 1800-2400m. VII-VIII. KH (Styx-kløften).

T. leucotrichus Hal. Mellemste stængelblade 7-15x0,8-2mm. Støttebladene ofte lilla, ihvertfald mod grunden. TA,PR,ME,OL,KY,KH.

T. parnassicus Hal. Støttebladene ulig bladene, ofte grønlige. 1300-2200m. VII-IX.

T. striatus Vahl Nåletimian. Blomstrende skud indtil 12cm. Golde skud med knipper af m.m. kødede blade. Mellemste blade med få, blege kirtelprikker. 500-2000m. V-VIII. ME,ER.

T. longicaulis C.Presl ssp. chaubardii (Boiss.& Heldr.) Jalas Tæppedannende. Blomstrende skud 3-10cm, med små bladknipper nederst. Stængelbladene 5-13x1½-4½mm. VI-VIII.

T. pulegioides L. Bredbladet timian. -1800m.

Lycopus europaeus L. Sværteveld. 0-1100m. VI-IX.

Mentha. Mynte.

1. Bægertænderne tydeligt uens ..... pulegium
" nogenlunde ens 2.
2. Bladene tydeligt stilkede. Akset 12-20mm bredt .... aquatica
" siddende. Akset 5-15mm bredt 3.
3. Bladene højst 4½cm; undersiden med mange grenede hår ..... 4.
" 5-9cm; undersiden med 0-få grenhår 5.
4. Bladene 2-4cm brede og butte ..... suaveolens
" ½-2cm " , mest spidse microphylla
5. Bladene bredest nær midten, uden grenhår ..... longifolia
" " forneden, mest med nogle grenhår spicata

Mentha pulegium L. Polejmynte. 15-60cm. Liggende til opstigende. Bladene oftest smalt elliptiske, 12-20mm, med 0-6 tandpar. Mange kranse i bladhjørnerne. Kronen 4½-6mm. 0-1200m. V-IX.

M. aquatica L. Vandmynte. 0-1200m. VI-X.

M. suaveolens Ehrh. Rundbladet mynte. 40-100cm. Bladene stærkt rynkede, bredest nær grunden, m.m. grå-hviduldne nedenunder, ofte savtakkede. 0-1500m. V-X.

M. longifolia (L.) Hudson Grå mynte. 50-100cm. Bladene 5-9x2-4 cm, oftest udstående tandede. Frugtbægeret noget indsnøret.VI-XI.

M. microphylla Koch (M. spicata ssp. condensata) Småbladet mynte. 20-50cm. Bladene 1-4½x½-2cm, lancetformede, savtakkede, bølgede og filtede på begge sider. 0-1800m. VI-X.

M. spicata L. Grøn mynte. 0-1200m. VI-X.

Rosmarinus officinalis L. Rosmarin. 30-120cm. Busk med gråbrun bark, liggende til opstigende. Bladene 15-28mm, linjeformede med

omrullet rand. Blomsterne lyseblå, 10-12mm. Underlæben med skeformet midterflig. 0-550m. IV-VI.

Lavandula stoechas L. ssp. stoechas Toplavendel. 30-120cm. Opret busk. Bladene 1-2cm, linje-lancetformede, helrandede. Tætte, 2-3cm lange, endestillede, ægformede aks med 2-3 lilla, kronbladsagtige højblade i toppen. Kronen 6-8mm, mørklilla.III-VII.

Salvia. Salvie.

1. Buske: stænglerne m.m. forveddede ..... 2.
   Stænglerne urteagtige 5.
2. Frugtbægeret forøget. Støttebl. længere end bægeret pomifera
   " ej " . Støttebladet kortere end bægeret 3.
3. Stænglen tiltrykt filtet. Bægeret 5-8mm ..... triloba
   " udstående håret til filtet. Bægeret 10-15mm 4.
4. Bladgrunden m.m. kileformet ..... officinalis
   " afrundet eller hjærteformet grandiflora
5. Bladene fjersnitdelte med finttakkede småblade .... ringens
   " ikke fjersnitdelte (eller endesmåbladet indskåret) 6.
6. Kransene med (8-)15-30 blomster ..... verticillata
   " " 2-10 blomster 7.
7. Bægerets overlæbe flad i frugt ..... 8.
   " " konkavt-tvefuret i frugt 10.
8. Enårig. Klasen med en dusk af højblade øverst ..... viridis
   2-flerårig 9.
9. Støttebladene længere end kronen ..... sclarea
   " kortere " " argentea
10. Bægerets hår 1-1½mm lange, hvide og ukirtlede .. verbenaca
    Bægeret anderledes behåret 11.
11. Kronen 11-20mm. Med forlængede topgrene ..... virgata
    " 20-30mm. Toppen kortgrenet pratensis

Salvia officinalis L. Lægesalvie. 20-40cm. Bladene ca. 6cm, rynkede, lancetformede, med hviddunet underside. Kransene m.m. ensidige. Bægeret rustfarvet. Kronen -35cm. 0-300m. III-V.

S. grandiflora Etlinger -100cm. Bladene 8-12cm eller mere, æg-lancetformede, spidse. Bægeret ofte rødlillat. Kronen indtil 35mm. Bægeret klæbrigt.

S. triloba L.f. (S. fruticosa) Trelappet salvie. Stænglerne hvidfiltede. Bladene ægformede, 7-9cm, rynkede, ofte med 2 små sidelapper forneden. Kronen 16-25mm. 0-1000m. V-VI.

S. ringens Sm. -60cm. Bladene rynkede med ægformet endeafsnit. Kransene med 2-4 blomster. Bægeret 10-17mm, tæt kirteldunet. Kronen indtil 40mm, blålilla eller blå. 500-1300m.

S. pomifera L. 50-100cm. Hvidgrå busk. Smalt ægformede blade. Kronen 25-35mm, blålilla. 100-1350m. V-VI.Bægersalvie.

S. sclarea L. Harpikssalvie. 50-110cm. Mest toårig. Bladene bredt ægformede med hjærteformet grund. Støttebladene 2-3cm, hindeagtige, rødlilla eller hvidlige. 0-900m. VI-VII.

S. argentea L. Sølvsalvie. 30-80cm. Kirtlet. Bladene indtil 9x6cm, rundtakkede eller lappede, tæt uldhårede. Kronen 15-35mm, hvid. 0-1400m. VI-VII.

S. pratensis L. Engsalvie. 30-50cm. Grundbladene 6-9x3-4cm, ægformede med 4-6 halvstore tænder/lapper, desuden rundtakkede. Kronen blålilla. Bægeret 7-11mm. 0-1600m. V-VIII.

S. verbenaca L. Jærnurtssalvie. 20-50cm. Nedre blade elliptiske, med 3-4 par m.m. dybe lapper. Kransene med 6-10 blå eller lilla blomster på 6-10mm. 0-1400m. III-V.
ssp. multifida (Sm.) har grundbladene næsten helt delte i det mindste ved grunden.

Salvia virgata Jacq. Rissalvie. 30-50cm. Bladene ægformede, med 4-6 par lave lapper. Støttebladene grønne. 0-1000m. VI-VIII.

S. viridis L. Blåtoppet salvie. 20-50cm. Bladene regelmæssigt rundtakkede. Kronen 14-18mm, lyserød eller lyslilla. Klasen ofte med en top af lilla eller grønne højblade øverst. 0-1000m. IV-V.

S. verticillata L. Kranssalvie. 30-80cm. Bladene ægformet-trekantede med hjærteformet eller afskåret grund, grofttandede, undertiden med 1-2 par små lapper nederst. Nikkende blomster. VI-IX.

SOLANACEAE

1. Støvdragerne sammenbøjede ..... Solanum
" adskilte 2.
2. Blomsterne i toppe eller klaser ..... 3.
" enlige eller i små nøgler 5.
3. Bladene tandede til indskårne ..... Hyoscyamus
" helrandede 4.
4. Bægeret 4-7mm. Frugten et bær ..... Cestrum
" 8-20mm. " en kapsel Nicotiana
5. Busk, ofte tornet ..... Lycium
Urter 6.
6. Stængelløs rosetplante ..... Mandragora
Med bladet stængel 7.
7. Enårig. Frugten en kapsel. Kronen 5-10cm, tragtformet Datura
Flerårig. Frugten et bær 8.
8. Bægeret omvokser bærret som en slags kapsel ..... Physalis
" " ikke bærret Atropa

Lycium europaeum L. Europæisk bukketorn. 1-4m. Stærkt tornet med stive grene. Bladene 2-5cm, bredest over midten. 0-800m. IV-IX.

Atropa belladonna L. Galnebær. ½-2m. Bladene 10-15x5-9cm. Kronen 2½-3cm, klokkeformet, brunlilla eller grønlig. Frugten et sort bær på 1½-2cm. 0-1400m. VI-IX.

Hyoscyamus albus L. Hvid bulmeurt. 30-50cm. Kronen gullighvid uden årer. Stilkede stængelblade. 0-800m. III-V.

H. aureus L. Gul bulmeurt. Kronen gyldengul med sortlillat svælg. Stilkede stængelblade. 0-350m. II-IV.

Physalis alkekengi L. Jødekirsebær. 0-1000m. V-VII.

Solanum nigrum L. ssp. nigrum Sort natskygge. 0-900m. III-XI.

S. dulcamara L. Bittersød natskygge. 0-1100m. IV-VII.

S. elaeagnifolium Cav. Sølvbladsnatskygge. 40-100cm. Flerårig urt eller dværgbusk. Ofte med små, mest rødlige torne på stængler, blade og bægre. Bladene lancetformede, 6-8cm, m.m. helrandede. Lilla krone. Bærret gulbrunt, 8-10mm, kugleformet. VII-VIII. Forv.

Mandragora autumnalis Bertol. Alrune. Bladene 10-30cm lange, let bølgede, omvendt lancetformede. Korte stilkede kvaste af lyslilla, 2-2½cm lange blomster fra rosettens midte. Bærret ellipsoidisk, gult til orange. 0-1100m. IX-XI (III-IV).

Datura stramonium L. Pigæble. 0-900m. VII-X.

Cestrum parqui L'Hér. Kapunbusk. 1-3m. Busk. Bladene lancetformede, 3-14x1-4cm. Blomsterne gule eller gulgrønne med et kronrør på 15-20mm og kronflige på 3-6mm. Et aflangt, sortagtigt bær på 7-10 mm. IV-VII. Dyrket og forvildet.

Nicotiana glauca Graham Grågrøn tobak. 1-3m. Glat busk eller lille træ. Bladene 5-25cm, lancet- til æg-rudeformede, grågrønne. Kronen gul, 3-4cm, rørformet med en kortlappet krave. V-VIII.Forv.

SCROPHULARIACEAE

1. Kronen m.m. hjulformet, med kort kronrør, næsten regelm. 2.
" ikke " 3.

2. 2 støvdragere. Kronen 4-tallig, mest blå ..... Veronica
   4-5 støvdragere. Kronen 5-tallig, gul Verbascum
3. Kronrøret med en pukkel eller spore ved grunden ..... 4.
   " uden " " " " " " 9.
4. Kronrøret ikke lukket af en pukkel ..... Chaenorhinum
   " m.m. " " " " 5.
5. Kronrøret med en but pukkel ved grunden ..... 6.
   " " " spids spore " " 7.
6. Enårig. Bægerfligene længere end kronrøret ..... Misopates
   Flerårig. " kortere " " Antirrhinum
7. Bladene smalle, m.m. siddende ..... Linaria
   " brede og stilkede 8.
8. Bladene lappede, stilken længere end pladen .... Cymbalaria
   " ej " , " kortere " " Kickxia
9. Bægeret med 4 tydelige og m.m. ens tænder ..... 10.
   " 5-tandet 14.
10. Bægerrøret sammentrykt, skiveformet opblæst ... Rhinanthus
    " ikke skiveformet opblæst 11.
11. Blomsterne i ensidige aks ..... Odontites
    " ikke i ensidige aks 12.
12. Kronens overlæbe med 2 skråt oprette lapper .... Euphrasia
    " " hel eller udrandet 13.
13. Bægeret rørformet. Kronen rød eller gul .... Parentucellia
    " klokkeformet. Kronen hvid/lyserød Bellardia
14. Kronen med hvælvet overlæbe ..... Pedicularis
    " uden " " 15.
15. Kronrøret kort og m.m. kugleformet ..... Scrophularia
    " rør- til tragtformet Digitalis

Verbascum. Kongelys.

1. Planten stængelløs (stænglen højst 3cm) ..... acaule
   Stænglen mindst 10cm 2.
2. Hvert støtteblad med 1 blomst ..... 3.
   " " " 2-7 blomster 6.
3. Blomsterstilken kortere end støttebladet. Enårig orientale
   " mest længere end støttebladet. 2-flerårig 4.
4. Støttebladene tandede ..... daenzeri
   " helrandede 5.
5. 10-25cm høj. 4 støvdragere. Støttebladene 3-5mm cylleneum
   30-120cm høj. 5 " " 7-8mm blattaria
6. Nedre støvknapper nedløbende eller skævt påsatte ..... 7.
   " " nyreformede 11.
7. Klasens akse tydeligt kirtlet ..... epixanthinum
   " " m.m. ukirtlet 8.
8. Øvre stængelblade tydeligt nedløbende ..... 9.
   " " næppe nedløbende 10.
9. Behåringen meget tæt, hård og ru ..... macrurum
   " noget spredt, ofte fnugget, blød, jævn densiflorum
10. Klasen grenet ..... samniticum
    " ugrenet guicciardii
11. Støvtrådene med rødlilla hår ..... 12.
    " " hvide eller gule hår 14.
12. Klasens akse tætkirtlet ..... epixanthinum
    " " ikke kirtlet 13.
13. Grundbladene 1/3-2/3 lappede ..... sinuatum
    " helrandede mallophorum
14. Grundbladene ca. 85% delte ..... pinnatifidum
    " højst 60% delte 15.
15. Bægeret 6-12mm. Længste blomsterstilke 1-3mm ... undulatum
    " 3-7mm. Klasen grenet 16.
16. Blomsterstilken længere end bægeret ..... speciosum
    " kortere end eller lig bægeret graecum

Verbascum blattaria L. Klasekongelys. Toårig. Glat forneden, kirtlet foroven. Grundbladene bugtede til fligede. Bægeret 5-8 mm. 3 øvre støvtråde med hvide og rødlilla hår. 0-800m.V-VIII.

Verbascum daenzeri (Fauché & Chaub.) Ktze. 50-150cm. Toårig. Grundbladene med 4-10 par spidse lapper. Klasen spredt kirteldunet. Blomsterstilkene 15-30mm. 4 støvdragere.

V. cylleneum (Boiss.& Heldr.) Ktze. 10-25cm. Grundbladene 2-5 x ½-2cm, uregelmæssigt tandede, ofte glatte ovenpå. Ingen stængelblade, men kun korte klaser fra rosetten. 1800-2350m. VI-VIII. KY (skrænterne af Megali Ziria, mest på NØ-siden).

V. acaule (Bory & Chaub.) Ktze. Dværgkongelys. Rosetplante med blomsterne direkte fra midten eller på en højst 3cm lang klasestilk. 1900-2400m. VI-VII. TA,KH.

V. orientale (L.) All. Enårigt kongelys. 15-70cm. Kirteldunet foroven. Grundbladene groft rundtakkede til fligede. Kronen med nogle få brune pletter. 4 støvdragere. IV-VI.

V. densiflorum Bertol. Storblomstret kongelys. 0-1900m. VI-VIII.

V. samniticum Ten. Riskongelys. 60-150cm. Spredt filtet, ofte m.m. halvglat toårig. Grundbladene rynkede, grønlige ovenpå, gråfiltede nedenunder. 800-1800m. VII-VIII.

V. guicciardii Heldr. Nær foregående. Grundbladenes stilke 4-7 cm. Længere blomsterstilke 2-4mm (4-6mm hos samn.). Nedre støvknapper kun kort nedløbende.

V. macrurum Ten. Langhalet kongelys. 50-150cm. Hvidgult filtet toårig. Grundbladene næsten helrandede, 25-40x8-20cm. Klasen mest ugrenet. 0-1000m. VI-VIII.

V. epixanthinum Boiss.& Heldr. 20-150cm. Stænglen tæt kirteldunet og filtet. Grundbladene 10-20x3-8cm, med kileformet grund og en stilk på 2-12cm. 750-2300m. VI-VIII. TA,KY,KH,ER.

V. speciosum Schrader ssp. megaphlomos (Boiss.& Heldr.) Nyman Kandelaberkongelys. 50-200cm. Varigt gul- til gråfiltet toårig. Grundbladene 12-40x3-10cm, helrandede. 600-1800m. VI-VIII.

V. undulatum Lam. Bølget kongelys. 30-120cm. Grundbladene 8-18 x 5-8cm, m.m. hele til fligede, bølgede; stilken 3-7cm. Klasen meget åben, ugrenet eller svagt grenet.

V. sinuatum L. Bugtet kongelys. 50-100cm. Tætfiltet toårig med kirtlet klase. Grundbladene 15-35x6-15cm. Toppen grenet og åben. Støttebladene 3-8mm. Bægeret 2-4mm. 0-800m. V-VIII.

V. pinnatifidum Vahl Strandkongelys. 30-50cm. Toårig. Grenet fra nær grunden i mange, ugrenede klaser. Grundbladene med hele til fligede afsnit. V-VIII.

V. graecum Heldr.& Sart. 80-150cm. Grundbladene 7-30x3-10cm, grå/hvid-filtede på begge sider eller halvglatte ovenpå som ældre. Mangegrenet, åben top. Støtteblade 2-4mm. 0-1300m. V-VIII.

V. mallophorum Boiss.& Heldr. 50-150cm. Grundbladene 15-45x5-15 cm, stilken 0-4cm. Planten varigt hvidfiltet forneden, fnugget og halvglat foroven. Toppen grenet og ret tæt. 400-2000m. VI-VIII.

Scrophularia. Brunrod.

1. Enårig. Bladene uregelmæssigt savtakkede ..... peregrina
   2-flerårig 2.
2. Flere opstigende stængler. Bladene mest fligede ..... 3.
   Stænglen opret, mest enlig 6.
3. Kronen 2½-5mm. Støvdragerne tydeligt udragende ..... canina
   " 4-12mm. " mest ikke " 4.
4. Bladene mørkegrønne, m.m. kødede ..... 5.
   " lysegrønne, tynde, ikke kødede laciniata
5. Stængler og blade glatte (topaksen kirtlet) ... heterophylla
   " " " kirtlede taygetea
6. Bladene 1-2 x delte ..... 7.
   " hele 8.

7. Flerstænglet. Bladfligene smalle ..... myriophylla
   Mest 1-stænglet. Bladfligene ægformede til aflange lucida
8. Bladene dunede, i det mindste på ribberne ..... scopolii
   " glatte 9.
9. Stænglen kantet (eller svagt vingekantet) ..... nodosa
   " bredt (½-1mm) vingekantet umbrosa

Scrophularia peregrina L. Skarptakket brunrod. 15-90cm. M.m. glat. Øvre blade spredte. Støttebladene mest bladgtige. Kronen 6-9mm, mørkerød til brunlilla. 0-900m. V-VII.

S. scopolii Hoppe Alpebrunrod. 50-120cm. Bladene dobbelt savtakkede. Kronen 8-12mm, gulgrøn med brunlilla overlæbe. Støttebladene små. 0-2000m. V-VII. TA,PR,KH.

S. nodosa L. Knoldet brunrod. 0-1800m. VI-IX.

S. umbrosa Dumort Vandbrunrod. 0-800m. VI-IX.

S. lucida L. Skinnende brunrod. 20-50cm. Nedre blade 7-15x2-5 cm. Stængelbladene jævnt mindre opad. Kvastene med (1-)3-15 brunlige blomster på 4-9mm. 0-2100m. V-VII. TA,PR,KH,ER.

S. myriophylla Boiss.& Heldr. -60cm. Bladene 4-7x2-3½cm, samlede ved stængelgrundene, 2 x fligede med ofte meget små, spidse flige. Kvastene med 1-3(-5) blomster. 1800-2300m. TA,KY,KH,ER.

S. laciniata W.& K. 10-35cm. Bladene mest 1-2 x fligede. Kvastene med 1-3(-7) blomster forneden, 1 blomst foroven. Kronen 5-9mm, røret gulligt, øvre lapper brunlilla. 300-2500m. VI-IX.

S. heterophylla Willd Forskelligbladet brunrod. Som foregående, men bladtænderne mest butte (spidse hos lac.). Toppen mest tæt og mangeblomstret. Nedre kvaste med 3-flere blomster. IV-VI.

S. taygetea Boiss. (S. heterophylla var. t.) En form af foregående. TA,ME,OL.

S. canina L. ssp. bicolor (Sm.) Greuter Fliget brunrod. 15-100 cm. Nedre blade modsatte, 1-2 x fligede, øvre ofte spredte. Kronen brunlilla, øvre flige tydeligt lyskantede. 0-1950m.

Antirrhinum majus L. Haveløvemund. 50-100cm. Kronen rød, 3-4½ cm. Bladene ca. 4-6 x så lange som brede. Planten glat med kirteldunet klase. V-IX. Forvildet.

Misopates orontium (L.) Rafin. Agerløvemund. 20-50cm. Bladene 2-5cm x 2-7mm, modsatte forneden, ofte spredte foroven. Kronen 10-15mm, mest lyserød. Linjeformede bægerflige. 0-1000m. V-IX.

Chaenorhinum minus (L.) Lange Liden torskemund. Grundbladene mest ikke i roset. Sporen but, m.m. valseformet. 0-1200m. IV-X.

C. rubrifolium (DC.) Fourr. Rødbladet torskemund. 10-20cm. Nedre blade med rød underside. Grundbladene mest i roset. Sporen spids, jævnt tilsmalnende. 0-400m. IV-IX.

Linaria. Torskemund.

1. Kronen 2½-9mm. Sporen højst 3½mm ..... 2.
   " 12-37mm. Sporen 6-11mm 3.
2. Kronen 5-9mm, gul. Sporen 2-3½mm ..... simplex
   " 2½-5mm, lilla. Sporen højst 1mm micrantha
3. Kronen med orange pukkel, mest hvid, 20-30mm .... triphylla
   Kronens pukkel ikke orange 4.
4. Kronen mørkt blålilla med hvidlig pukkel ..... pelisseriana
   " lysere 5.
5. Kronen hvid. Helt glat enårig ..... chalepensis
   " gul 6.
6. Kronen 27-37mm. Planten helt glat ..... dalmatica
   " 13-20mm. Klasen mest kirtlet 7.
7. Frugtstilkene ½-1mm. Flerårig ..... peloponnesiaca
   " 3-15mm, oprette. Enårig tenuis

Linaria triphylla (L.) Miller Trebladet torskemund. 10-45cm. Glat og blågrøn enårig. Bladene elliptiske, mest i kranse på 3. Sporen 8-11mm, lilla. 0-300m. II-IV.

L. dalmatica (L.) Miller Musetornstorskemund. 30-100cm. Flerårig. Bladene indtil 30-35x15-20mm, tilspidset ægformede og stive. 0-2100m. VI-IX.

L. peloponnesiaca Boiss.& Heldr. 10-70cm. Bladene linjeformede, 2-6cm x 1-2mm, spidse og glatte. Klasen 3-10cm, tæt i blomst og frugt. Bægertænderne m.m. tydeligt hindekantede. TA,PR,ME,KY,KH.

L. tenuis (Viv.) Sprengel Bladene 15-35x1-2½mm, butte, mest spredte. Klasen med 10-20 blomster, meget åben i frugt. Kronen 13-15mm. Sporen 6-7mm. Sandede marker. fV-sVI. Elafonisos, nær Neapolis. (L. hellenica Turrill).

L. chalepensis (L.) Miller Hvid torskemund. 15-40cm. Bladene 18-35x1-2mm. Klaserne løse. Kronen 12-16mm, med en krum spore på 8-11mm. Frøene stærkt rynkede. 0-1000m. IV-V.

L. pelisseriana (L.) Miller Hedetorskemund. 15-50cm. Glat, blågrøn enårig. Bladene linjeformede, i krans forneden. Kronen 17-20 mm, med forlænget overlæbe. Sporen 7-9mm. 0-1000m. III-VI.

L. simplex (Willd.) DC. Ugrenet torskemund. 8-30cm. Blågrøn og mest ugrenet enårig med kirteldunet klase. Bladene 12-30x1-2½mm, de nedre i krans. Kronen ofte lillaåret. 0-1000m. IV-VI.

L. micrantha (Cav.) Hoffm.& Lk. Småblomstret torskemund. 5-25cm. Når foregående. Bladene 15-30x2-10mm. Frugtklasen ofte ret tæt. 0-500m. IV-VI.

Cymbalaria muralis Gaertner & al. Vedbendtorskemund. Stort set glat. Sporen 1½-3mm, ca. = bægeret. Kapslen glat. III-X. Forv.

C. longipes (Boiss.& Heldr.) A.Cheval. Stort set glat. Sporen 4-5mm, meget længere end bægeret. Kapslen kirteldunet. Bladene højst 15x20mm. Kystklipper. III-IV.

C. microcalyx (Boiss.) Wettst. Småbægret torskemund. Stængler og blade lådne. Bladene hele eller 3(5)-lappede, lapperne oftest lave og afrundede. Kronen 9-13mm, lilla med gul pukkel. 2 ssp.:
ssp. microcalyx: Sporen 2½-3½mm. Frøene uens, nogle af dem 2mm eller mere. 0-2100m. III-VII. TA,PR.
ssp. minor (Cuf.) Greuter: Sporen 1½-2mm. Frøene ret ens, ca. 1mm, sorte. 0-1950m. III-VII. ER.

Kickxia. Torskemund.

1. Alle blade med afrundet eller hjærteformet grund .. spuria
   Øvre " " spydformet grund 2.
2. Sporen stærkt krummet. Frøene knudrede ..... commutata
   " m.m. ret. Frøene grubede elatine

Kickxia commutata (Bernh.) Fritsch ssp. graeca (Bory & Chaub.) Fern. Skovlbladet torskemund. Flerårig. Stænglerne kirtellådne. Bladene lådne. Kronen 11-15mm, med blålig over- og gul underlæbe.

K. elatine (L.) Dum. ssp. crinita (Mabille) Greuter Spydbladet torskemund. Enårig. Kirteldunet til -lådden. Kronen gullig eller blålig med lilla overlæbe. 0-1100m. V-X.

K. spuria (L.) Dumort ssp. integrifolia (Brot.) Fern. Rundbladet torskemund. Kirteldunet til -lådden. Kronen 10-15mm, gul med mørklilla overlæbe og krum spore. 0-1000m. VI-IX.

Digitalis laevigata W.& K. ssp. graeca (Ivanina) Werner Brungult fingerbøl. 60-100cm. Helt glat. Bladene m.m. lancetformede. Bægertænderne butte og bredt hindekantede. Kronen 15-35mm, gullig med brunlilla årer og tegninger. 0-2000m. V-VII.

D. ferruginea L. Rustfingerbøl. 30-120cm. Stænglen glat. Bladene m.m. lancetformede. Bægertænderne spidse, højst smalt hindekante-

de. Kronen 15-35mm, gul til rødbrun med mørkere årer. 500-2000m. VII-VIII. TA,PR,ME,KY.

Veronica. Ærenpris.

1. Blomsterne spredte i bladhjørnerne. Liggende enårige .... 2.
" i klaser 5.
2. Bladene savtakkede ..... persica
" 3-9-lappede 3.
3. Kronen hvid. Kapslen mest håret ..... cymbalaria
" blå til lilla. Kapslen glat 4.
4. Kronen blå. Frugtstilken 2-7(-9)mm ..... triloba
" blegblå. Frugtstilken (7-)9-15(-20)mm hederifolia
5. Blomsterne i sidestillede klaser ..... 6.
" i endestillede " 11.
6. Planten m.m. glat. På fugtig bund ..... 7.
" håret. På tørrere bund 8.
7. Bladene lidt tykke, mest ægformede ..... beccabunga
" tynde, lancetformede og spidse anagallis-aquatica
8. Bladene dybt 1-2-fligede ..... jacquinii
" takkede 9.
9. Bladene 4-6x1-2½mm, med omrullet rand ..... thymifolia
" større og flade 10.
10. Klaserne kirteldunede ..... chamaedrys
" ukirtlede orsiniana
11. Flerårig med liggende stængler ..... erinoides
Enårige 12.
12. Frugtstilkene højst 3mm ..... 13.
" 2½-20mm 15.
13. Øvre blade fjerfligede ..... verna
" " takkede 14.
14. Støttebladene 2½-5 x stilken, aflange ..... arvensis
" 1-2 x stilken, m.m. spatelformede sartoriana
15. Kronen 10-15mm bred. Griflen 3-4mm ..... glauca
" 3-6mm bred. Griflen ca. 1½mm praecox

Veronica erinoides Boiss.& Spr. 5-12cm. Bladene ujævnt indskåret takkede, 4-8x2½-4mm. Klasen hovedformet, med 2-7 blomster. Bægeret 5-tandet. Kronen 8-9mm bred. 1700-2400m. VI-VII.TA,KY,KH

V. orsiniana Ten. ssp. orsiniana (V. teucrium p.p.) 10-25cm. Stænglen tvesidet kortdunet. Bladene 12-25x4-15mm. Få klaser. Bægeret 4-5-tandet. Kronen 12-14mm bred. 1300-2300m. V-VIII. ER.

V. jacquinii Baumg. Fjerærenpris. 12-30cm. Ukirtlet. Mest 2-3 klaser. Bægeret 4-5-tandet, øvre tand lille eller væk. Kronen 10-14mm bred. 0-2000m. sV-VII.

V. chamaedrys L. Tveskægget ærenpris. V-VII. 2 underarter:
ssp. chamaedrys: Kronen 8-12mm bred. Griflen 3½-5mm. Bladene rund- til savtakkede med korte, brede tænder.
ssp. chamaedryoides (Bory & Chaub.) M.A.Fischer: Kronen 6-8mm bred. Griflen 2½-3½mm. Bladene indskåret savtakkede med lange, linjeformede tænder.

V. thymifolia Sm. Timianærenpris. 8-15cm. Liggende og tæppedannende, dunet. Bladene 7-11x1-2½mm. 1-3 meget korte og fåblomstrede klaser. Kronen 7-9mm bred. 1600-2370m. TA,ME,KY,KH,ER.

V. beccabunga L. Tykbladet ærenpris. 600-2060m. IV-VIII.

V. anagallis-aquatica L. Lancetbladet ærenpris. 0-1800m. VI-X.

V. praecox All. Tidlig ærenpris. 5-20cm. Bladene dybt sav-rundtakkede. Kapslen omvendt ægformet. Blomsterstilken lidt længere end bægeret, men lidt kortere end støttebladet. 0-2000m. V-VI.

V. arvensis L. Markærenpris. Kronen 2-4mm bred, kortere end bægeret. Kapslen 2½-3½x3-4mm. Griflen 0,3-0,6mm. 0-2400m. II-VI.

V. sartoriana Boiss.& Heldr. Ligner den foregående, men kronen

4-6mm bred, længere end bægeret. Kapslen 3½-5x4-5mm. Griflen 0,7-1,1mm. 1200-2150m. V-VI. TA,ER.

Veronica glauca Sm. Krumstilket ærenpris. 5-25cm. Bladene 6-25 x 5-23mm, oftest trekantet-ægformede, rund-savtakkede. Kronen skinnende blå. 3 underarter:
ssp. glauca: Bladene noget blågrønne. Kapslen med afskåret spids. Frugtstilkene udstående og opadkrummede. 0-500m. II-IV.
ssp. peloponnesiaca (Boiss.& Orph.) Maire & Petitm.: Bladene grønne. Kapslen med svagt udrandet spids. Frugtstilkene mest som hos foregående, men kan være delvist nedadkrummede. 0-1900m. III-VI.
ssp. chaubardii (Boiss.& Reuter) Maire & Pet.: Bladene grønne. Kapslen med tydeligt udrandet spids. Frugtstilkene kreds- eller S-formet nedadbøjede. 0-1200m. II-VI.

V. verna L. Vårærenpris. 1500-2400m. V-fVII. TA,PR.

V. persica Poiret Storkronet ærenpris. 0-1800m. I-XII.

V. hederifolia L. ssp. hederifolia Vedbendærenpris. 0-1800m. I-V.

V. triloba (Opiz) Wiesbaur Trelappet ærenpris. 5-20cm. Bladene kødede, trelappede, mørkegrønne. Bægerbladene dunede udvendigt, omslutter kapslen i frugt. 0-2000m. III-VI. KH,KY,PN.

V. cymbalaria Bodard Hvid ærenpris. Bladene runde med 5-9 lapper, oftest med noget hjærteformet grund. Med alm. hår, undertiden blandede med kirtelhår. Kronen 6-10mm bred. 0-800m. I-V.

Euphrasia salisburgensis Funck Brun øjentrøst. 2-9(-16)cm. Bladene glatte, 2-5mm brede, med 2-4 par tænder med et lige stykke rand imellem sig. Kronen 4½-6½mm. 1000-2700m. VI-IX. KY,KH,TA(nord).

Odontites verna (Bell.) Dum. ssp. serotina (Dum.) Corb. (O. vulgaris) Høstrødtop. 0-1500m. VIII-X. Kronen rød.

O. glutinosa (Bieb.) Bentham Stinkende guldtop. 12-30cm. Kirteldunet enårig. Bladene 1-2cm, helrandede og linjeformede. Kronen 12-15mm. 1800-2000m. VII-VIII. TA,KH.

O. linkii Heldr.& Sart. Kortakset guldtop. 40-80cm. Halvbusk. Stænglen mørklilla. Bladene linjeformede. Kronen 7mm, gul. 0-1300m. VII-XII.

Parentucellia viscosa (L.) Caruel Engguldtop. 10-50cm. Enårig. Blomst som Rødtops, blade som Skjallers. Kronen gul, 18-24mm. 0-500m. IV-V.

P. latifolia (L.) Caruel Stenrødtop. 3-25cm. Minder mest om en Rødtop, men klasen alsidig. Bladene ægformede og dybt tandede. Kronen rød, 8-10mm. 0-1200m. III-V.

Bellardia trixago (L.) All. Rosenmund. 5-50cm. Enårig. Vækst og blade som hos Skjaller. Kronen 20-25mm, hvid med lyst rødlilla overlæbe. 0-1200m. IV-V.

Pedicularis graeca Bunge Græsk troldurt. 8-20(-30)cm. Stænglen tæt uldhåret. Bladene 2 x delte. Kronen gul, 20-25mm. Overlæben krummet i spidsen, kortnæbbet. 1500-2400m. VI-VIII. OL,KY,KH.

Rhinanthus pubescens (Sterneck) Soó Dunet skjaller. 10-18(-40) cm. Tæt kirtelhåret over det hele. Støttebladene korttandede. Kronen 14-18mm. Overlæbens tænder ca.1x1mm. 1800-2400m.VI-VIII.KH.

GLOBULARIACEAE

Globularia alypum L. Buskkugleblomst. Busk op til 1m med rødbrune, stribede grene. Bladene omvendt lancetformede, spredte, helrandede eller 3-tandede, glatte og læderagtige, 16-30mm. Blå blomster i 10-15mm brede hoveder med bredt ægformede svøbblade. 0-600m. X-III.

G. stygia Orph. Tæppedannende dværgplante, rodslående og med udløbere. Bladene 5-15x3-10mm. Hovedet 10-15mm bredt, lyslillat. 1300-2300m. VI-VII. TA,KH,KY.

ACANTHACEAE

Acanthus spinosus L. Tornet bjørnetidsel. 40-100cm. Staude med fjerfligede, tornede blade på 20-60cm, mest grundstillede. 4-5cm store, hvide, rødårede maskeblomster uden overlæbe, i et tæt 30 x3cm langt aks med 4cm store, tornede støtteblade. 0-400m. V-VI.

OROBANCHACEAE

Orobanche. Gyvelkvæler.

1. Hver blomst med 1 støtteblad, 2 forblade og 2 ofte kløvede bægerflige. Farven mest blå eller lilla ..... 2.
   Hver blomst kun med 1 støtteblad og 2 bægerflige 5.
2. Stænglen 1½-3mm tyk ved grunden ..... 3.
   " 4-7 mm " " " 4.
3. Kronen 12-15(17)mm; røret 3-4mm bredt i spidsen ..... nana
   " 17-23mm; røret 5-6mm bredt i spidsen mutelii
4. Planten med lange, krøllede kirtelhår ..... schultzii
   " tæt dækket af korte kirtelhår purpurea
5. Kronen skinnende mørkerød indvendigt ..... 6.
   " ikke sådan 7.
6. Støvfanget gult ..... gracilis
   " rødlillat sanguinea
7. Kronen lådden, hele planten ofte m.m. ligeså ..... pubescens
   " kirteldunet eller m.m. glat 8.
8. Underlæben kirtelrandhåret ..... 9.
   " ikke eller svagt kirtelrandhåret 11.
9. Kronen med lyse kirtelhår ..... caryophyllacea
   " " røde til mørklilla kirtelhår 10.
10. Kronen hvid med lillat anstrøg. Akset mest åbent ..... alba
    " gul " " " . " ret tæt reticulata
11. Støvtrådene hårede i hele deres længde ..... 12.
    " glatte foroven 13.
12. Støvfanget gult ..... elatior
    " rødlillat baumanniorum
13. Kronen 20-30mm, med store, vidt adskilte læber .... crenata
    " 10-20mm, læberne mindre 14.
14. Overlæben lige fremadrettet ..... minor
    " med m.m. opadbøjede kronflige amethystea

Orobanche nana (Reuter) Noë Liden gyvelkvæler. 5-15cm. Klasen 3-6cm, åben, med udstående blomster. Stænglen mest ugrenet. Underlæbens lapper mest spidse. 0-1000m. III-VII.

O. mutelii F.W.Schultz 7-20cm. Klasen 3-5cm, ret tæt; blomsterne mere oprette end hos nana. Underlæbens lapper afrundede. 0-1600m. IV-VII.

O. schultzii Mutel Rank gyvelkvæler. 8-15cm. Stænglen ofte grenet, eller de nedre blomster stilkede. Kronen 20-23mm, blålig, røret lidt krummet og lidt indsnøret midtpå. 0-2000m. VII. PR.

O. purpurea Jacq. Røllikegyvelkvæler. 12-50cm. Kronen 18-25mm, kraftigt blålilla med mørkere årer og hvidlig grund. Støvfanget hvidt eller blegblåt. 0-1500m. VI-VII. På Kurvblomster.

O. crenata Forsskål Bønnegyvelkvæler. 20-40cm. Kronen næsten glat, hvidlig, læberne ofte med lilla årer. Kronens ryglinje lige eller svagt krummet. Mest på dyrkede Ærteblomster. IV-VII.

O. alba Stephan Timiangyvelkvæler. 12-40cm. Kronen hvid forneden, rødlig mod spidsen. Støvfanget rødt eller rødlillat. Kronen med mange mørklilla kirtelhår. På Læbeblomster. 300-2600m.IV-VIII

O. reticulata Wallr. Tidselgyvelkvæler. 15-50cm. Kronen 15-25mm med mørklilla kirtelhår i spidsen. På Carduus og Cirsium, sj. på Scabiosa. 800-2300m. VI-VIII.

O. pubescens D'Urv. Lådden gyvelkvæler. 15-50cm. Kronen 13-18mm, bleggul, lillaanløben fortil. Underlæben ikke eller svagt kirtel-

randhåret. Lillat støvfang. 0-900m. IV-V.

Orobanche baumanniorum Greuter 15-40cm. Kronen 15-20mm, mørklilla til mørkt rødlilla, røret ret lige, men bøjet 1/3 fra spidsen. På Dipsacaceae. 700-2100m. VI-VIII. TA (NØ f. Mavrovuna).

O. amethystea Thuill. Ametystgyvelkvæler. 15-30cm. Kronen 17-25 mm, med lys grund og lilla spids, røret ofte bøjet 1/3 fra grunden, ret midtpå, svagt krummet fortil. 0-2000m. IV-VIII. TA.

O. minor Sm. Kløvergyvelkvæler. 10-15cm. Kronen 10-15mm, gullig med lillat skær mod spidsen. Støvfanget mest lillat, sj. gult. Mest på kløver. 0-1500m. III-VII.

O. caryophyllacea Sm. Snerregyvelkvæler. 15-40cm. Kronen 23-32mm, med nellikeduft, bleggul til rødbrun, røret krummet fortil, næsten lige midtpå, bredt rør-klokkeformet. På Rubiaceae. 0-2000m.VI-VII.

O. elatior Sutton (O. major) Stor gyvelkvæler. 12-50cm. Kronen 18-25mm, gullig, ofte med jævnt krummet ryglinje. Overlæben hel til svagt udrandet. Mest på Knopurter. 500-2100m. VII-VIII. TA,PR.

O. gracilis Sm. Vissegyvelkvæler. 20-50cm. Kronen 17-30mm, gullig med røde årer og rand. Mest på Ærteblomster. 0-2000m.IV-VII

O. sanguinea Presl 10-40cm. Kronen 10-15mm, m.m. glat, mørkerød eller rødlilla, sjældent gul. På Kællingetand. 0-800m. IV-VI.

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula hirtiflora Ten. Rød vibefedt. 4-12cm. Kronen blegrød eller bleglilla med bleggult svælg og spore. Bladene 2-6x1-3cm. 800-1900m. IV-IX. KH (Styx-kløften, Megaspileon, over Zarrukhla).

Utricularia vulgaris L. Alm. blærerod. 0-1000m. VI-VIII.

RUBIACEAE

Slægterne Asperula og Galium er uskarpt afgrænsede. Asperula har mest veludviklet kronrør og Galium mest hjulformet krone.

1. Bladene modsatte med små fodflige. Dværgbusk ..... Putoria
   " i kranse på 4 eller flere 2.
2. Blomsterne i tætte, cylindriske aks ..... Crucianella
   " ikke i aks 3.
3. Blomsterne i hoveder med delvist sammenvokset svøb Sherardia
   " anderledes 4.
4. Frugtstilken opsvulmet, dækker frugten ..... Valantia
   " ikke således opsvulmet. Frugten synlig 5.
5. Kronen 5-tallig. Frugten en sort stenfrugt ..... Rubia
   " 4-tallig. " tør 6.
6. Gule blomster i korte kvaste over de 4 blade ..... Cruciata
   Anderledes 7.
7. Kronrøret mindst lig kronfligene ..... Asperula
   " kortere end " Galium

Putoria calabrica (L.f.) Pers. Stinkkælderhals. 50-80cm. Stærktgrenet dværgbusk i op til 1m brede puder. Bladene 1-2cm x 3mm, akselbladene 1mm. Lyserøde blomster i små, endestillede kvaste med 10-12mm lange kronrør. 0-2000m. IV-IX.

Sherardia arvensis L. Blåstjærne. 0-1250m. V-X.

Crucianella. Korsaks. Enårige, kransbladede urter med små, langrørede kroner, der rager lidt frem mellem aksenes tæt taglagte støtteblade.

Crucianella graeca Boiss. 10-25cm. Kronen 6-8mm, 5-tallig. Bladene 6(-8) sammen. Stænglen m.m. ru. Støttebladene kort randhårede. Mest 2 blomster for hvert støtteblad.

C. angustifolia L. Smalbladet korsaks. 25-50cm. Kronen 3-5mm, 4-tallig. 6-8 blade sammen, de nederste linje-lancetformede. Stænglen jævn. Kronen ikke længere end støttebladene. 0-1500m. V-VII.

Crucianella latifolia L. Bredbladet korsaks. 20-30cm. Kronen 5-7½mm, 4-tallig, lidt længere end støttebladene. 4-6 blade sammen, de nedre omvendt ægformede til elliptiske. 0-1500m. IV-VI.

Asperula. Mysike.

1. Kransene med 6-8 blade ..... 2.
" " 2-4 " 6.
2. Blåblomstret enårig ..... arvensis
Flerårig. Kronen ikke blå 3.
3. Kronen svagt skålformet. Åben blomsterstand ..... 4.
" tragt- til rørformet 5.
4. Kronfligene glatte. Smal blomsterstand ..... saxicola
" m.m. korthårede. Ægformet blomsterstand boryana
5. Lyserøde blomster ..... arcadiensis
Hvide blomster taygetea
6. Blomsterne hvide. Bladene 9-25x4-10mm ..... laevigata
" rødlige eller gullige. Bladene smallere 7.
7. Stængelbladenes stak 0-0,2mm ..... 14.
" " 0,3-1mm 8.
8. Toppen forlænget, meget længere end de golde skud ..... 9.
" tæt, ofte næppe " " " " " 12.
9. Bladene ¾-1¼mm brede. Kronen 4-5mm bred, lyserød .... oetaea
" 0,3-0,75mm brede. Kronen 2½-4mm bred 10.
10. Blomstrende skud tydeligt grenede, ofte tæt lådne rigidula
" " højst fågrenede. Højst håret forneden 11.
11. Længste stængelhår 0,2-0,3mm. Kronen m.m. gullig .... lutea
" " 0,1mm. Kronen m.m. rødlig mungieri
12. Golde skud blåduggede især som unge, m.m. glatte boissieri
" " grønne, oftest m.m. korthårede 13.
13. Kronfligene glatte og jævne ..... nitida
" kortbørstede malevonensis
14. Kronen gullig indvendigt, rødlig udvendigt ..... aristata
" rødbrun til brunlilla elonea

Asperula aristata L.f. ssp. thessala (Boiss.& Heldr.) Hayek Brodmysike. 10-60cm. Kronen 7-12mm, fligene uden eller med utydelige vedhæng. 1000-2100m. VII-IX. TA,ER.

A. oetaea (Boiss.) Heldr. 5-30cm. Udstrakt-opstigende. Bladribben 1/5-1/4 x bladbredden. Blomsterne i 2-5 m.m. hovedformede, kortstilkede nøgler, 5-9mm. 1700-2300m. VI-VIII. KH.

A. nitida Sm. 6-25cm. Unge skud seglagtigt krummede. Bladene 10-15mm, brodden indtil 1mm. Blomsterstanden mest med 3-4 kranse. Kronen 5½-8mm, lyst rødlilla. V.

A. lutea Sm. 8-25cm. Stænglen oftest håret forneden, glat foroven. Bladene 7-13x0,45-0,75mm, ofte krumme i spidsen. 2-5 kranse af oftest siddende blomster. 500-2200m. VI-VII. KY,KH.

A. rigidula Hal. 18-45cm. Oftest gråliglådden forneden. Med sortagtige delfrugter. Kronen mest gullig. -1000m.

A. mungieri Boiss.& Heldr. 15-45cm. Bladene 7-15x0,3-0,6mm, nåleformede. Kronen hvidlig, rødlig eller brunlilla. 1700-2300m. VI-VIII. TA,PR.

A. boissieri Heldr. 2-7cm. Bladene 4-10x½-1mm, i tætstillede kranse. 1-2 m.m. siddende kranse. Kronen 5-7mm, lyserød, kan være 5-tallig. 1600-2450m. VI-VIII. KY,KH.

A. malevonensis Ehrend.& Schönb-Temesy 2-6cm. Stænglerne tæthårede til halvglatte. Bladene 7-9x0,4-0,6mm, m.m. skinnende. 1-3 m.m. siddende kranse. Kronen 4-6½mm, lyserød. 1800-1900m. PR.

A. taygetea Boiss.& Heldr. 10-40cm. Planten fløjlshåret. Bladene 5-10x½-1mm. Kronen 4-6mm, tæt dunet, hvid til blegrød. V-VI.

A. laevigata L. Skovmysike. 15-80cm. Stænglens led 2-4 x bladene, disse butte, tydeligt netårede og lysere nedenunder. Kronrøret 2 x fligene. 0-1500m. VI-VII.

Asperula arcadiensis Sims 4-15cm. Tæt tueformet og blødhåret. Bladene 5-10x1½-2¾mm. Kronen 10-16mm, kraven 6-8mm bred. 550-2000 m. V-VII. KY,KH, nær Zarukhla, SØ-bredden af Stymfaliske Sø.

A. arvensis L. Blåmærke. 5-30cm. Minder om en Blåstjærne, men blomsterne mørkere blå, i hoveder omgivne af 10-20 bladlignende, langt randhårede svøbblade. Kronen 4-6mm. 0-1500m. IV-VI.

A. elonea Iatrou og Georg. 20-45cm. Bladene 7-20x1-1,3mm, med omrullet rand. Kronen 6-7mm, fligene 1½-2mm med lang (1,5-1,7mm) indbøjet spids. 200-600m. VII. Over Ano-Tyros; ml. Leonidion og Elona.

A. saxicola Ehrend. 10-20cm. Bladene 2½-5x1,8-2,5mm, lidt hårede ovenpå, næsten glatte nedenunder. Kronen 0,7-1mm, gullig, kronrøret 0,1-0,2mm. NØ f. Parnon.

A. boryana (Walp.) Ehrend. 2-10cm. Bladene 4-6 sammen, 2-5x¾-2mm. Kronen ca. 3-4mm bred, gulgrøn, med lillat skær udvendigt. 300-2000m. V-VIII. TA,PR,NØ f. Kalamata, nær Tripi.

Galium. Snerre.

1. Enårige ..... 2.
   Flerårige 12.
2. Bladranden med tilbagerettede småtorne ..... 3.
   " " fremadrettede " 5.
3. Frugtstilken nedadbøjet. Bladoversiden glat ..... tricornutum
   " udstående-opret. Bladoversiden dunet 4.
4. Kronen hvid, 1,5-1,7mm bred. Frugten 3-5mm ..... aparine
   " gulgrøn, 0,8-1,3mm bred. Frugten 2-3mm spurium
5. Frugten 4-6mm, vortet. Bladene over 1½mm brede ... verrucosum
   " under 2mm. Bladene ofte under 1½mm brede 6.
6. Kvastene kortere end bladene, med 1-3 blomster ..... 7.
   " længere " " , mangeblomstrede 8.
7. Delfrugterne cylindriske, ofte med krogbørster ..... murale
   " ægformede, uden krogbørster verticillatum
8. Støttebladene m.m. længere end småkvastene ..... setaceum
   " kortere end småkvastene 9.
9. Delkvastene hovedformede, meget tætte ..... capitatum
   " ikke hovedformede, åbne 10.
10. Kronfligene spidse, uden brod ..... divaricatum
    " med en tydelig brod 11.
11. Kronfligenes brod under ½ x kronfligene ..... intricatum
    " " mindst 2/3 x kronfligene brevifolium
12. Bladene 4 i krans, med 3 ribber ..... rotundifolium
    " med 1 ribbe 13.
13. Delfrugterne kugleformede. Stænglen ofte ru. Bladene butte 14.
    " ægformede 15.
14. Frugtstilkene udspærrede. Bladene omv. lancetf. ... palustre
    " ej. " . " m.m. linjeformede debile
15. Bladundersiden tydeligt håret. Gul krone ..... verum
    " glat 16.
16. Frugt og frugtknude med krogbørster ..... odoratum
    " " " glatte eller fintvortede 17.
17. Kronen skål- til tragtformet ..... 18.
    " hjulformet 20.
18. Stænglen over 30cm. Bladene 2½-4cm x 3-7mm ..... laconicum
    " 2-15cm. Bladene 4-10x½-1½mm 19.
19. Med golde skud med tæt taglagte blade ..... incanum
    Uden sådanne skud cyllenicum
20. Kvastenes yderste grene med støtteblade. 3-35cm ..... 21.
    " " " uden " 22.
21. Bladene ½-1mm brede. Stænglen dunet forneden ... thymifolium
    " 1-2mm " . " m.m. glat anisophyllon
22. Bladene 2-5mm brede ..... 23.
    " ½-2mm " 25.
23. Stænglen 1-2mm tyk, 30-50cm høj ..... citraceum
    " 3-5mm " , 50-125cm høj 24.

24. Uden udløbere. Bladoversiden skinnende ..... heldreichii
Med " . " ikke skinnende peloponnesiacum
25. Bladene 1-2mm brede ..... 26.
" ½-1mm " 27.
26. Kronen 4-5mm bred ..... violaceum
" 2-3mm " taygeteum
27. Delblomsterstandene med 4-9 led ..... asparagifolium
" " 3-5 " melanantherum

Galium aparine L. Burresnerre. 0-2000m. III-IX.

G. spurium L. Hørsnerre. Ligner Burresnerre. Frugten tætbørstet eller glat. 0-1500m. III-VI.

G. tricornutum Dandy Vortesnerre. Som Burresnerre, men frugten uden krogbørster, men med små spidse vorter. 0-1000m. IV-VI.

G. verrucosum Hudson Rynket snerre. Minder om Burresnerre. Frugtstilkene nedadkrummede. Frugten groft rynket. Bladoversiden glat. Blomsterne hvidlige. 0-800m. I-V.

G. murale (L.) All. Mursnerre. 5-20cm. Kransene med 4-6 blade på 4-10mm. Blomsterstilkene nedbøjede efter blomstringen. Frugten 1,3-1,5mm, delfrugterne ofte uens. Kronen ¾mm bred. III-VI.

G. verticillatum Danth. Kranssnerre. 5-20cm. Opret, ikke særligt håret. Bladene 4-8x1-2mm. Blomsterne m.m. siddende. Kronen 1-1½ mm bred. 1000-2200m. IV-VII. TA,PR,ME,OL,KY,KH,ER,PN.

G. setaceum Lam. Børstesnerre. 5-30cm. Bladene tynde, 5-17x½-1 mm. Støttebladene med kroghår på oversiden. Kronen ca. ½mm bred, brunlilla. Frugten tæt kroghåret. 0-1100m. IV-V.

G. capitatum Bory & Chaub. Hovedsnerre 9-35cm. Gaffelgrenet fra grunden. Bladene 5-13x½-3mm. Delblomsterstandene 5-8mm brede. Kronen ¾-1½mm bred, rødlig.

G. divaricatum Pourret Udspærret snerre. 5-30cm. Stænglerne oprette og noget ru. Bladene 4-10x0,3-1,5mm. Kronen gulligrød, ½-1 mm bred. 0-1750m. V-VII.

G. intricatum Margot & Reuter 7-35cm. Stænglen ru forneden, ofte m.m. håret foroven, ofte stærktgrenet fra grunden. Bladene 4-12 x 1-2½mm. Kronen gulligrød, 1-2mm bred. 0-1500m. TA,PN. V-VII.

G. brevifolium Sm. ssp. insulare Ehrend.& Sch.-Tem. 10-35cm. Bladene 6-12 i krans, 3-12x1-3½mm. Frugtstilkene mest noget nedbøjede, ofte fortykkede opad. Kronen 2½-3mm bred, grumsethvid.

G. rotundifolium L. Rundbladet snerre. 10-20cm. Mest ret glat. Bladene ægformede til rundagtige, 14-18x6-10mm. Endestillet, ret fåblomstret og åben halvskærm. 820-2000m. V-VII. TA,KH.

G. palustre L. Kærsnerre. 800-1850m. VI-VII.

G. debile Desv. Spinkel snerre. 20-60cm. Bladene 4-6 sammen, uden klar spids, 15-25x¾-2mm, ofte omrullede. Frugten tydeligt knudret. 0-1200m. V-VII.

G. odoratum (L.) Scop. Skovmærke. 800-2025m. V-VII. KH.

G. verum L. Gul snerre. 0-2000m. VI-VIII. KH.

G. laconicum Boiss.& Heldr. -80cm. Stænglen trind forneden, håret især forneden. Bladene friskgrønne og hindeagtige. Kronen 2-3mm bred, hvid. Bred, ægformet blomsterstand. 500-1300m.

G. incanum Sm. ssp. incanum 2-15cm. Bladene 6 sammen. Blomsterstanden valseformet med fåblomstrede, kortstilkede kvaste. Kronen hvid, 3-7mm bred. 1500-2400m. VI-VIII. TA,OL,KY,KH.

G. cyllenium Boiss.& Heldr. 3-5cm. Med udløbere. Bladene i tæt taglagte kranse på 5-6, med en klar brod på indtil 0,6mm, skinnende. Kvasterne med 1-3 blomster på 3-4mm. 1800-2300m.VI-VII.KY.

Galium thymifolium Boiss.& Heldr. 6-35cm. Stænglerne ret tæt nedadvendt krusdunede. Bladene 2-7mm. Blomsterstanden smalt valseformet med korte, tætgrenede kvaste. 1500-2400m. VI-VIII. Udbredt.

G. anisophyllon Vill. ssp. plebeium (Boiss.& Heldr.) Ehrend. Alpesnerre. 3-10cm. Tueformet. Bladene 4-10mm. 1-3 små kvaste yderst i en slags halvskærm. Kronen 3-4½mm bred, hvid. 1800-2800m.VI-VIII.

G. citraceum Boiss. 30-50cm. Bladene 8-11 sammen, 15-25x2-4mm. Blomsterstanden ret fåblomstret og smal. Delblomsterstandene overrager 1-2 stængelled. Kronen 2-3mm bred, gul. 1000-1900m. TA.

G. heldreichii Hal. 80-100cm. Stænglen mest tæt ½-1mm håret. Bladene næsten læderagtige, 15-32x2-5mm. Kronen 2-3mm, fligene mest skråt opadrettede. 300-1600m. IV-VI.

G. peloponnesiacum Ehrend. & Krendl 50-125cm. Bladene 7-9 i krans 15-30x2-4(6)mm. Kvastene overrager 3-6 stængelled. Kronen hvid eller gulliggrøn, 3-4mm bred. 20-1700m. IV-VI.

G. violaceum Krendl 60-90cm. Stænglen 1½-2mm tyk, 0-0,3mm langt håret. Bladene 6-10 sammen, 15-20mm. Kvastenes grundled ½ x det tilhørende stængelled eller mere. 100-1000m.

G. taygeteum Krendl 20-50cm. Stænglen forneden 0,2-0,5mm langt håret, sj. glat. Bladene 8-10 sammen, 5-15mm. Kvastenes grundled under ½ x det tilhørende stængelled. 800-2200m. TA,PR,KY,KH m.m.

G. asparagifolium Boiss.& Heldr. 25-100cm. Sort som tør. Bladene 6(7) i krans, 5-15mm. Delblomsterstandene smalt kegleformede, ofte bueformet opstigende. Kronen 2-4mm bred, gullig. 50-1500m.

G. melanantherum Boiss. 10-70cm. Bladene 6-7 sammen, 8-12mm. Delblomsterstandene bredt kegleformede. Kronen 3-7mm, gul. Blomsterstanden virker ikke mellembrudt. 50-1300m.

Cruciata laevipes Opiz Korsblad. 20-60cm. Flerårig. Stænglen med udstående hår på 1-2mm, Bladene 3-årede. Kvastene med 5-9 blomster, kvaststilken med 2 støtteblade. 0-2100m. VI-VIII.

C. glabra (L.) Ehrend. Glat korsblad. 5-20cm. Flerårig. Stænglen mest glat, ellers med 0,4-0,8mm lange hår. Bladene 3-årede. Kvastene med 3-5 blomster, stilken uden støtteblade. 1300-2210m.

C. pedemontana (All.) Ehrend. Enårig korsblad. 10-30cm. Enårig. Stænglerne spinkle, med hagekrummede småtorne og udstående hår. Bladene 1-årede. Kvastene 2-3-blomstrede. 1000-2100m. V-VII.

Valantia. Hornsnerre. Korte 3-blomstrede kvaste med 2 han- og 1 tvekønnet blomst. Frugtstilken nedbøjet, udvidet og ofte tornet, omslutter frugten. 4 1-ribbede blade i krans.

V. aprica (Sm.) Boiss.& Heldr. Flerårig hornsnerre. 5-20cm. Flerårig. Den tvekønnede blomst ca. 2½mm bred. Frugten løsnes let fra sin stilk. Stænglen mest glat. 1050m-2400m. V-VII. TA,KY,KH,ER.

V. hispida. L. Ru hornsnerre. 2-5(-10)cm. Enårig. Stænglen stivhåret. Frugtstilken uden horn, men med 15-25 børster. III-VI.

V. muralis L. Glat hornsnerre. 2-6(-15)cm. Enårig. Stænglen glat eller tiltrykt dunet. Frugtstilken med et rygstillet horn. Stilk og horn med nogle krogbørster. 0-1000m. III-VI.

Rubia. Krap. Grove, flerårige snerrer, noget klatrende med modhager på blade og ofte også på stængler.

R. tinctorum L. Farvekrap. 30-100cm. Bladene 4-6 sammen, løvfældende, 3-ribbede, lysegrønne. Kronen bleggul. Støvknapperne ½mm, 5-6 x så lange som brede. 0-600m. IV-VI. Forv. fra tidl. dyrkn.

R. peregrina L. Vild krap. 30-120cm. Bladene 4-8 sammen, stedsegrønne, 1-ribbede, mørkegrønne og læderagtige. Kronen gulgrøn, 4-6mm bred. Støvknapperne 0,2-0,3mm, højst 2 x så lange som brede. Kvastene 4-10cm, længere end bladene. 0-1100m. IV-VIII.

Rubia tenuifolia d'Urv. 30-120cm. Som den foregående, men kvastene 1-2cm, kortere end eller lig bladene. Kronen 3-7mm bred. 0-800m. IV-VI.

PLANTAGINACEAE

Plantago. Vejbred.

1. Bladene modsatte ..... 2.
" i roset eller spredte 3.
2. Alle støtteblade ens, uden sideribber ..... afra
Nedre " ulig de øvre, med sideribber arenaria
3. Bladene tandede eller 1-2 x fligede ..... 4.
" helrandede (højst svagt tandede) 6.
4. Bladene lancetformede og tandede ..... serraria
" med båndformet midterdel og veludviklede flige 5.
5. Støttebladene med en 2/3-3/4 x så lang brod ..... coronopus
" " " 1/3 x så lang brod weldenii
6. Bladene kødede og trinde ..... crassifolia
" ikke kødede 7.
7. Bladene stive, linjeformede og kølede ..... holosteum
" ikke stive eller kølede 8.
8. Bladene ægformede til bredt elliptiske, 5-8cm brede .. major
" lancet- til linjeformede, mest indtil 1cm brede 9.
9. Støtte- og bægerblade tæt lådne ..... 10.
" " " glatte eller korthårede 12.
10. Skaftet indtil 2½cm, krumt og fortykket i frugt ... cretica
" mest længere, ikke krumt i frugt 11.
11. Nedre støtteblade 3-4mm, lancetformede ..... lagopus
" " 6-8mm, sylformede bellardii
12. Enårig med spredte blade ..... amplexicaulis
Flerårige med bladroset 13.
13. Skaftet trindt ..... 14.
" furet 15.
14. Akset 3-10cm, valseformet, løst forneden ..... albicans
" ½-1½cm, m.m. ægformet, tæt atrata
15. Skaftet mest tydeligt 5-furet. Siderødderne indtil ¾mm tykke ..... lanceolata
Skaftet utydeligt 6-12-furet. Siderødderne indtil 1½mm tykke argentea

Plantago major L. Glat vejbred. 0-1500m. V-IX.

P. coronopus L. Fliget vejbred. Skafterne længere end bladene. Støttebladene med smal køl. 0-800m. IV-VIII.

P. weldenii Rchb. (P. commutata) 3-30cm. Skafterne ofte kortere end til lig bladene. Støttebladene med bred og tyk køl. II-X.

P. serraria L. Savbladet vejbred. 10-30cm. Flerårig. Bladene 8-15x½-4cm, regelmæssigt skarpt savtakkede. 0-800m. III-VI.

P. crassifolia Forsskål Tykbladet vejbred. 8-15cm. Flerårig. Bladene 5-20cm, 3-5mm tykke. Akset 2-5cm. Om. V-VI.

P. holosteum Scop. Kølet vejbred. 10-30cm. Roden forveddet, ofte med flere rosetter. Nedre blade korte og nedbøjede, øvre m.m. oprette, 1-1½mm brede. Akset 3-8cm x 3-4mm. 700-2400m. VI-VIII.

P. atrata Hoppe ssp. graeca (Hal.) Holub Bjærgvejbred. 1½-26cm. Bladene 1-12cm x 2-10mm, småtykke, grågrønne og tæthårede. 1500-2400m. VI-VII. TA,PR,KY,KH,ER,PN.

P. amplexicaulis Cav. Skedevejbred. 10-25cm. Bladene 3-15cm x 3-15mm, m.m. tæt udstående hårede, med stængelomfattende grund. Støtteblade runde eller bredere end lange. 0-200m. IV-VI.

P. lanceolata L. Lancetvejbred. 0-2100m. V-VIII. TA,PR,KY,KH.

P. argentea Chaix Sølvvejbred. 20-50cm. Bladene 10-30x½-1½cm, m.m. tæt tiltrykt sølvhårede. Støvknapperne hvide (gule hos lanceolata). 1400-2000m. mVI-mVIII. ER.

Plantago lagopus L. Harefodsvejbred. 5-40cm. Mest 1-årig. Bladene lancetformede, 3-7-strengede. Aksene først runde til ægformede, senere noget forlængede. 0-800m. IV-VI.

P. albicans L. Hvidbladet vejbred. 10-30cm. Jordstænglen ofte grenet. Bladene smalt lancet- til næsten linjeformede. 5-8mm brede, ofte bølgede, silke-uldhårede. Filtede skafter. IV-V. 0-350m.

P. bellardii All. Rævehalevejbred. 3-8cm. Enårig. Som lagopus, men bladene ofte smallere og aksene lidt længere. 0-1300m. IV-V.
ssp. bellardii: Skaftet lig eller længere end bladene, opret eller opstigende i frugt.
ssp. deflexa (Pilger) Rech.f.: Skaftet kortere end bladene, buekrummet nedbøjet i frugt.

P. arenaria W.& K. (P. indica) Grenet vejbred. 10-50cm. Stænglen med bløde, udstående eller opadrettede hår. 0-500m. V-VII.

P. afra L. (P. psyllium) Loppefrø. 3-15(-40)cm. Stænglen ofte stærkt kirteldunet, i det mindste foroven. 0-900m. I-VI.

P. cretica L. Kuglevejbred. 3-8cm. Ofte over 10 skafter. Akset kugle- eller halvkugleformet, uldent. Den tørre plante bliver til en vindspredt bold. 0-1000m. IV-V.

CAPRIFOLIACEAE

Sambucus nigra L. Alm. hyld. 0-1400m. V-VII.

S. ebulus L. Sommerhyld. En staude på 80-150cm. Fodflige til stede. Mørklilla støvknapper. 0-1300m. V-VII.

Viburnum lantana L. Pibekvalkved. 1-3m. Kviste og blade dunede af brunlige hår. Bladene m.m. ægformede, 4-14x3½-9cm, spidse og med let hjærteformet grund, savtakkede og rynkede. Ingen forstørrede blomster i halvskærmen. 0-1800m. IV-V.

V. tinus L. Vintersnebolle. 1-3m. Busk med modsatte, helrandede, m.m. ægformede blade på 3-10x1½-7cm, glatte og skinnende ovenpå, dunede til glatte nedeunder; stilken ½-1½cm. Flødefarvede blomster i en 6-10cm bred halvskærm, 5-9mm brede og ensartede. X-VI.

Lonicera. Gedeblad.

1. Opret busk ..... 2.
   Slyngplante 3.
2. Blomsterstilken meget kort eller manglende nummulariifolia
   " 12-16mm hellenica
3. Blomsterne i stilkede hoveder ..... etrusca
   " sidder lige over det øverste bladpar implexa

Lonicera hellenica Orph. -2m. Busk med fløjlshårede kviste og bladundersider. Bladene 2½-5½cm, alliptiske til ægformede. Kronen gullig med rødligt skær. Røde bær.

L. nummulariifolia Jaub.& Spach 5-9m. Bladene ægformede til rundagtige, ofte dunede ovenpå, 2½-4cm. Kronen lyserød. Gullige bær. 300-1200m. V-VII..

L. implexa Aiton Stedsegrøn vedvindel. Bladene skinnende mørkegrønne ovenpå, blågrønne nedenunder. Flere sammenvoksede bladpar under blomsterne. 0-800m. V-VI.

L. etrusca Santi Stilket vedvindel. Bladene løvfældende, blå- eller hvidgrønne, kun det øverste par sammenvokset.0-1100m. V-VI.

VALERIANACEAE

1. Kronrøret med spore nederst eller udposning midtpå.
   Kronen mest rød ..... Centranthus
   Kronrøret uden spore eller udposning 2.
2. Flerårig. Ikke gaffelgrenet ..... Valeriana
   Enårig med gaffelgrenet stængel 3.
3. Kronrøret over 2 x fligene. Rødlilla krone ..... Fedia
   " under 2 x " . Lys krone Valerianella

Valerianella. Vårsalat.

1. Alle støtteblade bredt hindekantede, æg- eller hjærteformede, oftest langt randhårede og spidse ..... 2.
   I det mindste de nedre støtteblade m.m. aflange og butte, svagt til ikke hindekantede og højst svagt randhårede 6.
2. Bægeret med lange, trådformede, randhårede tænder hirsutissima
   Bægeret uden sådanne tænder 3.
3. Bægeret oppustet og indsnævret foroven ..... vesicaria
   " ikke oppustet og indsnævret foroven 4.
4. Frugtens krone regelmæssig med 6 lapper, hver med ca. 3 brodde ..... obtusiloba
   Frugtens krone med 6-15 uregelmæssige tænder 5.
5. Frugtens krone halvt delt, med 6 tænder ..... coronata
   " " næsten helt delt, med 8-15 tænder discoidea
6. Frugten med 1-3 kraftige horn i spidsen ..... 7.
   " anderledes 8.
7. De 3-hornede frugters horn uens ..... echinata
   " " " " m.m. ens orientalis
8. Frugten med et 6-tandet bæger ..... eriocarpa
   Bægeret reduceret til en krave eller tand eller helt væk 9.
9. Frugten uden tydelig tand. Blomsterne blegblå ..... 10.
   " med " " . " hvide til lyserøde 13.
10. Frugten med en tydelig længdefure ..... 11.
    " uden nogen længdefure 12.
11. Frugten med et rundt omrids ..... turgida
    " " " aflangt omrids carinata
12. Frugten glat eller tværrynket ..... locusta
    " med klare småvorter costata
13. Bægertanden skævt kraveformet, af frugtens længde muricata
    " kortere end frugten 14.
14. Frugten 1-1½mm ..... microcarpa
    " 2½-3mm dentata

Valerianella coronata (L.) DC. Kronvårsalat. 10-30cm. Bladene ofte fligede eller groft tandede. Blomsterne lyst rødlilla. Frugten stivhåret med netåret bæger. 0-2000m. IV-VI.

V. hirsutissima Link Fjervårsalat. 5-15cm. Frugten 4-kantet uldhåret. Bægeret med 12-27 krogbøjede tænder. IV-V.

V. discoidea (L.) Loisel. Pindsvinevårsalat. 10-30cm. Ligner coronata, men ofte med 3-4 par modsatstillede hovedstilke. Bægeret med 6-12 uregelmæssige og oftest hagekrummede tænder. III-V.

V. obtusiloba Boiss. 7-20cm. Bægeret ca. 10mm bredt, ca. 2 x frugten og netåret. 0-1000m. IV-V.

V. vesicaria (L.) Moench Blærevårsalat. 10-30cm. Som discoidea; støttebladene meget bredt ægformede. Frugten 3-5mm, netåret.

V. locusta (L.) Laterrade Tandfri vårsalat. 0-1400m. IV-V.

V. carinata Loisel. Kølet vårsalat. 10-30cm. Frugten med but firkantet tværsnit. 0-1000m. IV-VI.

V. turgida (Steven) Betcke Bredfrugtet vårsalat. 10-30cm. Frugten ca. 3mm, 3-furet, med et lidt trekantet tværsnit. 0-500m.

V. costata (Steven) Betcke Ribbet vårsalat. IV-VI.

V. echinata (L.) DC. Hornet vårsalat. 5-20cm. Stængelbladene tandede til fligede. Nedre enlige frugter 8-10mm, med 1 horn. Øvre 3-6mm , smalle og 3-hornede. 250-1620m. III-V.

V. orientalis (Schlecht.) Boiss.& Bal. 7-14cm. Som echinata, men de øvre frugters horn rettede i samme retning; selve frugten 3mm, undertiden blå som helt moden. IV-V.

V. dentata (L.) Pollich Tandet vårsalat. 10-30cm. Bægeret kort og skævt afskåret med uens tænder. 0-1750m. IV-VI.

Valerianella eriocarpa Desv. Uldfrugtet vårsalat. 10-30cm. Støttebladene linjeformede, oprette i frugt og overragende frugterne. Frugten 1½-2mm, ofte stivhåret. 0-800m. IV-V.

V. muricata (Steven) Baxter (V. truncata) Skævkravet vårsalat. 10-30cm. Som den foregående bortset fra frugtens krave. III-IV.

V. microcarpa Loisel. Småfrugtet vårsalat. 5-25cm. Frugten oftest dunet, med en kort, bred og but bægertand. 0-1100m. IV-VI.

Valeriana. Baldrian.

1. Stængelbladene hele eller trekoblede ..... 2.
" fjersnitdelte med 2-4 par småblade 3.
2. 2-3 par hele stængelblade ..... crinii
1 " " eller tredelte stængelblade olenaea
3. Frugten ensidigt dunet, 4-5mm ..... dioscoridis
" tvesidet " , 2½-3½mm tuberosa

Valeriana dioscorodis Sm. (V. italica) 25-80cm. Rødderne tenformede. Stænglen glat og hul. Kronrøret 4½-6mm. Grundbladene mest hele. II-V.

V. tuberosa L. Knoldbaldrian. 15-40cm. Knoldagtig jordstængel. Stænglen glat. Grundbladene hele, 2-4x1cm. Kronrøret 4-5½mm. Lyserød krone. 400-2100m. V-sVI. TA,PR,ME,KY,KH,ER.

V. olenaea Boiss.& Heldr. 5-15cm. Jordstænglen 4-10mm tyk. Nedre blade rude- eller ægformede, ofte tredelte. Kronen katostfarvet. Frugten 3-4mm. 1600-2200m. VI-VII. ME,OL,KY,KH,ER.

V. crinii Orph. ssp. crinii 6-13cm. Jordstænglen ca. 3mm tyk. Nedre blade æg- til hjærteformede, hele. Kronen hvid eller blegrød. Frugten 4-5mm. 1200-2300m. VI-VII. KH (Styx-kløften).

Fedia cornucopiae (L.) Gaertner Læbebaldrian. 10-30cm. Glat og noget kødet, flere gange grenet plante med spatelformede til elliptiske blade. Blomsterne i tætte knipper på kølleformet opsvulmede stilke. Kronen 8-16mm, m.m. tolæbet. 0-550m. II-IV.

Centranthus. Sporebaldrian.

1. Enårig. I det mindste de øvre blade m.m. delte ..... 2.
Flerårig. Bladene hele 3.
2. Kronrøret ca. 2mm, med udposning midtpå ..... calcitrapae
" 6-8mm, med spore macrosiphon
3. Kronrøret 12-18mm. Bladene linjeformede ..... longiflorus
" 5-11mm. " lancet- til ægformede ruber

Centranthus ruber (L.) DC. Rød sporebaldrian. 30-80cm. Glat og blågrøn flerårig. 0-1200m. V-VIII. 2 underarter:
ssp. ruber: De større blade ægformet trekantede og spidse, 7-12 cm. Sporen 4-7mm. Forvildet fra dyrkning ?
ssp. sibthorpii (Heldr.& Sart.) Hayek: Alle blade lancetformede og butte. Sporen 2-12mm.

C. longiflorus Steven ssp. junceus (Boiss.& Heldr.) Richardson Sivagtig sporebaldrian. 40-150cm. Bladene 4-10cm, indtil 2mm brede. Sporen 10-14mm.

C. calcitrapae (L.) DC. Fliget sporebladrian. 4-40cm. Bladene fjerfligede. En enkelt, endestillet halvskærm. Kronen lyserød. Planten ofte rødlig. 0-1750m. III-VI.

C. macrosiphon Boiss. Sommerbladrian. 20-40cm. Stænglen rørformet opsvulmet. Bladene ægformede, de nedre hele, de øverste med delt grund. Flere halvskærme. 0-300m. III-VI. Forvildet.

DIPSACACEAE

1. Blomsterne kransstillede i aks. Tornede blade ..... Morina
" i hoveder 2.
2. Stænglen tornet ..... Dipsacus
" ikke tornet 3.

3. Kronen 4-delt ..... 4.
" 5-delt 5.
4. Svøbbladene taglagte i over 3 rækker ..... Cephalaria
" anderledes Knautia
5. Bægerbørsterne ikke fjerhårede ..... Scabiosa
" fjerhårede 6.
6. Frugten med 8 længdefurer i hele sin længde .. Pterocephalus
" " 8 gruber øverst, furet nedenunder Tremastelma

Morina persica L. Parisertårn. 40-100cm. Flerårig med kransstillede, lancetformede, tidselagtige blade på 8-20x1-2½cm. Langtornede støtteblade. Blomsterne lyserøde, 4-5½cm, 5-delte, tolæbede. Kronrøret ca. 3cm. 1300-1900m. mVI-VIII. TA,KY,KH,ER.

Cephalaria ambrosioides (Sm.) R.& Sch. -150cm. Flerårig. Bladene fjersnitdelte, m.m. dunede eller silkehårede. Kronen gul. Kurvbundens avner 12-15mm. 4 bægerbørster på ¼-½ x frugten.

Dipsacus fullonum L. Gærdekartebolle. 0-1400m. VI-VIII.

Knautia integrifolia (L.) Bertol. Enårig blåhat. 20-80cm. Enårig. Grundbladene omvendt æg-lancetformede, hele eller noget delte; de øvre linjeformede og hele. Kurvsvøbet bredt tragtformet. Kronen lyst blålilla. 0-1200m. VI-VIII.

K. orientalis L. Nær foregående, men kurvsvøbet cylindrisk i blomst, med 8-10 svøbblade og 5-10 rødlilla blomster.

Pterocephalus plumosus (L.) Coulter (P. papposus) Enårig fjerhovede. 20-60cm. Enårig. Tæt kirteldunet. Grundbladene hele eller lyreformede, stængelbladene smalfligede. Frugten 4-6mm, uden krave, med 11-12 bægerbørster på 9-11mm. V-VIII. 0-1350m.

P. perennis Coulter ssp. perennis Flerårigt fjerhovede. -12cm. Bladene hele til fligede, 2-7cm, gråbunede til hviduldne. Frugten 3-4mm, med en krave af korte fjerbørster på ca. 2mm. Bægeret med 14-18 fjerbørster på 10-15mm. 900-2200m. TA,PR,ME,OL,KY,KH,ER

Scabiosa. Skabiose.

1. Frugten længdefuret, uden gruber foroven ..... 2.
" med 8 gruber foroven 5.
2. Frugtens ribber bredere øverst, kraven 8-året atropurpurea
" " ej " " , " med 20-24 årer 3.
3. Enårig. Kronen rødlilla ..... tenuis
Flerårig 4.
4. Stængelbladenes endeafsnit meget bredere end sideafsnittene ..... taygetea
Stængelbladenes flige m.m. lige brede webbiana
5. Alle blade hele ..... 6.
Alle eller mange blade delte 7.
6. Bladene linjeformede, 5-8cm x 2-4mm ..... graminifolia
" 1-2 x så lange som brede minoana
7. Enårig ..... sicula
Flerårig 8.
8. Bægerbørsterne kortere end frugtens krave ..... hymettia
" længere " " " 9.
9. Stænglen urteagtig. Øvre blade helrandede ..... argentea
" forveddet nederst. Øvre blade fligede crenata

Scabiosa minoana (Davis) Greuter 10-30cm. Bladene elliptiske til rundagtige, med lange lige og korte kroghår. 450-1500m.

S. hymettia Boiss.& Spr. Ca. 25cm. Bladene dybt 3-5-delte undtagen de laveste. Svøbbladene ægformede og butte.

S. crenata Cyr. Okseøjeskabiose. 3-25cm. Nedre blade spatelformede og tandede, øvre 1-2 x fligede. Kronen lyserød. 600-2000m. ssp. crenata: Stænglen over 12cm, bebladet. TA,KH,PN. VI-VIII. ssp. breviscapa (Boiss.& Heldr.) Hayek: 3-10cm. Alle blade grundstillede, hviduldne eller tæt grønt hårede. TA,PR.

Scabiosa graminifolia L. Græsbladet skabiose. 20-30cm. Sølvagtigt silkehåret. Hviduldne kurvstilke. Kronen mest blålilla. Bægerbørsterne ca. = kraven. 1800-2200m. VII-VIII. KH.

S. argentea L. Hvid skabiose. 30-70cm. Dunet til halvglat. Kurven 1½-2½cm bred. Kronen hvidgul, gul eller lyst rødgul. Bægerbørsterne 2-4 x kraven. 0-800m. VII-IX.

S. sicula L. 20-40cm. Kortdunet med enkelte lange hår. Nedre blade spatelformede, øvre fligede. Hovederne rødlige, 1-1½cm brede. Svøbbladene smalle, ca. 2 x blomsterne. 0-1050m. III-VI.

S. atropurpurea L. ssp. maritima (L.) Arc. Vejskabiose. 20-60 cm. Mest toårig. Kronen blå- til rødlilla. Nedre blade hele til lyreformede, øvre fligede. Frugthovederne noget aflange. IV-XI.

S. tenuis Spruner Purpurskabiose. 10-70cm. Let dunet, mest grenet. Grundbladene omvendt lancetformede, de øvre 2 x fligede, fligene ½-1mm brede. Bægerbørsterne 5-12mm.

S. taygetea Boiss.& Heldr. ssp. taygetea Gulfiltet skabiose. -60cm. Bladene tæt hvid- til gulliguldne. Kronen gul eller lyserød. 1200-2300m. mVII-sVIII. TA,PR,KH,ER.

S. webbiana D.Don Golde rosetters blade ægformede, tandede til fligede. Tæt uldhårede blade. Blomsterne gule til hvidlige. Randkronerne en smule længere end midterkronerne. PR,KH,ER.900-2100m.

Tremastelma palaestinum (L.) Janchen Tibørstet skabiose. 20-50 cm. Enårig. Kurvene blålilla, ydre blomster forøgede. 10 bægerbørster. Smalfligede stængelblade. 0-1200m. IV-V.

CAMPANULACEAE

1. Kronen uregelmæssig, tolæbet ..... Solenopsis
   " regelmæssig 2.
2. Kronen delt næsten til grunden ..... Asyneuma
   " højst ¾ delt 3.
3. Frugtknude og kapsel smal og prismatisk ..... Legousia
   " " " anderledes 4.
4. Kronrøret højst 2mm bredt. Udragende griffel .... Trachelium
   " over 3mm bredt. Griflen højst lidt udragende Campanula + Edraianthus

Campanula. Klokkeblomst.

1. Enårige ..... 2.
   2-flerårige 4.
2. Blomsterne langstilkede ..... ramosissima
   " kortstilkede eller siddende 3.
3. Blomsterne m.m. siddende. Kronen 3-5mm, blå og gul .. erinus
   " m.m. stilkede. " 10-16mm drabifolia
4. Bægeret med vedhæng mellem tænderne ..... 5.
   " uden " " " 13.
5. 3 støvfang ..... 6.
   5 " 8.
6. Rosetplante med grundstillet blomst ..... papillosa
   Med bladet stængel 7.
7. Blomsterstanden hovedformet ..... lingulata
   " ikke hovedformet rupestris
8. Grundbladene hjærteformede ..... topaliana
   " ikke hjærteformede 9.
9. Bladene læderagtige, svagt dunede til glatte ..... saxatilis
   " ikke læderagtige, dunede til filtede 10.
10. Stænglen med lange grene ..... andrewsii
    " uden eller med korte grene 11.
11. Bægervedhængene ca. = frugtknuden. Kronen 8-10mm topaliana
    " meget små. Kronen 12-30mm 12.
12. Grundbladene mindst 6cm. Blå krone ..... anchusiflora
    " sj. over 5cm. Kronen noget lilla celsii

13. Blomsterne siddende, i hoveder ..... 14.
" stilkede eller i aks 16.
14. Enstænglet ..... glomerata
Flerstænglet 15.
15. Øvre blade med tilsmalnet grund ... Edraianthus parnassicus
" " " hjærteformet grund stenosiphon
16. Kronen højst 10mm. Stænglerne 5-10cm, liggende ... radicosa
" 12-30mm. Stænglerne større 17.
17. Mellemste stængelblade ægformede eller bredere ..... 18.
" " lancetformede eller smallere 19.
18. Kronen ensfarvet. Planten stivhåret ..... trachelium
" med mørk grund. Mest glat versicolor
19. Stænglen kraftig og furet ..... aizoon
" spinkel, ikke furet 20.
20. Kapslen nikkende. Kronen 1/4-1/3 delt ..... albanica
" opret. Kronen 2/5-1/2 delt 21.
21. Med rodknold. Stænglen opstigende til liggende .. spatulata
Uden " . " opret eller kort opstigende patula

Campanula aizoon Boiss.& Spr. ssp. aizoides (Greuter) Fedorov 10-20(-60)cm. Mange, smalt tragtformede, blå blomster på 10-13mm, oprette i en stiv, kegleformet top. 1600-2400m. sVI-VIII. KH.

C. ramosissima Sm. Spejlklokke. 10-40cm. M.m. håret. Frugtknuden tæthåret. Kronen 1-3cm, 2/3 delt. 50-300m. V-VII.

C. spatulata Sm. 10-50cm. Grundbladene omvendt lancetformede. Bægertænderne med 2-4 små kirteltænder nederst. Kronen ca. ½ delt, blåliglilla. 100-2500m. IV-VIII. 2 underarter:
ssp. spatulata: 5-25cm. Mest 1-blomstret. Mellemste stængelblade mest aflangt-elliptiske eller omvendt ægformede. Kronen 12-25mm. Bægertænderne 2-3 x frugtknuden. 1300-2500m. TA,PR,OL,KY,KH,ER.
ssp. spruneriana (Hampe) Hayek: 15-50cm. Med 1-5 blomster. Mellemste stængelblade mest lancetformede. Kronen 25-30mm. Bægertænderne 3-6 x frugtknuden. -1200m.

C. patula L. Engklokke. 30-50cm. Grundbladene omvendt ægformede. Bægertænderne med 1-2 kirteltænder nederst. Kronen 20-25 (14-29)mm, blålig, mest 2/5 delt. 300-1800m. V-VIII.

C. andrewsii A.DC. 20-30cm. Mangestænglet toårig. Grundbladene m.m. lyreformede; nedre blade ligeså, med ægformet, savtakket endeafsnit. Kronen rørformet, lilla. 2 underarter:
ssp. andrewsii: Bægervedhængene så lange som frugtknuden. Bægeret dunet. Kronen 15-23mm. NØ-Pelop.
ssp. hirsutula Phitos: Bægervedhængene meget korte. Bægeret håret. Kronen 14-16(12-19)mm. SØ-Pelop.

C. topaliana Beauverd 20-40cm. Bægervedhængene ca. = frugtknuden. Kronen rørformet med oprette til lidt udstående lapper.
ssp. topaliana: Stænglerne mest ugrenede. Grundbladene lyreformede med ægformet endeafsnit. Kronen 8-10(6-12)mm. N-Pelop.
ssp. cordifolia Phitos: Stænglerne grenede eller ugrenede. Grundbladene hjærte- eller noget lyreformede. Kronen 13-15(12-19)mm.

C. celsii A.DC. 20-30cm. Stænglerne grenede og bugtede. Grundbladene med ægformet spids, rundtakket endeafsnit. Bægervedhængene meget små. Kronen 18-30mm, rørformet.

C. anchusiflora Sm. Kortdunet. Midterstænglen meget lang, kraftig og opret. Grundbladene store, lyreformede, savtakkede. Meget små bægervedhæng. Kronen 12-15mm, rørformet, svagt dunet, blå.

C. saxatilis L. ssp. cytherea Rech.f.& Phitos 20cm. Stænglerne meget bugtede, skøre. Grundbladene omvendt lancetformede. Få rørformede, fløjlshårede, bredt rørformede blomster på 14-19 (10-23)mm. Meget korte bægervedhæng. Kythæra og Antikythæra.

C. rupestris Sm. Bladene gråfiltede til -lådne. Grundbladene lyre- eller ægformede med rund endelap. Bægervedhænget af frugt-

knudens længde. Kronen 13-15mm, fløjlshåret.

Campanula lingulata W.& K. Tungeklokke. 20-30cm. 1-flere udelte stængler. Stivhåret toårig. Grundbladene aflangt spatelformede. Blomsterne 20-25mm, 1/5 delte, spidstandede. 0-1900m. IV-VI.

C. papillosa Hal. Lille rosetplante med udløbere. Bladene 5-10 x 3-4½mm. Blomsterne ca. 12mm, 1/3 delte, enlige og siddende midt i rosetten. 1950-2200m. VIII. TA (Megala Zonaria).

C. stenosiphon Boiss.& Heldr. 15-30cm. Stivbørstet. Øvre stængelblade aflangt-ægformede. Hovedet med 2-7 blomster. 2-3-blomstrede knipper i bladhjørnerne. Kronen 20mm, lilla.

C. glomerata L. Nøgleblomstret klokke. 1500-2300m. VII-VIII. Synes mest at tilhøre ssp. elliptica (Kit.) O.Schwarz.

C. versicolor Andrews Mørkøjet klokke. 20-40cm. Nedre blade læderagtige, ægformede, ofte med hjærteformet grund. Klasen tæt. Kronen 15-25mm. 0-400m. VI-VII.

C. radicosa Bory & Chaub. 3-10cm. Stængelbladene 5-10mm, omvendt æg- til lancetformede, oftest savtakkede. Blomsterne ½ delte, enlige i bladhjørnerne, 2-4 sammen øverst. 1700-2400m. TA,KY,ER.

C. drabifolia Sm. 5-20cm. Stivhåret og gaffelgrenet. Bladene aflange, 15-25mm, de øvre ofte ujævnt 3-5-delte. Kronen blålilla med lyseblåt rør. III-V.

C. erinus L. Museklokke. 5-25cm. Gaffelgrenet og stivhåret. Bladene 1-2cm, omvendt ægformede med 2-3 par tænder, ofte modsatte. Kronen rørformet med hjulformet krave. 0-1350m. III-V.

C. trachelium L. ssp. athoa (Boiss.& Heldr.) Hayek Nældeklokke. Blomsterne 15-20mm, m.m. siddende. 0-1600m. VI-X.

C. albanica Witasek 8-15(-24)cm. Grundbladene hjærteformede og savtakkede, væk under blomstringen. Stængelbladene smalle, m.m. helrandede. Stænglen med 1(-3) blomster på 14-18mm. 1300-2600m. sVI-fIX. KY,KH. (C. rotundifolia p.p.).

Legousia. Spejlblomst. Enårige, blå- til rødlillablomstrede urter med smalle, prismatiske frugtknuder, der er kortstilkede og m.m. oprette. Kronen ikke meget længere end de smalle bægerflige.

1. Blomsterne i et smalt aks ..... falcata
" i en top eller i små nøgler 2.
2. Kronen ca. ½ x bægertænderne ..... hybrida
" mindst så lang som bægertænderne 3.
3. Bægertænderne næsten = frugtknuden i blomst speculum-veneris
" 1/3-1/2 x " " " pentagonia

Legousia falcata (Ten.) Fritsch Seglspejlblomst. 10-40cm. M.m. dunet. Bladene svagt bølgede. Kronen ca. 1/3 x bægertænderne. Kapslen 15-20mm. 0-1400m. IV-VI.

L. hybrida (L.) Delarbre Liden spejlblomst. 10-25cm. Kort stivhåret. Bladene stærkt bølgede. Blomsterne mest i små nøgler. Bægerfligene ca. ½ x frugtknuden i blomst. 650-1800m. III-VI.

L. speculum-veneris (L.) Chaix Alm. spejlblomst. 10-30cm. Dunet. Bladene næppe bølgede. Mange blomster i en ofte stor top. Kapslen 10-15mm. Kronen ca. 10mm. 0-1300m. IV-VII.

L. pentagonia (L.) Druce Låddenbægret spejlblomst. Som foregående, men kapslen 20-30mm. Kronen 15-18mm. 0-1600m. IV-VII.

Trachelium asperuloides (Boiss.& Orph. (Campanula a.) Lav krophals. -3cm. Pudeformet flerårig. Bladene indtil 5mm, helrandede, rundagtige til bredt spatelformede, skinnende. 1-5 lilla blomster i de øvre bladhjørner. Kronrøret ca. 6mm. 490-1700m. sVI-VII. KH (Styx), TA (Langada-kløften), PR.

Asyneuma limonifolium (L.) Janchen Bølget stråleklokke. 10-100

cm. Flerårig. Bladene smalt lancetformede, de fleste grundstillede. Blomsterne m.m. siddende, 5-6 sammen, med udspærrede, linjeformede flige, der giver planten et liljeblomstret præg. 0-2650m. V-VIII. TA,PR,ME,OL,KY,KH,ER,PN.

Edraianthus parnassicus (Boiss.& Spr.) Hal. 5-30cm. Grundbladene 3-6x½-1¼cm, tandede. Endestillede 1-6-blomstrede hoveder med brede svøbblade under sig med hvidlig grund. Kronen 12-20mm, lilla. 1500-2500m. mVI-VII. ER.

Solenopsis laurentia (L.) C.Presl (Laurentia gasparrinii) Stilklobelie. 2-5cm. 1-flerårig plante med eller uden roset. Spatelformede blade. Blå til hvide blomster på 8-11mm med hvidgult svælg. Over- og underlæbe dybt 2- og 3-delte. 0-1000m. V-VIII.

COMPOSITAE

1. Skivekronerne rørformede ..... 2.
" tungeformede 76.
2. Bladranden tornet ..... 3.
" ikke tornet 20.
3. Enkeltblomstrede kurve i kugleformede hoveder ..... Echinops
Kurvene flerblomstrede 4.
4. Fnokken ikke fjerformet ..... 5.
" fjerformet 12.
5. Blomsterne blå ..... 6.
" ikke blå 7.
6. Mange små kurve i halvskærm ..... Cardopatum
Stænglen med 1 kurv Carduncellus
7. Ydre kurvsvøbblade bladagtige ..... Carthamus
" " ikke bladagtige 8.
8. Kronen gul ..... Cnicus
" rødlilla eller hvid 9.
9. Svøbbladene med et tandet vedhæng. Hvidbrogede blade Silybum
" stort set helrandede (evt. frynset-tornede) 10.
10. Kurvbunden uden børster eller skæl ..... Onopordum
" med " " " 11.
11. Kurvbunden med skæl. Bladene hvidårede ..... Tyrimnus
" " avner Carduus
12. Indre svøbblade skinnende og randkroneagtige, de ydre tornfligede ..... Carlina
Svøbbladene anderledes 13.
13. Randkronerne større end midterkronerne ..... Galactites
Alle kroner lige store 14.
14. Kurvbunden kødet. Kurven 4-6cm bred ..... Cynara
" ikke kødet 15.
15. Frugten håret. Ydre svøbblade stærkt fjerfligede Atractylis
" glat 16.
16. Bladranden finttornet mellem de store torne ..... 17.
" helrandet " " " " 19.
17. Bladoversiden hvidåret ..... Notobasis
" grøn 18.
18. Svøbbladene med et krummet, fjerfliget vedhæng ... Picnomon
" uden " " " " Cirsium
19. Bladene hvidårede, stærkt tornede ..... Ptilostemon
" næppe hvidårede, mindre tornede Lamyropsis
20. Hanblomsterne i særlige kurve; hunblomsterne 1-2 sammen i bladhjørnerne. Store, tornede frugter ..... Xanthium
Kurvene ens 21.
21. Bladene overvejende modsatte ..... 22.
" " spredte 24.
22. Med randkroner. Fjersnitdelte blade ..... Tagetes
Uden " 23.
23. Bladene trekoblede ..... Bidens
" lancetformede Flaveria
24. Med tydeligt synlige, tungeformede randkroner ..... 25.
Tungekroner mangler eller af skivekronernes længde 47.

25. Kurvbunden med avner ..... 26.
" uden avner 32.
26. Nedre blade fjersnitdelte ..... 27.
Bladene hele 30.
27. Små kurve i tæt halvskærm ..... Achillea
Mellemstore kurve i åben stand eller enlige 28.
28. Skivekronerne med udposet grund ..... Chamaemelum
" uden " " 29.
29. De ydre frugter med 2 brede vinger ..... Anacyclus
Frugterne uvingede Anthemis
30. Store kurve. Kurvbunden flad til lidt hvælvet Helianthus
Mellemstore kurve. Kurvbunden hvælvet 31.
31. De ydre svøbblade bladagtige og tornspidsede .... Pallenis
" " " " " butte Asteriscus
32. Randkronerne hvide, lyserøde eller lilla ..... 33.
" gule (evt. hvide i den ydre halvdel) 39.
33. Bladene fjersnitdelte ..... 34.
" hele 35.
34. Bladene med brede afsnit ..... Tanacetum
" " trådformede afsnit 35.
35. Kurvbunden halvkugleformet og fyldt ..... Tripleurospermum
" kegleformet og hul Matricaria
36. 1 række svøbblade. Enårig dværgrosetplante ..... Bellium
2-flere rækker svøbblade 37.
37. Med hårformet fnok ..... Aster
Uden " " 38.
38. Stængelbladene med tilsmalnet grund eller manglende Bellis
" " omfattende " Coleostephus
39. Uden hårformet fnok ..... 40.
Med " " 42.
40. Frugterne store, stærkt krummede, med tornet eller rynket ryg ..... Calendula
Frugterne ikke krummede 41.
41. Indre frugter med en krave øverst ..... Coleostephus
Frugterne uden nogen " " Chrysanthemum
42. Blomsterstænglerne kun med skælblade ..... Tussilago
" bladede 43.
43. 1 række svøbblade, ofte med små ekstrasvøbblade .. Senecio
2-flere rækker svøbblade 44.
44. Bladene med hjærteformet grund ..... Doronicum
" uden " " 45.
45. 6-12 randkroner ..... Solidago
Mange " 46.
46. 1 række fnokhår + en række små, ydre skæl ..... Pulicaria
1 " " Inula
47. Kronernes tænder flere x længere end brede. Kronrøret brat ellipsoidisk udvidet et stykke under kronfligene. (Tidselgruppen) ..... 48.
Kronernes tænder kortere og kronrøret mere jævnt udvidet 57.
48. Kurvsvøbbladene med et vedhæng ..... Centaurea
" uden noget vedhæng 49.
49. Bladene hele ..... 50.
" eller nogle af dem delte 53.
50. Store blade med hjærteformet grund ..... Arctium
Æg- til lancetformede blade 51.
51. Svøbbladene helt hindeagtige ..... Xeranthemum
" urteagtige 52.
52. Kurvene med 1-2 blomster, 8-10x2mm. Busk ..... Staehelina
" mangeblomstrede og ægformede Ptilostemon
53. Blomsterne blå ..... Cynara scolymus
" rødlilla til lyserøde 54.
54. Kurvsvøbbladene bredt hindekantede .. Centaurea amplifolia
" ikke " 55.
55. Svøbbl. ægformede med sort spids og kort brod Mantisalca
Kurvsvøbbladene m.m. lancetformede 56.

56. Fnokhårene først gyldenbrune, siden sorte ..... Crupina
" hvide Jurinea
57. Bladene fligede ..... 58.
" hele 63.
58. 1 række svøbblade + nogle små ekstrasvøbblade ..... Senecio
2-flere rækker svøbblade 59.
59. Kurvene 4-7mm brede, nikkende som modne ..... Artemisia
" bredere og oprette 60.
60. De nedre grene forveddede ..... Santolina
Grenene ikke forveddede 61.
61. Ydre frugter med 2 brede vinger. Enårig ..... Anacyclus
Frugterne uvingede 62.
62. 2 rækker svøbblade. Glat enårig ..... Cotula
Flere rækker svøbblade Anthemis
63. Kronerne rødlilla ..... Xeranthemum
" ikke rødlilla 64.
64. Planten hvid- eller gråfiltet, i det mindste på bladundersiderne ..... 65.
Planten grøn 73.
65. Svøbbladene m.m. glatte ..... 66.
" m.m. lådne 69.
66. Dværgbuske. Langstilkede, enlige kurve ..... Phagnalon
Urter 67.
67. Kurvsvøbet kraftigt gult eller hvidt ..... Helichrysum
" brunt til gulbrunt 68.
68. Kurvene samlede i puder, omgivne af udstående højblade Evax
" i nøgler Gnaphalium
69. Enårig ..... 70.
Flerårig 71.
70. Kurvene kugleformede ..... Micropus
" pære-kegleformede Filago
71. 1 række kurvsvøbblade + nogle små ekstrasvøbblade Senecio
2-flere rækker kurvsvøbblade 72.
72. Frugten med fnok. Planten ikke kødet ..... Inula
" uden fnok. Kødet strandplante Otanthus
73. Planten glat ..... 74.
" håret 75.
74. Med hårformet fnok ..... Aster
Uden fnok Cotula
75. Kronerne bleggule til hvidlige ..... Conyza
" gule til gulbrune 46.
76. Stængler og blade kraftigt tidselagtigt tornede .. Scolymus
Højst med blødtornede blade 77.
77. Frugten uden fnok ..... 78.
" med hår-, fjer- eller skælformet fnok 79.
78. Frugterne lange og stjærneformet udstående .... Rhagadiolus
" korte, ikke " " Lapsana
79. I hvert fald de indre frugter med fjerformet fnok ..... 80.
Frugterne med hår- eller skælformet fnok 86.
80. Bladene ligestrengede og helrandede ..... 81.
" anderledes 82.
81. Flere rækker kurvsvøbblade ..... Scorzonera
1 række kurvsvøbblade Tragopogon
82. Kurvbunden med avner ..... Hypochoeris
" uden avner 83.
83. 1 række kurvsvøbblade ..... Urospermum
Flere rækker kurvsvøbblade 84.
84. Alle blade i roset ..... Leontodon
Med stængelblade 85.
85. Frugterne længdestribede ..... Scorzonera
" tværrynkede Picris
86. Frugten stærkt sammentrykt ..... 87.
" ikke " 90.
87. Frugten uden næb ..... Sonchus
" med " 88.

88. 2 rækker kurvsvøbblade ..... Mycelis
Flere rækker kurvsvøbblade 89.
89. Kurvsvøbet over 5mm bredt, rødbrunt anløbent Streptorhamphus
" smallere, ikke " " Lactuca
90. Blomsterne blå ..... Cichorium
" ikke blå 91.
91. Kurvsvøbbladene hindeagtige ..... Catananche
" overvejende urteagtige 92.
92. Fnokhårene m.m. børsteagtige; ofte med fnokskæl ..... 93.
Fnokken hårformet, aldrig skælagtig 95.
93. Stænglerne bladløse ..... Hyoseris
" bladede 94.
94. Svøbbladene butte, i mange rækker ..... Hymenonema
" spidse, i 2 rækker Hedypnois
95. Frugterne stærkt tværrynkede ..... Reichardia
" ikke " 96.
96. Stænglerne ugrenede, bladløse, hule, tyndvæggede Taraxacum
" anderledes 97.
97. Kurvbunden langhåret. Kurven tæt stjærnefiltet .... Andryala
" ikke langhåret 98.
98. Flere rækker taglagte kurvsvøbblade ..... 99.
2 rækker kurvsvøbblade 100.
99. Frugten tilsmalnet foroven. Med rodknolde ..... Aetheorhiza
" afskåret foroven. Uden " Hieracium
100. En krone øverst på frugten under næbbet ..... Chondrilla
Frugten uden krone under det eventuelle næb 101.
101. Frugten tilsmalnet foroven eller med næb ..... Crepis
" afskåret " Tolpis

Solidago virgaurea L. Alm. Gyldenris. 500-1900m. VII-IX. KH.

Bellis annua L. Enårig tusindfryd. 5-12cm. Halvglat til stivhåret enårig med mest bladede stængler og uden bladroset. Kurvene 5-15mm brede. 0-800m. II-V.

B. perennis L. Alm. tusindfryd. Bladene med 1 ribbe, brat tilsmalnede i stilken. I-XII (mest III-VII). TA,OL,KY,ER.

B. silvestris Cyr. Mørk tusindfryd. 10-30cm. Flerårig rosetplante. Bladene mørkegrønne, 3-ribbede, aflangt spatelformede, jævnt tilsmalnede i stilken. Kurvene 2-4cm brede. 0-1400m. IX-VI.

Bellium minutum (L.) L. Liden dværgtusindfryd. 5-10cm. Svagt dunet rosetplante. Enårig. Bladene 5-8x3-5mm, elliptisk-ægformede. Talrige, meget tynde kurvstilke. 7-10 svøbblade og 7-10 ikke meget længere randkroner. 0-100m. III-VI.

Aster squamatus (Sprengel) Hieron. Skælasters. 30-80cm. Stærktgrenet enårig. Bladene helrandede, indtil 8x1cm. Talrige små, 8 mm brede kurve med korte, lyslilla randkroner. 0-800m. IX-X.

A. alpinus L. Alpeasters. 5-14cm. Flerårig med utydelig bladroset. Nedre blade spatelformede, 2-6cm, kortdunede. Stænglen med 1 kurv med lyslilla randkroner. 1400-2450m. VII-VIII. KY,KH.

A. tripolium L. ssp. pannonicus (Jacq.) Soó Strandasters. IV-XI.

Conyza. Bakkestjærne.

1. Kurvsvøbet næsten helt glat. Bladene grønne ..... canadensis
" som regel håret. Bladene grågrønne, m.m. dunede 2.
2. Mellemste blade 1-strengede, mest 2-4mm brede ... bonariensis
" " fjerstrengede, 5-15mm brede albida

Conyza canadensis (L.) Cronq. Kanadisk bakkestjærne. VI-X.

C. bonariensis (L.) Cronq. Håret bakkestjærne. 10-60cm. Ligner den foregående, men ofte noget tættere håret. Mellemste blade

linjeformede, sjældent over 6mm brede. 0-600m. VI-IX.

Conyza albida Willd. Høj bakkestjærne. 50-150cm. Nær den foregående, men lidt mere grågrøn. Mellemste blade lancetformede, 7-20mm brede, tandede. 0-600m. VI-IX.

Filago. Museurt.

1. Svøbbladene svagt butte, stjærneformet udstående i frugt 2.
" spidse til brodspidsede, højst lidt udstående i frugt 3.
2. Stænglen klaseagtigt grenet ..... arvensis
" gaffelgrenet gallica
3. Bladene bredest i nedre halvdel ..... 4.
" " " øvre " 5.
4. Svøbbladene med en lang, gul stak, ofte rødrandede vulgaris
" " " kort stak, ikke rødfarvede eriocephala
5. Kurvene 5-kantede i tværsnit ..... pyramidata
" m.m. trinde 6.
6. Svøbbladene m.m. stive, de midterste helt filtede .. aegaea
" ikke stive, " " glatrandede cretensis

Filago vulgaris Lam. Kuglemuseurt. 200-1050m. IV-VI.

F. eriocephala Guss. Uldhovedet museurt. 10-20cm. Kurvene 4x2 mm, den øvre halvdel rager frem fra filten. Nøglerne 9-17x10-12 mm. 0-1250m. IV-VI.

F. aegaea Wagenitz 1-6cm. Grålighvid. Nøglerne 7-10x8-12mm. Svøbet helt filtet i øvre halvdel, indadbøjet i frugt. III-VI.
ssp. aegaea: Stænglen meget kort. Svøbbladenes stak 0,2-0,5mm.
ssp. aristata Wagenitz: 1-6cm. Svøbbladenes stak ½-1mm.

F. cretensis Gand. ssp. cycladum Wagenitz Stænglen meget kort. Bladene efterhånden glatte ovenpå. Nøglerne 4-6mm brede. Svøbbladene brune til brunlilla, ikke indbøjede i frugt. IV-VI.

F. pyramidata L. Bredbladet museurt. 5-30cm. Gråhvidt filtet. Bladene 10-15mm, afrundede. Nøglerne med 12-20 kurve, der ofte overrages af højbladene. Lang, strågul stak på 1-1½mm. IV-VI.

F. arvensis L. Agermuseurt. 1500-2100m. V-VII.

F. gallica L. Spidsbladet museurt. 2-25cm. Grålig. Bladene spidse. Svøbbladene udtrukne i en lang, but spids. 0-700m. IV-V.

Evax pygmaea (L.) Brot. Alm. pudekurv. 2-4cm. Hvidfiltet enårig. Bladene spatelformede og butte. Højbladene 2-3 x nøglerne, der danner en skive på 1-2cm. Højbladene udstående. Kurvsvøbbladene brungule med en stak på 1-1½mm. 0-1150m. III-VI.

E. contracta Boiss. Opret pudekurv. 1-4cm. Gråfiltet enårig. Rosetbladene 15-30mm, spidse, oprette, ca. 4 x nøglerne. Kurvsvøbbladenes stak ½mm. 200-1150m. III-V.

Micropus erectus L. Fureblomst. 5-20cm. Gråhvidt uldhåret enårig. Bladene 10-18mm, m.m. bølgede i randen. Kurvnøglerne 8-10 mm brede, oftest omgivne af længere højblade. 5-8 indre svøbblade på 2-3mm i frugt. 0-1400m. V-VII.

Gnaphalium roeseri Boiss.& Heldr. ssp. roeseri 6-15cm. Bladene mest grundstillede, 2-5cm x 2½-6mm. Flerårig. 3-8 kurve. Kurvsvøbet stjærneformet i frugt, brunligt hindekantet mod spidsen. 1800-2200m. VII-VIII. TA,KH.

G. luteo-album L. Gulhvid evighedsblomst. 5-30cm. Hvidfiltet enårig. Bladene spidse, 1-ribbede, 10-25x2-5mm. Svøbbladene gullige og glatte. Nøglerne uden højblade omkring sig. IV-X.

Helichrysum. Evighedsblomst.

1. Kurvsvøbbladene hvide ..... taenari
" gule 2.

2. Bladene m.m. flade, uden omrullet rand ..... orientale
" smalt linjeformede, med m.m. omrullet rand 3.
3. Kurvene æg- til kugleformede før blomstring ..... stoechas
" cylindriske til smalt klokkeformede før blomstring italicum

Helichrysum taenari Rothm. 10-30cm. Grundbladene 15-50x4-8mm, grågrønne. Halvskærmen består af 8-18 m.m. kugleformede kurve. 300m. Mani-halvøen: kløften mellem Porto Kagio og Lagia.

H. stoechas (L.) Moench ssp. barrelieri (Ten.) Nyman (H. conglobatum) Kugleevighedsblomst. 10-50cm. Bladene 12-25mm. Kurvene 4-6mm brede. 0-1100m. IV-VI.

H. italicum (Roth) G.Don f. Smalbladet evighedsblomst. 25-40cm. Med ubehagelig lugt. Golde skud uden bladknipper. Nedre blade mest 2-5cm. Kurvene 2-3mm brede. 0-800m. V-IX.

H. orientale (L.) Gaertner 12-30cm. Grundbladene 2-6cm, aflangt spatelformede, butte, tilsmalnede i en lang stilk. Kurvene 7-10 mm brede. 0-1150m. III-VII.

Phagnalon. Stenkurv. Buske med brunskællede kurve, op til 30-40 cm. Bladene med en tæt uldhåret underside.

P. graecum Boiss.& Heldr. Bugtet stenkurv. Svøbbladene ikke bølgede, de ydre butte, ægformede til trekantede. Bladene 3-4mm brede, bugtet-tandede eller stærkt indbugtede. 0-1150m. III-VI.

P. saxatile (L.) Cass. ssp. methanaeum Smalbladet stenkurv. Mellemste svøbblade med bølget rand, spidse. Bladene 2-3mm brede. 0-600m. III-VI.

Inula. Alant.

1. Klæbrigt kirtlet ..... 2.
Ikke klæbrigt kirtlet 3.
2. Enårig ..... graveolens
Flerårig viscosa
3. Bladene glatte og kødede, m.m. linjeformede .... crithmoides
" hårede, ikke kødede, bredere 4.
4. Med lange randkroner ..... oculus-christi
" korte " 5.
5. Bladene dunede, kun svagt ovenpå ..... conyza
Planten m.m. hvidfiltet 6.
6. Grundbladene næsten runde ..... rotundifolia
" æg- til lancetformede 7.
7. Svøbbladene med tilbagekrummet spids ..... candida
" " tiltrykt spids 8.
8. Kurvene med 2-4 støtteblade under sig ..... parnassica
" " 0-2 " " " 9.
9. Ydre svøbblade under $\frac{1}{2}$ x de indre ..... methanea
" " over $\frac{1}{2}$ x " " limonella

Inula oculus-christi L. Kristøjealant. 15-60cm. Bladene silkeuldne, lancetformede, de øvre med noget omfattende grund. Randkronerne gyldent- til orangegule. 500-2000m. VI-VIII.

I. candida (L.) Cass. Hvid alant. 15-40cm. Meget tæt hvidhåret. Butte æg- til lancetformede grundblade. Kurvene 8-9mm, oftest med flere støtteblade under sig. 0-900m. VI-VII. Kythæra.

I. limonella Heldr. (I. candida ssp. l.) -30cm. Meget tæt hvidhåret. Butte, lancetformede grundblade. Kurvene 6-8mm, med 0-1 støtteblade.

I. rotundifolia (Hal.) Greuter Lange, forveddede stængler, tæt besatte med blivende, silkehårede bladgrunde. Blomstrende skud kortere end bladene. Malea.

I. parnassica Boiss.& Heldr. 25-45cm. Randkronerne under 2mm længere end kurvsvøbet. Kurvene 7-10mm, med 2-4 lancetformede

støtteblade under sig. Ydre svøbblade mindst ½ x de indre.

Inula methanea Hausskn. 15-30cm. Kurvene ca. 7mm, med 0-2 små og smalle støtteblade under sig. Randkronerne kortere end kurvsvøbet.

I. conyza DC. Trekløftalant. 50-120cm. Toårig. Kurvene i en top, cylindriske, ca. 1cm brede, med udpræget taglagt og ofte rødspidset svøb. Randkronerne kortere end svøbet.0-1350m.VII-IX.

I. crithmoides L. Strandalant. 40-70cm. Glat halvbusk. Bladene 2-4½cm x 2-4mm, helrandede eller med tretandet spids. Kurvstilkene med mange, skælformede højblade. Strandplante. VII-XI.

I. viscosa (L.) Aiton Klæbrig alant. 40-130cm. Stænglerne oprette, forveddede nederst, stivhårede foroven. Bladene lancetformede, 3-7cm, spidstandede og ru. Oprette svøbblade. VIII-X.

I. graveolens (L.) Desf. Tægealant. 20-50cm. Kamferlugtende, stærktgrenet, mangekurvet enårig. Bladene linjeformede, de nedre lancetformede, m.m. helrandede. Kurvsvøbet 4-7mm. 0-800m.VIII-X.

Pulicaria. Loppeurt.

1. Flerårig. Randkronerne iøjnefaldende ..... 2.
   Enårig. Randkronerne næppe meget længere end kurvsvøbet 3.
2. Med blivende bladroset. 1-få kurve ..... odora
   Ingen " " . Mange kurve dysenterica
3. Bladene linjeformede, 2-3mm brede ..... sicula
   " lancetformede, bredere vulgaris

Pulicaria sicula (L.) Moris Smalbladet loppeurt. 20-45cm. Bladene spidse, ofte med omrullet rand, stive, ikke bølgede. Kurvstilkede fortykkede i frugt. 0-800m. VII-X.

P. vulgaris Gaertner Alm. loppeurt. 7-30cm. Stinkende og krushåret. Bladene lancetformede til elliptiske, bløde og ofte bølgede. Kurvstilkene korte, ofte bladede. 0-800m. VIII-IX.

P. dysenterica (L.) Bernh. Strandloppeurt. 30-70cm. Forekommer her sydpå i en form med mindre kurve end her i lancet. VII-X.

P. odora (L.) Rchb. Knoldloppeurt. 30-90cm. Rosetbladene æglancetformede. Nedre stængelblade ørede, gråludne nedenunder. Kurvene 2-3cm brede og halvkugleformede. 0-1000m. VI-VII.

Pallenis spinosa (L.) Cass. Tornet stjærnesvøb. 30-60cm. 1-2-årig. Grenene rager op over stænglen. Bladene spatel- til lancetformede, brodspidsede, ydre svøbblade ligeledes. V-VIII.

Asteriscus aquaticus (L.) Less. Vandstjærnesvøb. 10-40cm. Opret enårig. Halvskærmformet gaffelgrenet i øvre halvdel. Ydre svøbblade bladagtigt forlængede, længere end de citrongule randkroner. Fugtig eller sandet jord. 0-800m. IV-VII.

Bidens pilosa L. Håret brøndsel. 30-100cm. Med 3(5) savtakkede, lancet- til ægformede småblade. Ingen randkroner. Ydre svøbblade grønlige. 2-3 børster på frugten. 0-300m. VII-X. Indslæbt.

Flaveria bidentis (L.) Ktze. -1m. Bladene 3-strengede. Små, 5-6-blomstrede hoveder, samlede i større grupper for enden af grenene. Hver kurv med 2-4 svøbblade. 0-200m. VII-X. Indslæbt.

Helianthus annuus L. Solsikke. VII-X. Dyrket og forvildet.

Xanthium spinosum L. Tornet brodfrø. 20-80cm. Liggende til opstigende, ofte dunet enårig. Gule, fra grunden 3-kløvede torne i bladhjørnerne. Bladene 3-5-kløvede, hen ad Hjærtespands, mørkegrønne ovenpå, hvid-gråfiltede nedenunder. 0-500m. VIII-IX.

X. strumarium L. Skræppebrodfrø. 30-120cm. Bladene bredt trekantede og håndstrengede, 8-12x7-12cm. Frugten 1½-3½cm, med pigge og 2 større torne i spidsen. 0-800m. VII-X.
ssp. cavanillesii (Schouw) Löve & Dans. har en frugt med meget

Siden indeholder rettelser (november 2016)

tynde og tætte pigge og torne, der er tydeligt længere end piggene. Bladene trekantede og lidet lappede.

Tagetes minuta L. Gulgrøn fløjlsblomst. ½-2m. Opret, aromatisk enårig. Fjersnitdelte blade med savtakkede, lancetformede afsnit. Halvskærme af gulgrønne kurve på 8-12mm med 3-4 svøbblade. 3-4 gulgrønne randkroner på 1-3mm. 0-400m. IX-XI. Forvildet.

T. patula L. Fløjlsblomst. 20-40cm. Kurvene 2-8cm brede med større, kraftigt farvede randkroner. VII-X. Dyrket og forvildet.

Santolina chamaecyparissius L. Cypresurt. 10-50cm. M.m. gråfiltet dværgbusk. Bladene smalle, kamformet tandede til fligede. Langstilkede, halvkugleformede, gule kurve. VII-VIII. Forvildet.

Anthemis. Gåseurt.

1. Frugterne lidt sammentrykte, med rudeformet tværsnit. Bladafsnittene ofte kamfligede ..... 2.
   Frugterne med rundt eller noget kvadratisk tværsnit. Bladafsnittene sjældent kamfligede 7.
2. Enårige ..... 3.
   Flerårige 5.
3. Kurvstilkene fortykkede i frugt ..... altissima
   " ikke fortykkede i frugt 4.
4. Frugterne 2½-3mm, svagt sammentrykte ..... brachmannii
   " 2-2¼mm, sammentrykte segetalis
5. Randkronerne gule ..... tinctoria
   " hvide eller manglende 6.
6. Bladene 1½-2½cm. 10-20cm høj ..... parnassica
   " større. 30-90cm høj triumfetti
7. Flerårig ..... 8.
   Enårig 15.
8. Bladene siddende, med sylformede flige ..... orientalis
   I det mindste de nedre blade stilkede 9.
9. Ihvertfald de ydre avner m.m. tretandede ..... 10.
   Avnerne ikke eller utydeligt " 11.
10. Kurvbunden m.m. spids foroven ..... pindicola
    " m.m. afrundet foroven carpatica
11. Kurvbunden m.m. halvkugleformet, afrundet foroven ..... 12.
    " kegleformet, spids foroven 13.
12. Bladfligene 0,3-0,6mm brede ..... cretica
    " 1-1,5mm brede spruneri
13. Ydre avner svagt hårede på ydersiden ..... tenuiloba
    " " ikke " " " 14.
14. Yderste bladflige 0,3-0,5mm brede ..... panachaica
    " " 0,5-1mm brede pindicola
15. Frugterne valseformede. Ingen randkroner ..... tomentella
    " ikke valseformede. Mest med randkroner 16.
16. Kurvbunden halvkugleformet. Svøbet mest mørkrandet .. chia
    " kegleformet 20.
17. Randkronerne golde (uden griffel) eller manglende ..... 18.
    " med griffel 21.
18. Kurvsvøbet noget cylindrisk. Svøbet næppe hindekantet rigida
    Kurvsvøbet mest halvkugleformet. Svøbbladene ret bredt hindekantede 19.
19. Frugten med en skæv krave øverst ..... peregrina
    " uden krave øverst tomentosa
20. Kurvbundens avner børsteformede. Stinkende plante cotula
    " " bredere. Planten ikke stinkende 17.
21. Frugten med en skæv krave øverst ..... auriculata
    " stort set uden krave 22.
22. Kurvsvøbbladene noget frynsede. Planten mest tiltrykt uldhåret ..... ruthenica
    Kurvsvøbbladene helrandede. Planten glat eller svagt håret arvensis

Anthemis carpatica Willd. Karpatisk gåseurt. 15-25cm. Bladene glatte til svagt silkehårede, 2 x delte, yderste flige 0,5-1,3 mm brede. Svøbbladene med mørk hindekant. Frugten 2,0-2,6mm.

A. cretica L. Bjærggåseurt. 10-25cm. Bladene tæt silkehårede som unge, bladfligene 0,3-0,6mm brede. Svøbbladene med brun eller brunlig hindekant. Frugten 1¾-2½mm. sV-VII.

A. panachaica Hal. -20cm. Stænglerne med gamle bladrester ved grunden. Svøbbladene blegt hindekantede. 1000-1600m. PN.

A. tenuiloba (DC.) Fern. 6-30cm. Bladene m.m. tæt tiltrykt grårårede, fligene ½-2mm brede. Svøbbladene smalt hindekantede. Avnerne butte. Frugten 1-1½mm, lidet ribbet. +/÷ randkroner.

A. spruneri Boiss.& Heldr. 10-35cm. Bladene 2 x delte, silkehårede, fligene 1-1½mm brede. Ingen randkroner. Svøbbladene tæt gråt silkehårede. Frugten 2-2,3mm

A. orientalis (L.) Degen 10-30cm. Bladene kamfligede med mest helrandede flige, der ofte har 1-2 korte lapper ved grunden. Mest uden randkroner. Svøbbladene m.m. glatte, blegt hindekantede. 1100-2000m. VI-VII. TA,PR,KY,KH.

A. pindicola Heldr. 10-25cm. Bladene 2 x delte, fligene ½-1mm brede. Frugten 1,4-2,0mm med en kort, uregelmæssig krave på op til 0,2mm. 1500-2000m. VI-VIII.

A. arvensis L. Agergåseurt. 0-1800m. IV-VI. 2 underarter:
ssp. incrassata (Loisel.) Nyman: Kurvstilkene kølleformede i frugt og noget buede.
ssp. cyllenea (Hal.) Fern.: Frugtstilkene ikke fortykkede. Kurvbunden 3-5½x2-3mm, m.m. sammentrængt til en meget fin spids.

A. ruthenica Bieb. Russisk gåseurt. 10-50cm. Svøbbladene m.m. uldhårede, med en bred, klar hindekant. Kurvbunden meget spids. Kronrøret stærkt opsvulmet og svampet forneden i frugt.

A. auriculata Boiss. Øregåseurt. 8-35cm. Kurvbundens avner med laset spids og en noget stiv brod. Frugten 1½-2mm, kraven ½-1¾ mm. V-VII.

A. peregrina L. 2-30cm. M.m. filtet. Svøbbladene hårede til uldne. Frugterne stribede. 0-300m. V-VI. 2ssp:
ssp. peregrina: Oftest filtet eller uldhåret. Kurvbunden 9½-13 mm bred. Kurvstilkene kølleformede.
ssp. heracleotica (Boiss.& Heldr.) : Tiltrykt dunet. Kurvbunden 6-8mm bred. Kurvstilkene mindre kølleformede.

A. tomentosa L. Filtet gåsefod. Nær den foregaende, men bladfligene bredere. Planten filtet.

A. rigida (Sm.) Boiss.& Heldr. Stiv gåseurt. 3-15cm. Mange, tykke, udstrakte stængler. Kurvstilkene ofte krumme i frugt. Kurvsvøbet forhærdes hurtigt. 0-1600m. II-V. 3 underarter:
ssp. rigida: Ingen randkroner. Unge kurve omvendt kegleformede.
ssp. liguliflora (Hal.) W.Greuter: Med randkroner. Unge kurve omvendt kegleformede, svøbbladene m.m. ens.
ssp. ammanthiformis (W.Greuter & Rech.f.) W.Greuter: Med randkroner.Unge kurve med afrundet grund. Svøbbladene uens og taglagte. (Krydser med ssp. rigida). Kythæra.

A. cotula L. Stinkende gåseurt. Randkronerne uden griffel. Kurvbunden kun med avner i sin øvre halvdel. 0-1300m. VI-IX.

A. chia L. Røllikegåseurt. 5-40cm. Bladfligene vinkelret udstående. Svøbbladene ofte næsten sortrandede. Ydre frugter med en lang, skæv krave. 0-500m. III-IV.

A. tinctoria L. Farvegåseurt. 0-1500m. V-IX.

A. parnassica (Boiss.& Heldr.) Fern. Mange stængler med 0-2 grene, uden blade i øvre ½. Kurvsvøbet 9-13mm bredt. Svøbbladene randhårede. Kraven ¼-½ x frugten. 1200-2300m. VII-VIII.

Anthemis triumfetti (L.) DC. Kamgåseurt. Frugterne med en krave på 1/3-1/2 x frugten. Svøbbladene dunede eller lådne, med en rustfarvet, randhåret spids. 0-1200m. V-VIII.

A. altissima L. Høj gåseurt. 20-120cm. Bladene 2-3 x delte. Ydre svøbblade uden hindekant og spidse, indre med hindekant og butte. Bladfligene brodspidsede. 0-1300m. V-IX.

A. segetalis Ten. Markgåseurt. Ofte liggende med ensidigt opstigende grene. Tæt dunet. Svøbbladene spidse, de indre frynsede. 10-30cm. Frugten med 5-7 striber på hver side. 0-1200m. V-VII.

A. brachmannii Boiss.& Heldr. 20-30cm. Tiltrykt håret. Kurvsvøbet svagt håret, med smal, brun, frynset hindekant. Frugten but firkantet, svagt stribet.

A. tomentella W.Greuter 2-14cm. Spinkel plante. Bladene 1 x delte med hele eller tretandede, lancetformede afsnit. Svøbbladene lancetformede, spidse og silkehårede. 0-1450m. III-V.

Achillea. Røllike.

1. Randkronerne kraftigt gule ..... 2.
" hvide eller evt. bleggule 3.
2. Randkronerne ½-1mm. Kurvstilkene 1-2mm ..... taygetea
" 1½-3mm. " 2-9mm holosericea
3. Kurvene over 30, 1½-4mm brede. Randkronerne 0,8-2,5mm ... 4.
" 1-30, 3½-8mm brede. Randkronerne 2½-4(-5)mm 7.
4. Mellemste stængelblade ca. 5cm brede ..... grandifolia
" " højst 2cm brede 5.
5. Mellemste stængelblade med over 15 par afsnit ..... setacea
" " " højst 10 par afsnit 6.
6. Mellemste stængelblades hovedafsnit regelmæssigt delte nobilis
Mellemste stængelblades hovedafsnit uregelmæssigt delte ligustica
7. Skærmen med 3-7(1-9) kurve ..... umbellata
" " 10-30 kurve fraasii

Achillea umbellata Sm. 5-10cm. Nedre blade 1-3½cm x 5-17mm, 1 x delte med 3-6 par flige; overvejende grundstillede. Kurvstilkene 2-16mm. 1500-2300m. V-VIII. TA,PR,ME,OL,KY,KH,ER,PN.

A. fraasii Sch.Bip. 18-30cm. Nedre blade gråt silkehårede og 2 x fligede med 7-12 par hovedafsnit. Få og små stængelblade, øvre ½ ofte bladløs. 1500-2000m. mVI-VIII. PR,ME,KY,KH,PN.

A. setacea W.& K. Finbladet røllike. 10-35cm. Planten mest tæt langhåret. Stænglen tætbladet. Bladene 12-55x4-7mm, fligene trådtil linjeformede. 1000-2100m. fVII-sVIII. TA,PR,KY,KH.

A. nobilis L. Ædelrøllike. 10-45cm. Bladene 1½-3x1-1½cm, ægtil bredt lancetformede, skaftet let tandet, fligene ca. 1mm brede. Svøbbladene 2-3 x så lange som brede. 1000-2000m. TA,KH.

A. ligustica All. Skarpfliget røllike. 30-90cm. Bladene 2-3x1½ cm, med ægformet omrids, skaftet mest helrandet, fligene ca. 2-3 mm brede. Svøbbladene 3-4 x så lange som brede. 0-800m. VI-VII.

A. holosericea Sm. 10-40cm. Hele planten grågrøn, silkehåret til lådden. Nedre blade med 2-6mm brede lapper, 5-15cm lange. Svøbbladene lådne,smalt brunkantede. 1200-2100m. VI-X. Udbredt.

A. taygetea Boiss.& Heldr. (A. aegyptiaca p.p.) 10-25cm. Hele planten hvid- til grålådden. Nedre blade 3-7cm x 3-6mm. Halvskærmen 1-2cm bred, tæt. 1400-2100m. sVI-VIII. TA,PR.

A. grandifolia Friv. 40-120cm. Stængelbladene 1 x delte, ca. 10x5cm, ægformede. Mange ret små kurve. Kurvsvøbet ca. 4x3mm.

Chamaemelum mixtum (L.) All. Tofarvet gåseurt. 10-60cm. Dunet til tæthåret. Bladene røllikeagtige. Randkronerne mest nedadrettede. Svøbbladene grønne. Skivekronerne med sækformet grund.V-IX.

Matricaria recutita L. (Chamomilla r.) Vellugtende kamille.

Tripleurospermum rosellum (Boiss.& Orph.) Hayek (Matricaria r.) Rosenkamille. 15-40cm. Nedre blade 5-10cm, kun fligede ved grunden og i ydre ¼. 1(2) kurv. Randkronerne ca. 7mm, lyserøde. PR. Ca. 900m.

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. Køllebertram. 20-60cm. Bladene 2-3 x delte, smalfligede. Kurvstilkene ofte fortykkede i frugt. Svøbbladene ofte med rødlig rand. Hvide randkroner. IV-VII.

Otanthus maritimus (L.) Hoffm.& Lk. Sølvøre. 20-40cm. Tæt hvidfiltet strandplante. Ugrenede stængler med siddende, aflange, butte blade på 9-12x4-5mm. Kugleformede kurve i halvskærm.V-VIII.

Chrysanthemum segetum L. Gult okseøje. 0-800m. IV-VIII.

C. coronarium L. Kronokseøje. 20-60cm. Enårig. Bladene 2 x delte med ofte tandede afsnit. Ydre svøbblade med brunligt kantbånd og hvidlig hindekant. Randkronerne gule, hvidliggule eller gule inderst og hvide yderst. 0-600m. IV-VII.

Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. Matrem. 0-1000m. VI-IX.

Coleostephus myconis (L.) Cass. Rørokseøje. 10-45cm. Glat eller svagt håret enårig, der minder om Gult okseøje. Bladene regelmæssigt tandede. Randkronerne mest gule, men kan være hvide med gul grund. 0-800m. IV-VII. ?

Cotula coronopifolia L. Firkløft. 5-20cm. Bladene stængelomfattende, 2-5cm, smalle, helrandede eller fålappede. Mange 1cm brede kurve, der er nikkende før blomstringen. Lillabræmmede svøbblade. Glat og stærkt aromatisk enårig. Om. VII-VIII.

Artemisia arborescens L. Buskmalurt. 50-100cm. Hvidfiltet. Forveddet forneden. Bladene 1-2 x delte, fligene 1-2mm brede. Kurvene halvkugleformede, 5-8mm brede og gulblomstrede. 0-1000m.

A. eriantha Ten. Hvidfingret bynke. 5-20cm. Hvidfiltet. De nedre blade 2 x trekoblede. Toppen tæt og smal med 5-20 4-7mm brede kurve. 2100-2800m. sVII-VIII.

Tussilago farfara L. Følfod. II-IV.

Doronicum orientale Hoffm. Rundtakket gemserod. 20-50cm. Nedre blade afrundet hjærteformede med hel eller svagt rundtakket rand. 1-2(3) stængelblade. Kurven ofte enlig, 4-6cm bred. III-fVI.

Senecio. Brandbæger.

1. Bladene hele til svagt bugtet-tandede ..... 2.
   " lappede til fligede 5.
2. Ingen randkroner. Bladundersiden hvidfiltet .... thapsoides
   Med randkroner. Bladundersiden ikke hvidfiltet 3.
3. 3-4(2-5) randkroner. Bladene lancetformede ..... fuchsii
   12-20 randkroner 4.
4. 1 række svøbblade, ingen ekstrasvøbblade .... integrifolius
   " " " + små ekstrasvøbblade macedonicus
5. Bladundersiden hvidfiltet, oversiden mørkegrøn ..... 6.
   " grøn 7.
6. Stænglen jævnt bebladet hele vejen ..... ambiguus
   " med mange blade forneden, få foroven bicolor
7. Randkronerne mangler ..... vulgaris
   " til stede 8.
8. Nedre blades lapper ikke afrundede, øvre blades fremadrettede. 1-flerårig med få spindelvævshår ... squalidus
   Nedre blades lapper afrundede, øvre blades udstående. Enårig, m.m. tæt spindelvævshåret vernalis

Senecio ambiguus (Biv.) DC. 20-50cm. Bladene lappede, lapperne næppe længere end brede. Randkronerne 1½-5mm lange. 900-1700m. VII-VIII. TA.

Senecio bicolor (Willd.) Tod. Tofarvet brandbæger. Bladene fjersnitdelte, fligene 2-3 x længere end brede. 0-300m. V-VII.

S. fuchsii Gmelin (S. ovatus) Pilebladet brandbæger. 40-160cm. Bladene 7-20cm, savtakkede, halvglatte til svagt dunede. Mange kurve i halvskærm. 2-4 ydre svøbblade. 1600-2200m. mVII-IX. KH.

S. thapsoides DC. Kongelysbrandbæger. 20-60cm. Stænglen hvidfiltet. Nedre blade 7-25x2½-5½cm, mest helrandede. Mange kurve i en aflang top. Kurvsvøbet hvidfiltet, 10-13mm. 500-2300m. VI-VIII. TA,PR,KH,ER.

S. macedonicus Griseb. 40-110cm. Bladene helrandede til svagt tandede, brat mindre opadtil. 2-15 kurve i en åben, fladtoppet halvskærm. 8-12 ydre svøbblade. 950-1900m. VI-VII. TA,PR,KY,KH.

S. integrifolius (L.) Clairv. ssp. integrifolius Bakkefnokurt. 40-90cm. Grundbladene udbredte, mest 5-15x2-4cm, stilkede. Stænglen spindelvævsulden. 1600-2300m. VII-VIII. TA,KH.

S. squalidus L. Stenbrandbæger. 5-30cm. 18-24 indre svøbblade på 5-7x1mm; 8-12 ydre på 2-2½X0,2-0,5mm. 1500-2500m. VI-VIII.

S. vernalis W.& K. Vårbrandbæger. -2200m. V-VIII.

S. vulgaris L. Alm. brandbæger. 0-1800m. I-XII.

Calendula arvensis L. Agermorgenfrue. 15-25cm. Ofte temmelig grenet enårig med m.m. helrandede blade. Kurvene 2-3cm brede. Randkronerne gule eller orange. Ydre frugter 1½-2cm. 0-1200m. XI-V.

Carlina. Bakketidsel.

1. Indre svøbblade og blomsterne rødlilla ..... lanata
" " " " gule (eller hvide) 2.
2. Indre svøbblade klart gule eller brunliggule ..... 3.
" " bleggule, stråfarvede eller hvide 4.
3. Ydre svøbblade 15-20mm længere end de indre ..... graeca
" " højst 10mm længere end de indre corymbosa
4. Ydre svøbblade 20-25mm brede, fjersnitdelte ..... frigida
" " 4-9mm brede, tornet-tandede vulgaris

Carlina corymbosa L. Skærmbakketidsel. 20-50cm. Noget filtet flerårig. Kurvene danner en ret tæt halvskærm. 0-1200m. VII-X.

C. graeca Boiss. Græsk bakketidsel. 20-50cm. Nær foregående, men mest halvglat. Ydre svøbblade 4-5cm. 0-1400m. VII-X.

C. vulgaris L. ssp. intermedia (Schur) Hayek Alm. bakketidsel. Indre svøbblade stråfarvede. Ydre svøbblade højst lig de indre. 1200-2000m. VII-VIII.

C. frigida Boiss.& Heldr. 15-50cm. Toårig. Bladene m.m. bølgede, fjersnitdelte. Ydre svøbblade 3½-4cm, meget længere end de indre. Indre svøbblade bleggule eller hvidlige. 900-2100m. mVI-fVIII.

C. lanata L. Rødspidset bakketidsel. 5-40cm. Enårig. Bladundersiderne filtede. Ydre svøbblade lancetformede, 25-60x10-12mm. 0-1200m. VI-VIII.

Atractylis cancellata L. Enårigt strålehovede. 6-25cm. Enårig med hvidfiltede stængler. Bladene smalt lancetformede med fint torntandet rand. De øvre blade omgiver kurven som et svøb. Kurven ægformet, 5-15x5-12mm. Rødlilla kroner. 0-900m. IV-VII.

A. gummifera L. Lavt strålehovede. Stængelløs flerårig. Bladene 15-40x5-12cm, fjerfligede og kraftigt tornede. Den enlige kurv 3-7cm bred, midt i rosetten. Rødlilla kroner. 0-1350m. VIII-X.

Xeranthemum inapertum (L.) Miller Spinkel papirsblomst. 10-40cm. Enårig med smalt lancetformede, helrandede blade. Svøbbladene hindeagtige, de inderste lyserøde, efterligner randkroner. 0-1800m. VI-VIII.

Cardopatum corymbosum (L.) Pers. Blåskærm. 8-25cm. Meget tor-

net flerårig. Stænglen rigt forgrenet foroven med mange, næsten siddende, ca. 1cm brede, blå kurve i en bred halvskærm. VI-VIII.

Echinops sphaerocephalus L. Kirtlet tidselkugle. 50-160cm. Bladoversiden kirtlet. Blomsterstanden 3-6cm bred, grålig eller hvid. Bladundersiden hvidfiltet. VII-VIII. 2 underarter: ssp. albidus (Boiss.& Spr.) Kozuharov: Kurvsvøbet 15-18mm, glat. ssp. taygeteus (Boiss.& Heldr.) Kozuharov: Kurvsvøbet 18-25mm, tæt kirtelhåret. Stænglen ligeledes tæt kirtlet.

E. ritro L. ssp. ruthenicus (Bieb.) Nyman Glatbladet tidselkugle. 30-60cm. Bladene 2 x delte, glatte ovenpå, hvidfiltede nedenunder. Blomsterstanden blålig. 0-1500m. VII-IX.

Arctium minus Bernh. Liden burre. 0-1500m. VII-IX.

Staehelina uniflosculosa Sm. Enblomstret fjerkurv. -50cm. Busk med hvidfiltede grene. Bladene ægformede, spidse, med hvidfiltet underside, 1½-4cm. Kurvene med 1-2 blomster. VIII.

Jurinea. Bisamtidsel.

1. Stænglen 0-6cm ..... taygetea
" 20-70cm 2.
2. Svøbbladene rette ..... consanguinea
Ydre svøbblade krumme 3.
3. Frugterne tydeligt knudrede ..... glycacantha
" svagt knudrede mollis

Jurinea mollis (L.) Rchb. ssp. anatolica (Boiss.) Stoj.& Stefan. Blød bisamtidsel. 30-70cm. Bladene smalt spidsfligede, hvidfiltede nedenunder. Kurvsvøbet med rødlilla spidser. 300-1700m. IV-VI

J. consanguinea DC. 20-35cm. Grundbladene ca. ½ x stænglen, svagt fligede. V-VIII.

J. glycacantha (Sm.) DC. Storhovedet bisamtidsel. 30-60cm. Ofte kun bladet ved grunden. Grundbladene svagt fligede, med bølget rand. Kurvene 4-5½cm.

J. taygetea Hal. Bladene 1-5cm x 3-10mm, svagt lappede til fligede. Kurven enlig, 12-22mm bred. Blegrøde kroner. 2000-2300m. VII. TA.

Carduus.

1. Kurvene m.m. cylindriske. Enårige ..... 2.
" m.m. halvkugleformede. 2-flerårige 4.
2. Indre svøbblade kortere end de indre midterste acicularis
" " længere " " " " 3.
3. 2-5 kurve sammen, overrages af lange torne ..... australis
1-3 " " , " ikke af torne pycnocephalus
4. Svøbbladene mindst 2mm brede ..... 5.
" højst 2mm " 6.
5. Bladribberne ophøjede i hele deres længde ... macrocephalus
" kun ophøjede i deres ydre halvdel taygeteus
6. Stænglen spindelvævshåret til filtet ..... cronius
" m.m. glat tmoleus

Carduus macrocephalus Desf. Storhovedet tidsel. -150cm. Toårig. Stængler og bladundersider m.m. spindelvævsfiltede. Kurvene efterhånden nikkende, 3-4x4-5cm. Svøbbladene indsnøret ¼ over grunden, udstående til nedbøjede. 0-1900m. VI-VIII.

C. taygeteus Boiss.& Heldr. -70cm. Flerårig. Nær foregående. Svøbbladene nedbøjede i ydre 1/3, ofte foldede mod spidsen.

C. tmoleus Boiss. -100cm. Flerårig. Bladene dybt delte, glatte med hårede ribber. Kurvene 1½-2½x1½-2½cm, mest siddende og i nøgler. Kronen 15-17mm. 8-12 par bladlapper. 1300-2300m. VI-IX.

C. cronius Boiss.& Heldr. Nær foregående, men bladene hårede, med 6-8 par lapper. Kurvene 2-2½x2-2½cm. Kronen 18-20mm.

Carduus acicularis Bertol. Nåletidsel. 30-60cm. Stænglen meget smalvinget. Kurvene enlige. Svøbbladene kun brede i den nedre 1/3, ½mm brede derover og sylformet tilsmalnede. 0-800m. V-VII.

C. pycnocephalus L. ssp. albidus (Bieb.) Kazmi Piltidsel. 20-60 cm. Stænglens vinger indtil 5mm brede. Lyserøde blomster. IV-VII.

C. australis L.f. Marmortidsel. 30-60cm. Stænglens vinger indtil 8mm brede. Bladene ofte hvidbrogede eller -årede. Kronerne ofte hvide. 0-500m. IV-V.

Cirsium. Tidsel.

1. Bladoversiden finttornet ..... 2.
" ikke finttornet 6.
2. Stænglen vinget ..... 3.
" uvinget 4.
3. Kurvene 1-1½cm brede, overrages af støtteblade .... italicum
" 2-4cm " , omgives ikke af støtteblade vulgare
4. Kronen rødlilla. Kurven oftest tæt spindelvævvsf. eriophorum
" hvid til lyserød glat til svagt spindelvævsfiltet 5.
5. Svøbbladene med udvidet spids ..... hypopsilum
" jævnt tilsmalnende heldreichii
6. Stænglen tornet-vinget til spidsen ..... creticum
" uvinget 7.
7. Kronen hvid eller hvidliggul ..... candelabrum
" lyslilla arvense

Cirsium heldreichii Hal. 15-100cm. Bladlappernes endetorne 6-25 mm. Kurvene med 2-6 smalle blade under sig, 25-35x20-40mm. Svøbbladene med en tæt torntandet spids. 900-2200m. VI-IX.

C. hypopsilum Boiss.& Heldr. 40-100cm. Mange kurve i en stærktgrenet, smal, foroven tæt top, med 3-5 blade under sig på 1½-3 x kurvens længde. Hvidlig krone. 1600-2300m. VII-IX. TA,KY,KH.

C. eriophorum (L.) Scop. Uldtidsel. 80-150cm. Bladene stærkt tornede. Kurvene m.m. kugleformede, 4-7cm brede, tæt uldhårede, med nogle få højblade under sig. 100-1800m. VI-IX.

C. vulgare (Savi) Ten. Horsetidsel. 0-1700m. VI-X.

C. italicum (Savi) DC. Lansetidsel. 20-45cm. Stænglen spinkel. Bladene bleggrønne, noget filtede nedenunder. Svøbbladene med en brunlilla køl under tornspidsen. 0-1100m. VII-X.

C. candelabrum Griseb. Juletræstidsel. 1½-2m. Glat, stærktgrenet toårig. Bladene bølgede, læderagtige. Kurvene nikkende, 4-12 sammen, 14-19x7-13mm. 800-1700m. VII-VIII.

C. creticum (Lam.) d'Urv. Damtidsel. 50-100cm. Bladene stærkt bølgede, med indrullet rand og kraftige torne på 5-15mm. Svøbbladene ægformede med lang spids. 0-1200m. VII-VIII.

C. arvense (L.) Scop. Agertidsel. 600-2000m. V-IX.

Picnomon acarna (L.) Cass. Tornsvøb. 20-70cm. Enårig med tornetvinget stængel. 1-flere kurve sammen, cylindriske, 2-3cm, overrages af de øvre højblade. 0-1200m. VI-VII.

Notobasis syriaca (L.) Cass. Spydtidsel. 20-60(-150)cm. Enårig med uvinget stængel. Bladene læderagtige, de øvre fjersnitdelte og m.m. reducerede til ribberne, stærkt tornede; omgiver kurvene som et svøb. 0-1100m. V-VI.

Ptilostemon.

1. Planten tornet ..... 2.
" ikke tornet 3.
2. Bladgrunden med 1-3 par kraftige torne ..... stellatus
Bladene med meget kraftige torne afer
3. Blomstrende skuds blade med 1-2 par 0,3-2mm lange frynser ved grunden ..... gnaphaloides
Blomstrende skuds blade uden frynset grund chamaepeuce

Ptilostemon afer (Jacq.) Greuter Skelettidsel. 40-75(-100)cm. En meget stærkttornet tidsel. Bladene m.m. glatte ovenpå, hvidårede. Stænglen hvidfiltet, uvinget. Store kurve med udspærrede, tornede svøbblade med 0-2 par 3-6mm lange sidetorne. -2100m. VII-VIII.

P. chamaepeuce (L.) Less. Græstidsel. 30-100cm. Busk med smalt linjeformede, helrandede blade. Kurvene i en langstilket klase eller halvskærm. Kurvene 14-18x13-20mm. 0-850m. IV-VI.

P. gnaphaloides (Cyr.) Sojak ssp. pseudofruticosus (Pamp.) Greuter. Frynset græstidsel. 30-100cm. Som foregående, men kurvene 18-25x18-26mm. 20-450m. IV-VI.

P. stellatus (L.) Greuter Tvetornstidsel. 15-30(-50)cm. Enårig. Bladene 3-4½cm, linjeformede og helrandede. Tornene gule, 6-9mm. Lange, sylformede svøbblade med hvidlig knude forneden. VI-VII.

Lamyropsis cynaroides (Lam.) Dittrich 20-60cm. Stænglen hvid. Bladundersiden hvidfiltet. Kurvene langstilkede, mest enlige, 2½-3½cm. Svøbbladene tornspidsede, udstående til nedbøjede. IV-VI.

Galactites tomentosa Moench Kamtidsel. 15-100cm. Bladene hvidårede eller -brogede ovenpå, filtede nedenunder, ret smalfligede med spidse torne. 1-flere kurve sammen. Lyst rødlilla kroner. V-VII.

Tyrimnus leucographus (L.) Cass. Stilktidsel. 20-200cm. Enårig. Kurvene 1½-2½cm, enlige på en lang, bladløs stilk. Bladene tynde, nedløbende, hvidårede med gråulden underside. 0-750m. V-VII.

Onopordum. Æselfoder.

1. Stængler og modne blade ikke filtede, men grønne ..... 2.
" " " " m.m. tætfiltede 4.
2. Kurvsvøbet m.m. tæt spindelvævsfiltet ..... argolicum
" m.m. glat 3.
3. Stænglen hvidlig ..... laconicum
" gulliggrøn tauricum
4. Længste svøbblade længere end blomsterne ..... sibthorpianum
" " ikke længere end blomsterne 5.
5. Bladundersiden hvidfiltet. Stænglen spredt håret bracteatum
" gråfiltet. " m.m. filtet horridum

Onopordum laconicum Heldr.& Sart. -70cm. Planten med mange små kirtler. Kurvene 4-5x4-7cm. Bladundersiden stærkt netåret.

O. tauricum Willd. Klæbrig æselfoder. 50-200cm. Stænglen gulligbrun. Bladene mørkegrønne. Planten m.m. klæbrig. Kurvene 5½-7cm brede. Svøbbladenes stive torne indtil 4mm. 0-800m. V-VI.

O. argolicum Boiss. Stjærneæselfoder. -150cm. M.m. klæbrig. Stænglen brunlig. Bladene mørkegrønne, undersiden med ophøjede, gullige, noget netårede ribber og spindelvævsgråhåret. V-VI.

O. sibthorpianum Boiss.& Heldr. (O. caulescens ssp. atticum) -50cm. Bladundersiden hvidfiltet. Kurvene 2½-3½cm brede. Svøbbladene ret brat indsnævrede til en torn på 15-20mm.

O. bracteatum Boiss.& Heldr. ssp. myriacanthum (Boiss.) Franco Stænglens vinger indtil 5mm brede, med torne indtil 10mm. Svøbbladenes torn indtil 5mm. PR.

O. illyricum L. ssp. carduncul us (Boiss.) Franco Æghovedet æselfoder. 30-200cm. Stænglen smalvinget med 3-7mm lange torne. Svøbbladene med en indtil 2mm lang torn, kun de yderste udstående. Kurvene 4-6cm brede. 0-1200m. V-VIII.

Cynara carduncul us L. Spansk ærteskok. 20-100cm. Bladene op til 50x35cm, 1-2 x delte med 1½-3½cm lange, gule torne, hvidfiltede nedenunder. Kurvene 4-5cm. Blå blomster. Svøbbladene med en torn på 1-5cm. 0-1100m. V-VIII.

C. scolymus L. Ærteskok. -2m. Bladene op til 80x40cm, 1-2 x delte eller m.m. helrandede, uden torne. Kurvene 8-15cm brede med

kødede, tornløse svøbblade. Blå blomster. VI-VIII. Dyrket.

Cynara cornigera Lindley Gulblomstret ærteskok. 10-20(-50)cm. Grundbladene 25-50x8-22cm, dybt 2 x delte, med 2-7mm lange torne. Gullige blomster. Mellemste svøbblade skeformede med en 2-5cm lang torn. 0-850m. IV-VI.

Silybum marianum (L.) Gaertner Marietidsel. 20-150cm. Toårig. Nedre blade store og brede, 25-50cm, skinnende og læderagtige. Kurvene 2½-4cm. Svøbbladene med en lang, furet og noget nedbøjet torn på 2-5cm med mindre sidetorne midtpå. 0-1100m. IV-VIII.

Mantisalca salmantica (L.) Briq.& Cav. Stiv knopurt. 30-100cm. 2-flerårig. Stænglen opret, kantet og stivhåret. Nedre blade fjersnitdelte, øvre linje-lancetformede. Kurven 10-15mm, ægformet og langstilket. Tværrynkede frugter med skæv spids. 0-600m. VII-VIII.

Centaurea. Knopurt.

1. Svøbbladene bredt hindekantede, uden vedhæng .... amplifolia
   " med vedhæng 2.
2. Blomsterne blå, i hvert fald de ydre ..... 3.
   " ikke blå 6.
3. Enårig ..... 4.
   Flerårig 5.
4. 8-20cm høj. Bladene gråfiltede ..... pinardii
   20-80cm høj. " grønne cyanus
5. Veludviklet grundbladsroset under blomstringen .... pichleri
   Ingen " " " triumfetti
6. Svøbbladsvedhænget med flere torne ..... 7.
   " uden eller med en enkelt torn 10.
7. Blomsterne røde ..... 8.
   " gule 9.
8. Svøbbladsvedhængets torne lige store, 3-5mm .... sonchifolia
   Svøbbladet med en stor torn på 10-18mm + nogle små calcitrapa
9. Bladene uldhårede eller gråfiltede ..... solstitialis
   " grønlige og ru melitensis
10. Blomsterne gule ..... 11.
    " røde 12.
11. Kurvene 8-10x5-7mm ..... argentea
    " 15-20x10-15mm athoa
12. En busk med tornede grene ..... spinosa
    Urter. Stænglerne uden torne 13.
13. Svøbbladene udtrukne i en lang, fjerfrynset spids zuccariniana
    Svøbbladene uden en sådan spids 14.
14. Stænglen 0-5cm. Rosetplanter ..... 15.
    " mindst 10cm 16.
15. Bladene ru-dunede, matte ..... raphanina
    " gråt spindelvævshårede pumilio
16. Svøbbladene med en brod på 0-2½mm ..... 17.
    " " " torn på 1-5cm 19.
17. Nedre blade 2 x delte. Kurvene 18-20mm ..... niederi
    " " 1-2 x delte. Kurvene 10-15mm 18.
18. Vedhængets nedre frynser sammensmeltede til øren grisebachii
    " " " frie affinis
19. Vedhænget kredsrundt eller ægformet ..... 20.
    " halvmåneformet 21.
20. Vedhænget rundt og stråfarvet ..... achaia
    " ægformet og mørkebrunt sibthorpii
21. Vedhænget gulbrunt ..... spruneri
    " mørkebrunt til sort 22.
22. Blomsterne lyst rødlilla ..... laconica
    " mørkt rødlilla 23.
23. 30-60cm. Stængel og blade glatte ..... cytherea
    10-20cm. " " " hårede til uldne redempta

Centaurea amplifolia Boiss.& Heldr. 50-150cm. Nedre blade 1 x del-

te, afsnittene ægformede, 10-20x10-14cm, sj. 2-3 x delte. Øvre blade 2-3 x mindre. Kurvene 15-17mm brede. Røde blomster. 1300-1400m. VI. KY.

Centaurea athoa DC. (C. rupestris ssp. a.) 2-30cm. Bladene mest filtede på begge sider, hele til fligede med 4-6 par 2-4mm brede flige. Vedhængene små, med brun midterplet, uden torn. 2 ssp.:
ssp. athoa: Stænglen mest 10-30cm og liggende. Grundbladsfligene 10-25mm, mest helrandede. 1400-1800m. VII-VIII. TA.
ssp. parnonia (Hal.) Gamal-Eldin & Wagenitz: Stænglen 2-4cm, opstigende. Grundbladsfligene 5-12mm, nogle af dem delte eller tandede. 1900m. VII. PR (Megali Turla).

C. laconica Boiss. 30-50cm. Stænglen uldhåret ved grunden. Nedre blade mellembrudt 2 x delte, m.m. lyreformede. Kurvene 2-3cm brede, kugleformede. Svøbbladstornen 10-20mm.

C. achaia Boiss.& Heldr. Nedre blade mellembrudt fligede med lyreformet fjersnitdelte afsnit. Vedhængene dækker svøbbladene helt, tornen 20-35mm. Lyserøde blomster.

C. sibthorpii Hal. Nær laconica. Nedre blade 1-2 x delte. Svøbbladstornen 15-20mm. Lyserøde blomster.

C. redempta Heldr. Nedre blade fligede med tandede til lappede afsnit. Kurven 3-4cm bred, kugleformet. Svøbbladsvedhænget sort med en torn på 15-30mm. 30-1200m. III-VI.

C. cytherea Rech.f. Stærkt grenet fra grunden. Grundbladene 2 x fjersnitdelte. Kurven 25-30mm bred. Ellers nær foregående. Kythæra.

C. spruneri Boiss.& Heldr. Bredtornet knopurt. 20-50cm. Bladene ru og spindelvævsuldne, de nedre mellembrudt fligede. 2 ssp.:
ssp. spruneri: 20-40cm. Kurven 30-35mm bred, kugleformet. Tornene 3-5cm. Grundbladene visne under blomstringen.
ssp. guicciardii (Boiss.) Hayek: 30-50cm. Kurven 15-20mm bred, ægformet. Tornene 1-2cm. Grundbladene grønne under blomstringen. 0-700m. VI-VII.

C. raphanina Sm. Lav knopurt. Bladene 5-12cm, mellembrudt lyreformet fjersnitdelte med mange afsnit. 1-4 m.m. siddende kurve, 12-20mm brede. 0-2200m. IV-VII. 2 underarter:
ssp. raphanina: Vedhænget med få korte frynser på ½-2mm og en torn på 1-6mm.
ssp. mixta (DC.) Runem.: Vedhænget med 2-6 par stive frynser på 2-7mm og en torn på mest 8-15mm. Udbredt.

C. pumilio L. Bladene lyreformede med over 6 par sideflige. 1-2 kurve, 13-16mm brede. Bredt ægformede svøbblade med utydeligt tandet hindekant og en torn på 5-9mm. Sandstrand. III-VIII.

C. niederi Heldr. 15-35cm. Hvidfiltet plante. Bladene med aflange afsnit. Æg-kugleformede kurve. Vedhænget lysebrunt med udadbøjet spids og en torn på 2-3mm. 30-150m. V-VI. M.Araxos på NV-Pelop.

C. argentea L. Sølvknopurt. 10-45cm. Hvidfiltet. Nedre blade lyreformede med aflange afsnit. Kurvsvøbet 8-10x5-7mm. Vedhænget lysebrunt med en brod på 0-1½mm. 0-900m. VI-VII. Kythæra.

C. affinis Friv. Spættet knopurt. 15-60cm. Bladene 1 x delte. Vedhænget trekantet, brunt til sortbrunt, med 5-10 par frynser.
ssp. affinis: Bladene grågrønne, ofte tæt gråfiltede som unge. Vedhængets brod ½-1mm. 1500-2400m. VII-VIII.
ssp. laconiae Prodan: Bladene ru på begge sider. Vedhængets brod 1-2mm. 600-1700m. VI-VII. TA,PR,KY,KH,ER,PN.

C. grisebachii (Nyman) Form. 30-50cm. Bladene m.m. spindelvævsfiltede, de nedre 1-2 x fligede, fligene 1-2(-4)mm brede. Kurven

11-14x5-8mm. Vedhænget lille, trekantet, brunt til sortbrunt, brodden ½-1mm. 4-8 par frynser.

Centaurea zuccariniana DC. Dunknopurt. 20-30cm. Toårig. Kurvene 12-14x3-4mm, 2-4 sammen. Vedhænget blegbrunt til gulligt, med udadbøjet, trådformet, langfrynset, fjeragtig spids. Lyserød krone.

C. spinosa L. ssp. spinosa 20-60cm. Halvkugleformede strandbuske. Bladene helrandede til fligede og noget tornspidsede. Kurvene 8-12x2½-4mm. Blegrøde blomster. VI-VII.

C. calcitrapa L. Stjærnetidsel. 20-100cm. Toårig. Nedre blade 1 x delte med lancetformede flige. Kurvene siddende, omgivne af de øvre blade, 6-8mm brede. 0-1400m. VI-VIII.

C. sonchifolia L. Svinemælksknopurt. 20-40cm. Flerårig. Bladene hele til lappede, med finttandet rand. Kurvene enlige, 2cm brede, omgivne af de øvre blade. 0-600m. VI-VIII.

C. solstitialis L. Tornet knopurt. 20-50cm. 1-2-årig. Stænglen vinget af nedløbende blade. Kurvene 7-15mm brede. Midterste svøbbladstorn 10-15mm. 0-1400m. VI-VIII.

C. melitensis L. Vinget knopurt. 30-60cm. Som foregående, men kurvene 7-9mm brede. Midterste svøbbladstorn 5-8mm.0-300m.V-VIII.

C. triumfetti All. Fløjlsknopurt. 5-50cm. Bladene lancetformede, de nedre med 0-2 par tænder-lapper. Ydre kroner kornblomstblå, indre lilla. Vedhænget en smal, mørkebrun nedløbende rand med mange sølvhvide frynser på 1½-3mm. 1000-1800m. V-VI. TA,PR,ME.

C. pichleri Boiss. 5-15(-30)cm. Med sidestillede, opstigende eller liggende stængler. Ellers lig foregående. 1000-2100m. V-VI. KY,KH,ER,PN.

C. pinardii Boiss. Opret eller udstrakt. Nedre blade omvendt ægtil lancetformede, hele eller lyreformet snitdelte. Kurven ca. 10mm bred. Vedhænget mørkebrunt, langt nedløbende, sølvfrynset.

C. cyanus L. Kornblomst. 0-1500m. V-VI.

Crupina. Krybefrø. Slanke enårige på 20-50cm. Bladene 1 x delte, smalfligede og finttandede. Smalt ægformede kurve i åben top.

C. vulgaris Cass. Alm. krybefrø. Kurvgrunden kegleformet. Kurven med 3-5 blomster. Frøets tilhæftningspunkt rundt og endestillet. V-VI. 0-1100m.

C. crupinastrum (Moris) Vis. Flerblomstret krybefrø. Kurvgrunden afrundet. Kurven med 9-15 blomster. Frøets tilhæftningspunkt linjeformet og sidestillet. 0-1400m. IV-VI.

Cnicus benedictus L. Korbendikt. 20-60cm. Enårig. Bladene aflange, lysegrønne med hvidåret underside, fint tornet-tandede, de nedre m.m. delte, de øvre m.m. bølgede. De øverste omgiver kurven som et svøb. 0-800m. V-VI.

Carthamus lanatus L. Gul svøbtidsel. 30-60cm. Blomsterne gule. Indre svøbblade ofte med et lille, hindeagtigt, tandet til helrandet vedhæng. 0-1300m. VI-VIII. 2 underarter:
ssp. lanatus: Tornene spidsvinklet udgående. Stænglen stråfarvet. Planten m.m. tæt uldhåret. Ydre svøbblade ca. 1½ x de indre.
ssp. baeticus (Boiss.& Reuter) Nyman: Tornene retvinklet udgående. Stænglen hvidlig. Planten svagt håret til halvglat. Ydre svøbblade 2 x de indre.

C. dentatus (Forsskål) Vahl ssp. ruber (Link) Hanelt Tandet svøbtidsel. 15-60cm. Blomsterne røde til bleglilla. Indre svøbblade med et tandet, noget lillat vedhæng. Stænglen stråfarvet, lådden til spindelvævsfiltet. 0-1000m. VII-IX.

C. leucocaulos Sm. Hvidstænglet svøbtidsel. 10-50cm. Blomsterne bleglilla. Indre svøbblade helrandede og uden vedhæng. Stænglen skinnende hvid til lilla, mest glat. 0-1200m. VI-VIII.

Carduncellus caeruleus (L.) C.Presl Blå æselkurv. 30-60cm. Flerårig med ugrenede stængler. Bladene lancetformede med finttornet rand, meget forskelligt indskårne. Kurvene 3cm brede, omgivne af udstående højblade. Blå kroner. 0-1200m. VI-VII.

Scolymus hispanicus L. Alm. gyldenrod. 20-80cm. 2-flerårig. Planten stærktttornet på stængler og blade ligesom en tidsel, men med gule, cikorielignende blomster. 0-800m. VI-VIII.

Catananche lutea L. Gul rasleblomst. 8-40cm. Enårig. Bladene ligestrengede, m.m. helrandede, smalt lancetformede. Kurvsvøbet 15-20mm, gulbrunt og hindeagtigt. 0-800m. IV-VI.

Hymenonema laconicum Boiss.& Heldr. 20-70cm. En knopurtlignende flerårig med mellembrudt fjersnitdelte blade med tandede afsnit. Kurvene 15-22mm brede, med ægformede, bredt hindekantede svøbblade. Østfoden af Taygetos.

Cichorium. Cikorie.

1. Øvre grene golde og tornede. Kurvsvøbet 5-8mm ..... spinosum
   Ingen tornede grene. Kurvsvøbet 11-14mm 2.
2. Flerårig. Blomsterstilkene lidet fortykkede ..... intybus
   1-2-årig. " kølleformet fortykkede 3.
3. 60-120cm. Bladene næsten glatte, ofte hele ..... endivia
   5-50cm. Grundbladene hårede, mest høvlformet fligede pumilum

Cichorium intybus L. Cikorie. 0-1100m. V-X.

C. endivia L. Endivie. VII-IX. Dyrket og sjældent forvildet.

C. pumilum Jacq. Vild endivie. 10-60cm. Enårig. 0-1000m. V-IX.

C. spinosum L. Torncikorie. 5-15cm. Halvkugleformet halvbusk med rosetblade og en udspærret grenet, tornet blomsterstand. 0-1700m. VI-X.

Tolpis barbata (L.) Gaertner Kristøje. 6-60cm. Opret enårig. Let kendelig på de lange, børsteformede højblade, der danner et svøb uden om kurven. Svovlgule kroner. 0-700m. IV-VII.

T. virgata (Desf.) Bertol. Svovlkurv. 20-60cm. Oftest flerårig. Stænglens grene spidsvinklet udgående og rager op over den. Bladene m.m. lancetformede, helrandede til tandede. Kronerne svovlgule. Kurvsvøbet 6-8mm. 0-1200m. V-VIII.

Hyoseris scabra L. Ru svinefoder. Enårig rosetplante. Bladene 5-8x1cm, fjersnitdelte med ægformede, m.m. tandede afsnit, ru og noget melede. Kurvstilkene kølleformet fortykkede. 0-400m.II-IV.

Hedypnois cretica (L.) Dum.Cour. Ribbekurv. 3-45cm. Enårig rosetplante med ofte grenede og noget bladede stængler. 2 rækker svøbblade, den ydre meget lille. Frugterne m.m. cylindriske, ofte krummede. Kurvsvøbet 7-10½x3-11mm. 0-1100m. III-V. 3 underarter:
ssp. monspeliensis (Murb.): Kurvstilkene næppe fortykkede i frugt. Planten m.m. glat.
ssp. cretica: Kurvstilkene kølleformede i frugt, indtil 1½mm tykke, indsnørede under kurven. Kurvsvøbet m.m. glat.
ssp. tubaeformis (Ten.): Kurvstilkene kølleformede i frugt, 3-6 mm tykke, ikke indsnørede under kurven. Kurvsvøbet børstehåret.

Rhagadiolus stellatus (L.) Willd. Stjærnefrø. 20-40cm. Opret, grenet enårig med oftest 1 stængel. Nedre blade spatelformede og tandede forneden. 2 rækker svøbblade, den ydre ganske kort. Let kendelig på de 10-15mm lange, stjærneformet udspærrede 8-15 ydre frugter. De korte indre frugter jævne. 0-1400m. III-VI.

R. edulis Gaertner Lyrebladet stjærnefrø. 10-40cm. Som den foregående, men de nedre blade lyreformede med 3-4 par sideflige. De korte, indre frugter rynkede. 0-1300m. III-VI.

Urospermum picroides (L.) Scop. Rut halefrø. 30-45cm. M.m. stivhåret enårig. Bladene stængelomfattende, fjerfligede til tandede.

1-9 op til 4cm brede kurve. Frugt og næb afsatte fra hinanden. Kurvsvøbet bebørstet. 0-1000m. III-VI.

Hypochoeris. Kongepen.

1. Kurvsvøbbladene lige lange. Enårig ..... achyrophorus
" ulige lange 2.
2. Bladene fjersnitdelte ..... cretensis
" tandede til lappede 3.
3. Kurvsvøbbladene med en stribe mørke hår på spidsen radicata
" glatte. Mest enårig glabra

Hypochoeris achyrophorus L. Enårig kongepen. 8-35cm. Planten stivhåret, med grundbladsroset og 0-flere stængelblade. Bladene svagt tandede. 2 rækker fnokhår, den ydre ½mm. 0-1200m. III-V.

H. cretensis (L.) Bory & Chaub. Smalfliget kongepen. 10-40cm. Flerårig. Bladene glatte til stivhårede. Ydre frugter med kort, indre med langt næb. 0-1100m. IV-VI.

H. glabra L. Glat kongepen. 5-40cm. To rækker fnokhår, den ydre kort og ru. Ydre frugter uden, indre med eller uden næb. III-VI.

H. radicata L. Alm. kongepen. 0-1200m. IV-X.

Leontodon. Borst.

1. Med rodknolde. Ydre kroner med en grålig stribe .. tuberosus
De ydre kroner uden eller med en rødlig stribe udvendigt 2.
2. Kurvstilkene med over 5 skælblade. Ingen grenhår ..... 3.
" " 1-3(0-5) skælblade 4.
3. Støvfanget mørkt ..... autumnalis
" gult cichoraceus
4. Frugterne svagt tværrynkede, uden stive hår ..... hispidus
" tværrynkede forneden, kort stivhårede foroven 5.
5. Bladene med siddende stjærnehår udover grenhårene .. graecus
" uden " " , kun med grenhår crispus

Leontodon autumnalis L. Høstborst. 1900-2300m. VII-IX.

L. cichoraceus (Ten.) Sangu. Cikorieborst. Med tenformede rodknolde. Stænglerne med mange skælagtige højblade. Kronerne helt gule. Kurvsvøbet med lange, enkle hår. 500-2000m. V-VII.ER,TA,PN.

L. hispidus L. Stivhåret borst. 0-2300m. VI-IX. KH.

L. crispus Vill. ssp. asper (W.& K.) Rohlena Kruset borst. De stilkede grenhår 2-6-grenede (2-3-grenede hos hispidus). Med lodret pælerod. Alle fnokhår fjerformede. 0-1200m. IV-VI.

L. graecus Boiss.& Heldr. Nær foregående. Svøbbladene med kortstilkede stjærnehår.

L. tuberosus L. Knoldborst. 15-40cm. Stænglerne uden skælblade, med få gaffelgrenede hår. Kurvsvøbet med få grenhår. Ydre frugter krumme, med korte, højst ½mm lange hår. 0-1600m. XI-V.

Picris. Bittermælk.

1. 2 rækker svøbblade, de 5 ydre store og ægformede echioides
Kurvsvøbet taglagt 2.
2. Frugterne uden næb, 2½-3mm ..... altissima
" kortnæbbede, 3-6mm 3.
3. Kurvstilkene fortykkede i frugt ..... pauciflora
" ikke fortykkede i frugt hieracioides

Picris echioides L. Vingekurv. 40-60cm. Stærkt stivhåret enårig. Børsterne ofte med hvidknudret grund. De ydre svøbblade dækker næsten de 8 indre. 0-1300m. VI-VIII.

P. hieracioides L. Ru bittermælk. 0-2200m. VI-X.

P. pauciflora Willd. Fåblomstret bittermælk. 10-50cm. Få kurve. Kurvstilken indsnøret under kurven i frugt. Frugterne mørkebrune, m.m. krumme, stærkt tværrynkede. 0-1400m. IV-VI.

Picris altissima Delile (P. sprengerana) Stivhåret bittermælk. 10-50cm. Enårig. Mange, ofte kortstilkede kurve. Frugterne som hos pauciflora. 0-600m. VI-VIII.

Scorzonera. Svinerod.

1. Bladene fjerfligede (i hvert fald nogle af dem) ..... 2.
" helrandede til tandede 3.
2. 1-2-årig uden golde skud. Stænglen ikke furet ... laciniata
Flerårig, med " " . " furet foroven cana
3. Frugterne tæt lådne eller uldhårede ..... 4.
" glatte 5.
4. Frugterne ca. 4mm. Med en kugleformet rodknold .. sublanata
" 5-8mm. Ingen rodknold cretica
5. Planten m.m. lådden ..... mollis
" højst lådden ved grunden af stængel og blade crocifolia

Scorzonera laciniata L. Enårigt fodfrø. 10-50cm. Kronerne = kurvsvøbet. Frugterne med en bleg, hul fod på ca. 1/3 af resten af frugten; indtil 17mm. 0-1900m. V-VII.

S. cana (Meyer) Hoffm. Flerårigt fodfrø. Kronerne 1½-2 x svøbet. Frugterne som hos foregående, men 6-10mm. 0-2300m. VI-VIII.

S. mollis Bieb. Blød skorsoner. 5-30cm. Med rodknold. Bladene 4-20cm x 2-8mm, græslignende, undrtiden bølgede. Kurvsvøbet 18-30mm. Frugten 13-20mm, som hos laciniata. -2400m.sIV-fVII. TA.

S. crocifolia Sm. 15-45cm. Grundbladene 7-25cm x 1-3(6)mm, græslignende, stive og tætstillede. Kurvsvøbet 15-30mm. Frugterne 15-20mm; uden nogen fod nederst.

S. cretica Willd. 3-45cm. Stænglen blade. Bladene 5-30cm x 1-10 mm, med udtrukken spids. Kurvsvøbet 10-30mm. 0-1400m. IV-V.

S. sublanata Lipschitz 10-25cm. Med en rodknold 2-5cm under jorden. Bladene 8-15cm x 2-4(6)mm, m.m. uldne. Kurvene 10-15mm. Indre svøbblade med nogle korte, sorte hår. IV-V.

Tragopogon. Gedeskæg.

1. Kurvstilkene tydeligt opblæste ..... 2.
" ikke " 4.
2. Kronerne gule ..... dubius
" lilla 3.
3. Ydre frugter med 5 stive, ru hår ..... hybridus
Alle " " fjerformet fnok sinuatus
4. Bladgrunden udvidet. Næbbet ca. = frugten ..... pratensis
" næppe udvidet. Næbbet kortere end frugten 5.
5. Frugten tydeligt knudret. Randkronerne mest lilla samaritani
" jævn eller småknudret. Alle kroner gule brevirostris

Tragopogon sinuatus Avé-Lall. (T. porrifolius ssp. australis) Kortkronet havrerod. 20-50cm. Bladene bredt linjeformede. Frugten 3-4cm. Kronerne ca. ½ x kurvsvøbet. 0-1000m. V-VI.

T. crocifolius L. ssp. samaritani (Boiss.) Rich. Tofarvet gedeskæg. 30-80cm. De ydre kroner lilla med gul grund, sjældent helt lilla eller gule; de indre gule. Selve frugten 12-15mm, næbbet 5-10mm. 5-7 kurvsvøbblade. 800-1800m. VI-VIII.

T. dubius Scop. Storfrugtet gedeskæg. 25-50cm. Nedre blade 5mm brede, foldet-linjeformede. 8-12 svøbblade. Kronerne kortere end svøbet. Frugten 2½-3½cm. Næbbet ca. = frugten. 0-1000m. V-VI.

T. pratensis L. Enggedeskæg. V-VIII.

T. brevirostris DC. ssp. longifolius (Heldr.& Sart.) Richardson Sandgedeskæg. 5-11 svøbblade. Næbbet ca. 5mm.

T. hybridus L. (Geropogon h.) Køllegedeskæg. 20-50cm. Glat enårig. Bladene græsagtige, 3mm brede. Kronerne lyst rødlilla,

1/2-1/3 x de 8 svøbblade. Ydre frugter 3½-5cm. 0-1000m. IV-VI.

Reichardia picroides (L.) Roth Haresalat. 10-45cm. Glat flerårig med noget grenet stængel. Stængelbladene omfattende. De ydre svøbblade ægformede, indtil ½mm bredt hindekantede, går jævnt over i tilsvarende skæl på kurvstilken. Kronerne helt gule. 0-1100m.I-XII.

R. tingitana (L.) Roth Sandharesalat. 20-30cm. Som foregående, men svøbbladene bredt hindekantede. Kronerne med brunlilla grund. Om. IV-VI.

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. Knoldhøgeskæg. 8-30cm. Flerårig med underjordiske rodknolde. Bladene linje-spatelformede i roset; 0-2 stængelblade. Oftest kun 1 kurv med sortagtige, kølleformede kirtelhår ved grunden og på stilken. 0-1600m. III-VI. 2 underarter
ssp. bulbosa: Kurvsvøbet 14-15mm. Frugterne 3-4½mm.
ssp. microcephala Rech.f.: Kurvsvøbet 9-10mm. Frugterne 4-4½mm.

Sonchus asper (L.) Hill Ru svinemælk. Bladgrunden øret. 2 ssp.:
ssp. asper: Enårig. Skinnende grøn. Kurvene 2-2½cm brede.
ssp. glaucescens (Jordan) Ball: Toårig. Blågrøn. Kurvene 4-5cm. Bladranden småtornet. Bladene ofte kun i roset. 0-600m.

S. oleraceus L. Alm. svinemælk. Bladgrunden pilformet. II-X.

S. tenerrimus L. Smalfliget svinemælk. 10-80cm. Bladene med tydelig, uvinget stilk og 6-8 par linje- eller oftere lancetformede afsnit med stærkt indsnævret grund. 0-800m. I-XII.

Streptorhamphus tuberosus (Jacq.) Grossh. Rustsalat. 40-60cm. Flerårig med rodknolde. Nedre blade med pilformet grund, hele til høvlfligede; øvre lancetformede og hele. Kurvene indtil 4cm lange, med æg- til lancetformede svøbblade. 0-1100m. IV-VI.

Lactuca. Salat.

1. Bladene m.m. nedløbende. Kurvene 5-blomstrede ..... 2.
" ikke " . " med 8-flere blomster 3.
2. Stænglen kraftig og kødet. Kort nedløbende blade acanthifolia
" tynd, ikke " . Langt " " viminea
3. Stængelbladene helrandede ..... saligna
" tandede eller lappede serriola

Lactuca viminea (L.) Presl Rissalat. 20-60cm. Stænglen benhvid. Bladene blågrønne, de øvre ofte helrandede og linjeformede. Kurvene sidder på lange, udelte grene. 200-600m. VI-X.

L. acanthifolia (Willd.) Boiss. 30-100cm. Stænglen stribet. Bladene tæt spindelvævshårede inderst på bladstilken, undertiden også på midterribben; de nedre m.m. delte. 0-800m. VII-IX.

L. serriola L. Tornet salat. 0-1050m. VII-X.

L. saligna L. Pilsalat. 30-100cm. Stænglen benhvid. Øvre blade aflange til linjeformede, med pilformet grund; nedre udelte til fligede. 0-1000m. VII-X.

Mycelis muralis (L.) Dumort Skovsalat. 200-2000m. VII-VIII.

Taraxacum. Mælkebøtte.

1. Fnokken blegt rødbrun. Frugtens næb 1-3mm ..... cylleneum
" hvidlig. Næbbet længere 2.
2. Modne frugter med rødt, orange eller lillat skær ..... 3.
" " uden rød farve i sig 6.
3. Støvfanget gult ..... albomarginatum
" grønligt eller mørkt 4.
4. Frugten m.m. orange, dens kegle ca. 2mm ..... graecum
" mørkt rød- til brunlilla; keglen 0,8-1,3mm 5.
5. Bladene grønne, stilken uvinget ..... gracilens
" mat mørkegrønne, stilken vinget pindicola
6. Frugten kastanjebrun ..... 7.
" lysere 8.

7. Frugtens kegle 0,8-1,0mm ..... minimum
" " over 1,0mm delphicum
8. Bladstilken rødlilla ..... hellenicum
" grøn eller lyserød, vinget 9.
9. Støvfanget gult ..... aleppicum
" grøngult minimum

Taraxacum cylleneum Fürnkranz -9cm. Mange tynde stængler, med en tot hår under kurven. Ydre svøbblade rødlige. Kurven med 12-20 blomster med en utydelig grågrøn stribe på undersiden.Frugten med kegle 5-5,2mm; keglen utydelig. 1300-2200m. VII-IX. KY.

T. graecum Dahlst. Indre blade med mange, tungeformede, tandede flige; også med mellemlapper. Støvfanget mørkegråt. Kronerne ofte noget furede, m.m. bleggule. XI-IV.

T. hellenicum Dahlst. Bladene med m.m. bagudrettede, smalle, tandede flige samt tandede mellemflige. Endefligen mest 3-delt. Frugterne gråligt stråfarvede. 0-950m. XI-IV.

T. aleppicum Dahlst. Bladene med 3-5 par butte, tæt og kort tandede, trekantede lapper. Kronerne med rød eller rødlilla stribe på undersiden. Frugten stråbrun. 0-2000m. III-VII. KY.

T. minimum (Briganti) Terr. Bladene med 3-6 par butte til spidse, mest helrandede, trekantede lapper; ofte med spidse mellemlapper. Kronerne med mørkt brunlilla stribe. 500-2200m. PN.

T. delphicum Dahlst. Bladene med 2-3 par bredt trekantede lapper, $\frac{1}{2}$-$\frac{3}{4}$ delte. Ydre svøbblade lilla og blåduggede, tydeligt hornede. 0-1400m.

T. gracilens Dahlst. 4-5 par regelmæssige, mest trekantede bladlapper med spidstandet forkant. Ydre svøbblade udstående til nedbøjede. Frugten mørkt rødlig-lilla. 1300-1900m. IV-VI. KH.

T. albomarginatum A.J.Richards -6cm. 2-4 par bladlapper med konkav forkant. Bredvinget, bleggrøn eller hvidlig stilk. Kronerne med grålilla stribe. Frugten mørkt rødlig-lilla. TA,KY.VI-VII.

T. pindicola (Bald.) Hand.Mazz. Nær foregående, men bladlapperne tandede (helr. hos alb.) Stilken lyserød til rødlilla. Frugten mørkt brunlilla som moden, kastanjerød som ung. 1100-2700m.

Chondrilla juncea L. Riskurv. 50-100cm. Grågrøn 2-flerårig, stærkt risagtigt grenet plante med oprette grene, stivhåret forneden. Øvre blade lange og linjeformede. Kurvene talrige, 1-4 sammen, smalt cylindriske, 9-12x2$\frac{1}{2}$-5mm. 0-1700m. VI-VIII.

C. ramosissima Sm. Udspærret riskurv. Som den foregående, men med udspærrede grene og stænglen kort hvidfiltet. VII-IX.

Lapsana communis L. Haremad. 0-2000m. V-X.

Crepis. Høgeskæg.

1. Kronerne lyserøde eller hvide ..... 2.
" gule 3.
2. Svøbbladene tæt gråfiltede ..... incana
" glatte til fintdunede rubra
3. Nogle kurve siddende i forgreningspunkterne ..... zacintha
Uden siddende kurve 4.
4. Ydre svøbblade oppustede, de indre filtede ..... vesicaria
" " ikke oppustede 5.
5. Flerårig ..... 6.
1-2-årig 9.
6. Stænglen bladløs eller kun med skælblade ..... aurea
" med mindst 1 veludviklet blad 7.
7. Bladene helrandede og linjeformede ..... crocifolia
" tandede til lappede 8.
8. Svøbbladene med talrige kirtelhår ..... fraasii
" let gråfiltede heldreichiana

9. Ydre svøbblade stærkt hindekantede ..... sancta
" " næppe " 10.
10. Randfrugterne vingede ..... dioscoridis
" ikke vingede 11.
11. Ihvertfald de indre frugter med et langt, tyndt næb .... 12.
Frugterne uden eller med et kort næb 13.
12. Ydre frugter kortnæbbede. Kurvbunden med avner .... foetida
Alle " langnæbbede. " uden " setosa
13. Bladene glatte til svagt hårede ..... 14.
" tæt korthårede 15.
14. Indre svøbblade med gullige kirtelhår ..... multiflora
" " " mørke " capillaris
15. Mest enstænglet. Svøbet glat eller med børster ... neglecta
Flerstænglet. Svøbet mest kirteldunet 16.
16. Ydre frugter krumme, oftest uden næb, indre med næb cytherea
Alle frugter rette, kortnæbbede hellenica

Crepis aurea (L.) Cass. Guldhøgeskæg. 5-20cm. Rosetplante med glatte, tandede til fligede blade på 1-11x½-2cm. Ugrenede stængler. Mørkegule kroner. 1500-2450m. VI-VIII. KY,ER.

C. fraasii Sch.Bip. ssp. fraasii 6-50cm. Stænglen tæt kirtlet og ukirtlet dunet, især foroven. Bladene med bredt ægformet endeafsnit. 1-2 stængelblade. 0-1900m. IV-VIII.

C. incana Sm. Gråt høgeskæg. 3-15cm. Grundbladene glatte til gråfiltede, fjersnitdelte. Stængelbladene reducerede. Grenede stængler. Lyst rødlilla blomster. 1050-2400m. ME,KY,KH,ER,PN. VII-VIII.

C. heldreichiana (Ktze.) Greuter (C. taygetea) 7-15cm. Bladene smalt omvendt lancetformede, 5-10cm, høvlformet fligede. Kronbladene med rødlilla yderside. 1450-2300m. VI-X. TA,PR.

C. crocifolia Boiss.& Heldr. Smalbladet høgeskæg. -35cm. Grundbladene 4-8cm x 2-4mm, glatte. 1600-2130m. VI-VIII. TA.

C. rubra L. Rødt høgeskæg. 4-40cm. Grundbladene 2-15cm, tandede til høvlfligede. Kurven 11-17mm, nikkende før blomstring. Ydre svøbblade blege eller hindeagtige. 0-800m. IV-V.

C. foetida L. ssp. commutata (Sprengel) Babcock Stinkende høgeskæg. 10-50cm. Med stinkende lugt. Bladene m.m. stivhårede, tandede til fligede. Svøbbladene bebørstede. 0-600m. III-V.

C. sancta (L.) Babcock Lysrandet høgeskæg. 5-20(-40)cm. Bladene m.m. i roset, kort lyshårede. Kurvbunden stivhåret mellem frugterne. Svøbbladene m.m. filtede. 3 slags frugter. 0-700m. IV-V.

C. dioscoridis L. Stilket gaffelkurv. 10-60cm. Kurvene ofte langstilkede, stilkene fortykkede i frugt. Kurven m.m. kugleformet i frugt. 0-600m. IV-VI.

C. multiflora Sm. 7-30cm. Bladene glatte, de nedre 1-5x½-1cm, tandede til høvlfligede. Mange kurve, m.m. kugleformede i frugt. Svøbet 8-9x4-6mm. 0-200m. IV-VI.

C. zacintha (L.) Babcock Gaffelkurv. 20-30cm. Enårig. Kurvsvøbet 5-7mm, glat eller filtet forneden, pæreformet i frugt. Ydre frugter stærkt sammentrykte. 0-600m. V-VI.

C. capillaris (L.) Wallr. Grønt høgeskæg. 0-600m. V-VII.

C. neglecta L. ssp. corymbosa (Ten.) Nyman 10-40cm. Stænglen grenet fra grunden, stivhåret forneden, halvglat foroven. Kurvene 3-7x1-4mm, med tætbørstet svøb. Kortnæbbede frugter.0-800m. IV-VI.

C. hellenica Kamari ssp. hellenica (C. neglecta ssp. fuliginosa) Dværgplante. Grundbladene 2-6x1-2cm. Kurvsvøbet 5-6x1-4mm.

C. cytherea Kamari 5-15cm. Grundbladene omvendt æg- til lancetformede, indtil 6cm. Kurvsvøbet 6-7x4-5mm, kirtelhåret. Randkronerne rødstribede. 0-500m. Kythæra + Antikythæra.

Crepis vesicaria L. Opblæst høgeskæg. 10-80cm. 1-flerårig. Ydre svøbblade oftest bredt hindekantede. Kurvstilkene med opblæste, skælagtige støtteblade, der ligner de ydre svøbblade. IV-VI.

C. setosa Haller f. Børstehøgeskæg. 10-80cm. Stænglen stivhåret. Bladene lyshårede. Støvfanget mørkegrønt. Kurvsvøbet 8-10mm.V-VII.

Andryala integrifolia L. Alm. filtkurv. 20-40cm. 1-2-årig. Tæt grågult dunet af stjærnehår og korte ugrenede hår. Bladene fra helrandede til bugtede, de øvre m.m. lancetformede og spidse. Mange kurve i en tæt halvskærm. Kronerne lysegule, lidt længere end svøbet. 0-1200m. IV-VI.

Hieracium. Høgeurt.

1. Frugten foroven med en knudret ring. Ofte med udløbere ... 2.
" " " " jævn ring. Aldrig med udløbere 5.
2. Stænglen med 1 kurv ..... hoppeanum
" " flere kurve 3.
3. Stængel og blade med mange alm. eller kirtelhår .... cymosum
" " " glatte eller med få alm. hår 4.
4. Med udløbere ..... bauhinii
Uden " piloselloides
5. Randkronernes tænder udpræget langhårede ..... graecum
" " glatte eller med få korte hår 6.
6. Hele planten tæt gulkirtlet ..... scapigerum
Anderledes 7.
7. Planten helt uden stjærnehår ..... naegelianum
Kurvstilke eller svøbblade med nogle stjærnehar 8.
8. Svøbbladene med sorte kirtelhår ..... 9.
" uden eller højst med meget små gule kirtelhår 11.
9. Grundbladene med afskåret grund, tit rødplettede .. epirense
" " kort eller langt kileformet grund 10.
10. Grundbladene med kort kilef. grund., ikke plettede parnassi
" " langt kilef. grund, ofte " leithneri
11. Kurvsvøbet fåhåret. Stænglen flerblomstret ... chalasinense
" m.m. tæthåret. Stænglen med 1-6 blomster 12.
12. Bladene kun randhårede, ellers m.m. glatte ..... cylleneum
Bladundersiden m.m. tæthåret 13.
13. Stængelhårene tætte forneden, fåtallige foroven, tættere mod kurvene ..... heldreichii
Stængelbehåringen anderledes 14.
14. Bladoversiden halvglat til noget håret ..... sartorianum
" tæthåret 15.
15. Griflerne mørke ..... psaridianum
" gule eller lidt mørke 16.
16. Med grundbladsroset ..... leucocomum
Uden grundbladsroset (eller bladene i en falsk roset over grunden) pannosum

Hieracium hoppeanum Schultes Butskællet høgeurt. 3-25cm. Ligner Håret høgeurt, men svøbbladene m.m. butte og udløberne korte og tykke. 400-2500m. V-VIII. 2 underarter:
ssp. testimoniale Nägeli: Kurvsvøbet med kirtelhår og 0-få alm. hår. PR.
ssp. pilisquamum Nägeli & Peter: Kurvsvøbet med alm. hår og 0-få kirtelhår. TA,PR,KY.

H. bauhinii Schultes 20-70cm. Med lange og tynde udløbere.

H. piloselloides Vill. Tungehøgeurt. 15-50cm. Bladene m.m. blågrønne. 6-7 5-7mm lange kurve. Grundbladene 6½-14cm x 5-8mm. Kurvsvøbet med mange kirtel- og stjærnehår. 800-2000m. VII.

H. cymosum L. Kvasthøgeurt. 10-50cm. Kvasten tæt, skærmagtig, med 3-20 kurve. Svøbet med tætte hvide eller grå alm. hår.2ssp:
ssp. heldreichianum Nägeli & Peter: Stænglen med få til mange kirtelhår, i det mindste under kvasten. 1400-2600m. TA,KY,KH,ER.
ssp. sabinum (Seb.) Nägeli & Peter: Stænglen uden eller med meget få kirtelhår lige under kvasten. 1300-2150m. sVI-VII.KH,ER.

Hieracium graecum Boiss.& Heldr. 10-25cm. 4-6 grundblade, blågrønne, de indre 4-11cm x 3-11mm, tæthårede. 1-2 store og 1-2 små stængelblade. Mest 1 kurv med tæt låddent svøb. TA,KY,KH.sVII-VIII.

H. scapigerum Boiss.& al. 5-20cm. 6-9 gradvist mindre jævnt fordelte blade (evt. samlede i en falsk roset), de nedre groft tandede til næsten fligede ved grunden. 1650-2450m. VII-VIII. ME,KY,KH.

H. naegelianum Pancic 7-28cm. Grundbladene 2-10½cm x 4-11mm, blågrønne, glatte eller svagt randhårede, ofte bølgede. Griflerne mest gule. Mest 1-kurvet. 1750-2800m. sVII-IX. TA,KH.

H. epirense (Zahn) Buttler 15-25cm. 3-8 grund- og 1(2) stængelblade, oftest groft tandede, m.m. glatte ovenpå, noget krushårede nedenunder. 1-3 kurve. 1700-2300m. VI-VII. KY.

H. parnassi Fries 15-32cm. 4-7 grund- og 1-2 små stængelblade, blågrønne, jævnt hårede på begge sider. Kurvstilkene m.m. sortkirtlede. 1-4 kurve. 1700-2300m. sVI-sVII. KH.

H. leithneri (Heldr.& Sart.) Zahn 10-30cm. 4-7 grund- og 1-3 mindre stængelblade, blågrønne, lancetformede, svagt tandede, tit glatte til svagt hårede ovenpå. 1800-2450m. sVI-fVIII.TA,KY,KH,ER.

H. chalasinense Zahn Stænglen tæthåret forneden, fåhåret foroven. Ca. 4-5 grene med 1(-3) kurve. Nedre blade i falsk roset, bredvinget stilkede. Lysrandet kurvsvøb. VII. TA (Khalasmeno Vuno).

H. cylleneum Hal. (graecum-naegelianum). Nær naegelianum, men lidt mere håret. 2100-2300m. KY (Zyria).

H. heldreichii Boiss. 10-36cm. 4-8 stængelblade, løst til tætsiddende i en falsk roset, omvendt ægformede, ret tyndt behårede, ofte næsten glatte på oversiden. Nederste grene ofte næsten grundstillede. Kurvstilkene hårede lige under kurven. Feneon-søen.

H. sartorianum Boiss.& Heldr. 10-21cm. Stænglen med talrige stjærnehår og ret få alm. hår. 5-7 blågrønne grundblade på 3½-9x½-1½cm, bugtet-tandede til lidt høvltandede. 2000m. sVII-VIII. TA,KY.

H. psaridianum Zahn -25cm. Bladene indtil 12x2½cm, aflangt-lancetformede, helrandede til noget finttandede, m.m. siddende. Kurvsvøbet 9-10mm, ægformet, svagt stjærnehåret. VII-VIII. TA.

H. leucocomum Arvet-Touvet 23-30cm. Stænglen tæt håret. 5-7 grund- og 3-5 stængelblade, hvoraf det nederste kan være veludviklet. 1 kurv. Svøbet 15-19½mm, tæt hvidlåddent. 1600-2100m. KY,KH.VI-VIII.

H. pannosum Boiss. Filthøgeurt. 10-45cm. 5-15 blade i stænglens nedre 1/3 eller samlede til en falsk roset, tæt langhårede. Kurvsvøbet 10-18½mm. Gule grifler. 750-2200m. VII-VIII. TA,ME,KY,KH,ER.

ALISMATACEAE

Alisma plantago-aquatica L. Vejbredskeblad. 0-1500m. V-VII.

A. lanceolatum With Lancetskeblad. 20-40cm. Bladene lancetformede, indtil 1½cm brede, med kileformet grund. Griflen m.m. ret. V-VII.

A. gramineum Lej. Kortskaftet skeblad. 10-40cm. Griflen spiralformet indrullet. Bladene båndformede eller med bladplade mod spidsen. Støvdragerne af griflernes længde. 0-300m. VII-VIII.

Baldellia ranunculoides (L.) Parl. Søpryd. 10-50cm. Som Lancetskeblad, men frugterne skrueformet stillede i et rundt hovede.

Damasonium alisma Miller Damstjærne. 5-40cm. Alle blade grundstillede, flydende og aflange hos vandformer, aflange med afrundet grund hos landformer. Oftest 6 stjærneformet udstående bælgkapsler. 0-500m. IV-V. Nær Kalogria-stranden.

BUTOMACEAE

Butmous umbellatus L. Brudelys. 0-1000m. IV-VII.

HYDROCHARITACEAE

Halophila stipulacea (Forsskål) Ascherson Havplante med krybende jordstængel med led på 1-4cm. Hver led med 2 klare til hvide skæl på 12-17x6-10mm og to blade på 3-6cm x 2½-8mm med finttandet spids og kileformet grund. Frugten med et næb på 4-6mm.

JUNCAGINACEAE

Triglochin bulbosa L. ssp. barrelieri (Loisel.) Rouy Knoldtrehage. 3-20cm. Stængelgrunden knoldagtigt fortykket. 3 lange frugter på udstående stilke. Om. IV-V.

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton. Vandaks.

1. Alle blade børsteformede ..... pectinatus
   Bladene lancet- til ægformede 2.
2. Alle blade modsatte, ingen flydeblade ..... densus
   Bladene spredte 3.
3. Undervandsbladene siddende ..... gramineus
   " stilkede 4.
4. Flydebladene gennemskinnelige ..... coloratus
   " ikke gennemskinnelige nodosus

Potamogeton coloratus Hornem. Vejbredvandaks. 0-500m. IV-VI.

P. nodosus Poiret Knudevandaks. Flydebladene store, elliptiske til lancetformede, 9-14x3-6cm; undervandsbladene lancetformede, ganske finttandede, undertiden henvisnende. Stængelleddene kortere forneden, hvor stænglen derfor bliver knudret. VI-VIII.

P. gramineus L. Græsbladet vandaks. 0-1000m. VI-VIII.

P. pectinatus L. Børstebladet vandaks. 0-2000m. VI-VIII.

P. densus L. (Groenlandia d.) Tæt vandaks. 0-1000m. V-VI.

RUPPIACEAE

Ruppia maritima L. Alm. havgræs. VI-X. Klasestilken 1-2cm

R. spiralis L. Langstilket havgræs. VI-X. Klasestilken 10-30cm.

POSIDONIACEAE

Posidonia oceanica (L.) Delile Gedebollegræs. Rodstokken tæt besat med fibre og bladrester, skyller op på stranden som "gedeboller". Ålegræsagtige blade med 13-17 strenge, 8-15mm brede og 10-30cm lange med but til udrandet spids. I saltvand. X-V.

ZOSTERACEAE

Zostera marina L. Ålegræs. Bladene 3-10mm brede med 5-9 strenge.

Z. noltii Hornem. Dværgbændeltang. Bladene 5-20cm x 1mm, 1-strengede.

ZANNICHELLIACEAE

Zannichellia palustris L. Vandkrans. 0-800m. IV-VII.

Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. Finttandet ålegræs. Et ålegræs, der er op til 4mm bredt, med 7-9 ribber og finttandet mod spidsen. Saltvand. V(-VIII).

LILIACEAE

1. Blomsterne i bladhjørnerne eller i klaser fra bladhjørnerne 2.
   " i en endestillet stand eller lige fra løget 4.
2. Linjeformede blade (kladodier) ..... Asparagus
   Brede blade (eller kladodier) 3.
3. Slyngplante med tornet stængel ..... Smilax
   Stænglen uden torne, ikke slyngende Ruscus
4. Blomsterne udgår direkte fra løget ..... Colchicum
   " sidder på en stængel 5.

5. Blomsterne i skærm, i knop dækkede af svøbblade ..... Allium
   Anderledes 6.
6. Blosterbladene mindst 1/5 sammenvoksede ..... 7.
   " højst 1/5 " 10.
7. Blosterrøret længere end tænderne ..... 8.
   " kortere " " 9.
8. Blosteret indsnøret ved mundingen ..... Muscari
   " ikke indsnøret fortil Bellevalia
9. Alle blomsterstilkene kortere end blomsterne .... Strangweia
   Nedre blomsterstilke længere end " Brimeura
10. Ingen stængelblade (1-2 blade kan dog omskede stænglen og derved ligne stængelblade) ..... 11.
    Stængelblade til stede 15.
11. Blosteret blåt eller lillat ..... Scilla
    " hvidt 12.
12. Bladene væk under blomstringen. Knolden 5-15cm .... Urginea
    Anderledes 13.
13. Blosteret med en rødlig midterribbe ..... Asphodelus
    " ensfarvet eller med en grønlig midterribbe 14.
14. Støvknapperne grundfæstnede ..... Anthericum
    " rygfæstnede Ornithogalum
15. Støvknapperne rygfæstnede og m.m. vippelige ..... 16.
    " grundfæstnede 17.
16. Bladene med en bred, hindeagtigt, omskedende grund
    Lysegule blomster ..... Asphodeline
    Bladene ikke omskedende Lilium
17. Støvfanget siddende ..... Tulipa
    Med en veludviklet griffel 18.
18. Blomsterne nikkende ..... Fritillaria
    " ikke nikkende Gagea

Asphodelus fistulosus L. Trind skarnlilje. 30-50cm. Bladene m.m. trinde, hule, 1-5mm tykke. Blomsterne i en smalt kegleformet top, 12-16mm. Kapslen rund, 5-7mm bred. 0-800m. III-V.

A. tenuifolius Cav. Tyndbladet skarnlilje. 30-40cm. Bladene hule og trinde, 2mm tykke. Blomsterne 6-10mm. Kapslen ægformet, 4mm bred. 0-500m. II-V.

A. ramosus L. Dødslilje. 40-150cm. Bladene 15-40x1-3cm, flade. Blomsterne i en oftest mangegrenet top. Blosteret 15-20mm. Støttebladene hindeagtige til bleggrønne. 0-600m. IV-V.

Asphodeline lutea (L.) Rchb. Kejserlys. 40-80cm. Blomsterne gule, 20-25mm lange. Støttebladet længere end blomsterstilken, der er leddet nær midten. Stænglen bladet til klasen. 0-1700m. IV-V.

A. liburnica (Scop.) Rchb. 25-60cm. Blomsterne gule. Støttebladet kortere end blomsterstilken, der er leddet nær grunden. Stænglen kun bladet i sin nedre halvdel. 200-1300m. IV-V.

Anthericum liliago L. Ugrenet edderkopurt. sV-fVIII. KH.

Colchicum. Tidløs. En ordentlig bestemmelse kræver både blomster og blade, der imidlertid sjældent er udviklede samtidigt.

1. Bladene udviklede under blomstringen ..... 2.
   " ikke til stede under blomstringen 5.
2. Med 2(-3) blade ..... 3.
   " 3-6(-8) blade 4.
3. Med underjordiske udløbere. Løghinden rødbrun ..... psaridis
   Uden " " . " mørkebrun cupanii
4. Bladene 4-8(-10)mm brede ..... triphyllum
   " 1-2(-5)mm " pusillum
5. Støvfangene prikformede, under 1mm ..... 6.
   " nedløbende, over 1½mm 7.
6. Blosterets overside med en tydelig hvid stribe .. pulchellum
   " " uden nogen hvid stribe parlatoris
7. Blosteret tydeligt spættet ..... bivonae
   " ikke eller svagt spættet. Gule støvknapper 8.

8. Bladene tiltrykt grunden, ofte bølgede ..... lingulatum
" m.m. oprette, ikke bølgede 9.
9. Bladene linje-lancetformede. 0-1300m ..... neapolitanum
" m.m. aflange. 1300-2400m graecum

Colchicum triphyllum G.Kunze Trebladet tidløs. 3(4) ofte rukantede blade. Løghinden hindeagtig, gul- til rødbrun. Blosterbladene 21-29x5-9mm. Mørkegrå/sortlilla støvknapper. sII-IV. ME,KH.

C. cupanii Guss. Tvebladet tidløs. Bladene 10-18mm brede. Blosterbladene -25x3-5mm. Støvknapperne 2-3mm, sortlilla. Prikformet støvfang. 0-1600m. IX-XI.

C. pusillum Sieber Liden tidløs. 3-6 blade. Blosterbladene 10-20x1½-2mm. Støvknapperne 1½-3mm sortlilla, grå eller lysebrune. Prikformet støvfang. 0-1400m. X-XI.

C. psaridis Heldr. Bladene 3-15mm brede. Blosterbladene 12-27 x 3-6mm. Støvknapperne 2mm, sortlilla. Prikformet støvfang. IX-XII.

C. parlatoris Orph. Mørkebrun løghinde. 6-8(4-10) blade på 7-10 cm x 1-4mm. Blosterbladene 8-25x4-8mm. Støvknapperne 4-6mm, gule. VIII-XI.

C. pulchellum K.Persson 3-4(5) blade på 7-12x½-1mm. Blosterbladene 17-25x4-9mm. Støvknapperne 3½-5mm, gule. 1400-1850m. sVIII-IX. TA (Xerovuna),KY.

C. neapolitanum (Ten.) Ten. Bølgeåret tidløs. 3-4 blade på 14-26x1-3(4)cm. Blosterbladene mest 30-45x7-12mm. VIII-IX.

C. lingulatum Boiss.& Spr. Bølget tidløs. Løghinden mørkebrun og læderagtig. 4-6 blade på indtil 15cm x 1-2cm. Blosterbladene 20-40x3-10(-15)mm. Støvknapperne 5-8mm. IX-X.

C. graecum K.Persson Løghinden flerlaget, læderagtig, mørkt rødtil sortbrun. 4-5 blade på 15-25x2-6cm, mest ret tykke, matgrønne. Blosterbladene 30-60x6-15mm. Støvknapperne 6-10mm. VIII-IX. TA.ME.KY.KH.ER.

C. bivonae Guss. Spættet tidløs. 5-9 blade, 8-13mm brede. Blosterbladene 55-65x8-20mm. Støvknapperne 7-8mm, sort- til brunlilla. 400-1850m. VIII-X.

Gagea. Guldstjærne.

1. Blomsten hvid ..... graeca
" gul 2.
2. Blosterbladene tilspidsede ..... 3.
" butte til spidse 5.
3. Nedre stængelblade m.m. ægformet ..... minima
Stængelbladene smalt linjeformede 4.
4. Grundbladet fladt ..... fibrosa
" halvtrindt reticulata
5. Blomsterstilkene glatte ..... chrysantha
" dunede, i det mindste ved grunden 6.
6. Grundbladene hule og trinde ..... fistulosa
" ikke hule 7.
7. Stængelbladene m.m. fjærnede fra støttebladene .... bohemica
" sidder tæt på støttebladene 8.
8. 1-3 blomster. Blosteret 15-20mm ..... peduncularis
5-12 " " 13-15mm arvensis

Gagea minima (L.) Ker-Gaw. Liden guldstjærne. 1 fladt, ½-2½mm bredt grundblad. 1-2 spredte stængelblade. 1-5 blomster. Flere trådformede støtteblade. 1800-2100m. V-VII.

G. reticulata (Pallas) Sch.& Sch.f. Skedeguldstjærne. 10-15cm. Vokser mest i grupper. Løghinden rager op over jorden og danner en skede omkring stængelgrunden. Mest 4-8 blomster. III-IV.

G. fibrosa (Desf.) Sch.& Sch.f. Trævlguldstjærne. 2-9cm. Løget

indhyllet i et net af opadbøjede rødder. Planten enlig. Blosterblade 14-20mm. 1-3(-4) blomster. 250-600m. III-IV.

Gagea graeca (L.) A.Terr. Flerblomstret bjærgstjærne. 5-25cm. 2-4 grundblade. Spredte stængelblade. 3-5 blomster på 10-15mm med oftest 3 røde striber. 0-1500m. III-V.

G. fistulosa Ker-Gaw. Alpeguldstjærne. 5-12cm. 1 grundblad, 3-5 mm bredt som presset. 2 mest modsatte stængelblade. Blosterbladene 11-18mm, butte til halvspidse. 1700-2500m. V-VI. KH,ER.

G. arvensis (Pers.) Dum. (A. villosa) Agerguldstjærne. 10-15cm. 2 furede grundblade, 2-3mm brede. 5-15 blomster, 10-15mm lange, med butte blosterblade. 1200-2200m. sIV-V. KH.

G. peduncularis (Presl) Pascher Langstilket guldstjærne. 3-14cm. Blomsterstilkene ofte 3-4cm, forlænges under blomstringen. 2 løg i samme hinde. 0-1300m. II-IV.

G. chrysantha (Jan) Sch.& Sch.f. (G. amblyopetala) Langbladet guldstjærne. 5-10cm. 2 smalle, furede grundblade, der er længere end kvasten. Oftest 2 spredte stængelblade. Blosteret ca. 10mm, but, 3-året, rødligt udvendigt. 1050-2050m. II-IV.

G. bohemica (Zauschner) Sch.& Sch.f. Åben guldstjærne. 3-7cm. 2 grundblade, ½-1mm tykke. 1-5 blomster, 10-12mm lange. Blosterbladene spidse til halvbutte. 1200-1800m. sIII-fV.

Tulipa. Tulipan.

1. Blosteret med gul grundfarve, ingen mørk plet .... australis
" sj. gult, med en mørk plet indvendigt forneden 2.
2. Blosterbladene langt tilspidsede. Bølgede blade ... boeotica
" ikke tilspidsede 3.
3. Løghinden filtet indvendigt af bølgede hår ..... goulimyi
" med få rette hår indvendigt orphanidea

Tulipa australis Link Sydlig tulipan. 10-25cm. 2-3 mest blågrønne grundblade. Blosteret med rødligt anstrøg udvendigt eller grønlige. Gule støvknapper. 1100-2200m. sIII-VI. PR,KY.

T. orphanidea Boiss. Brandtulipan. 8-27cm. 3-7 blade. Blomsten 3-5cm, orange til orangerød, ofte med grønligt skær. Mørke støvknapper. IV-V. 0-1700m. TA,PR,ME,OL,KH.

T. goulimyi Sealy & Turrill ca. 15cm. 5-7(3-8) m.m. bølgede blade. Blomsten orange til brunligrød; gullig i skygge. III-V. SØ-spidsen, Elafonisos, Kythæra.

T. boeotica Boiss.& Heldr. (T. undulatifolia) Kruset tulipan. 17½-38(-50)cm. 3-4 blade. Blomsten 3-7cm, skarlagenrød, med en stor, gulrandet, sort plet indvendigt. 0-900m. III-IV. NØ-Pelop.

Fritillaria. Vibeæg.

1. Blosteret rent gult, m.m. kegleformet ..... conica
" højst noget gult, klokkeformet 2.
2. Blosteret ikke spættet, bredt gulspidset ..... rhodocanakis
" spættet, ikke gulspidset 3.
3. Nederste blade 3-7mm brede ..... messanensis
" " mindst 7mm brede 4.
4. Bladene grønne, de nedre mest modsatte ..... mutabilis
" grågrønne, mest alle spredte 5.
5. Blosterbladene med et gulgrønt længdebånd ..... graeca
" højst med et svagt gulligt bånd spetsiotica

Fritillaria conica Boiss. 7-33cm. 5-7 friskgrønne, skinnende blade, de nedre indtil 10x3cm. Blosteret 16-26mm. 1-2 blomster. III. 0-400m. Mellem Pilos og Methoni, Sapientza-øen.

F. rhodocanakis Orph. -25cm. Indtil 7 spredte blade. Blosteret 13-20mm, brunlillat med bred gul spids. Honningkirtlerne 3-5mm, ægformede. 0-500m. III. Hydra og det overfor liggende fastland.

Fritillaria messanensis Rafin. 15-30cm. 7-10 linjeformede blade, de øverste ofte 3 sammen. Blomsten 22-32mm, gullig til brunlig, ofte med grønt længdebånd. Honningkirtlen 6-10mm. III-IV.

F. mutabilis Kamari -20cm. Blomsten 20-25mm, brunlilla, mest med brede, grønne længdebånd.(evt. gulgrøn og svagt spættet). Honningkirteln 2-4mm, ægformet. 600-2100m. IV-VI.OL,KY,KH,ER,PN.

F. graeca Boiss.& Spr. 6-22cm. Blomsterne brunlilla, utydeligt spættede. Honningkirtlen 6-12xl-2mm. 0-2000m. sIII-mV. TA,PR, ME,OL,KY,KH,ER,PN.

F. spetsiotica Kamari -25cm. Blomsterne brunlilla, svagt spættede. Honningkirtlen -6mm, ægformet. 7 blade, de nedre æg-lancetformede. 20-250(-550)m. III. Spetses samt NØ-Pelop.

Lilium candidum L. Hvid lilje. 90-120cm. Blosterbladene hvide, ca. 8cm, med tilbagebøjet spids. 0-1500m. V-VI.

L. chalcedonicum L. Sølvkantet lilje. 35-90cm. 1-6 skarlagenrøde blomster. Blosterbladene 5-7½cm, stærkt tilbagekrummede. 500-1900m. sVI-fVIII. TA,PR,ME,OL,KY,KH,ER.

Ornithogalum. Fuglemælk.

1. Blomsterne i en forlænget klase, ofte 20-50(-80) stykker 2.
" i en halvskærm eller kort klase 7.
2. Bladene med en hvid stribe ..... nutans
" uden nogen hvid stribe 3.
3. Blomsterne grønlige eller gullige indvendigt ..... 4.
" hvide indvendigt 5.
4. Blomsterne klare eller blegt grønlighvide ... sphaerocarpum
" gullige til grønlige pyrenaicum
5. Støvknapperne grønlige ..... prasinantherum
" gule 6.
6. Griflen trådformet, mest længere end frugtknuden narbonense
" tykkere nedad, mest kortere end frugtkn. brevistylum
7. Bladene ikke hvidstribede ..... 8.
" med en hvid stribe 13.
8. Blosterbladene uden grøn stribe ..... arabicum
" grønstribede 9.
9. Bladene dunede eller randhårede (undertiden meget kort) 10.
" glatte 11.
10. Frugtstilken ikke nedbøjet. Bladene ikke dunede .. comosum
" nedbøjet. Bladene mest dunede fimbriatum
11. Støttebladene ca. ½ x blomsterstilken ..... montanum
" lig eller længere end blomsterstilkene 12.
12. (1-)2-3 blade ..... oligophyllum
4-6(2-8) stærkt blågrønne blade atticum
13. Frugtstilken nedbøjet ..... 14.
" højst noget nedadrettet 16.
14. Løget omgivet af mange småløg ..... refractum
" uden eller med få småløg omkring sig 15.
15. Umodne frugtstilk slap og furet i spidsen ..... sibthorpii
" " stiv og trind i " exscapum
16. Løget omgivet af mange småløg ..... 17.
" uden eller med få småløg omkring sig 18.
17. Småløgene inden for løghinden. Frugtstilkene udstående umbellatum
Småløgene uden for løghinden. Frugtstilkene lidt nedadbøjede divergens
18. Bladene kortere end blomsterstanden ..... gussonei
" mindst så lange som blomsterstanden collinum

Ornithogalum pyrenaicum L. Pyrenæisk fuglemælk. 30-80cm. Bladene ofte visne under blomstringen. Blosteret grønligt udvendigt, gulligt indvendigt, efterhånden med indrullede kanter. V-VII.

O. sphaerocarpum A.Kerner Rundfrugtet fuglemælk. 30-60cm. Frugtknuden kugle- til ægformet. Griflen lig eller lidt længere

end frugtknuden. 0-1000m. V-VI.

Ornithogalum narbonense L. Pyramidefuglemælk. 30-50cm. Frugtknuden 3½-5mm, ægformet med afskåret spids. Griflen 4,2-5,5mm. V-VI.

O. brevistylum Wolfner

O. prasinantherum Zahar. Grønhannet fuglemælk. 40-90cm. Frugtknuden 3-5mm, æg-lancetformet med kegleformet spids, der går lige over i den 5-6½mm lange griffel. VI.

O. oligophyllum E.D.Clarke Fåbladet fuglemælk. 9-24cm.Bladene 2-15mm brede, ofte bredest over midten. Kapsel og frugtknude med 6 vinger. Frugtstilkene slappe og hængende. IV-VI. KY,KH.

O. montanum Ten. Udspærret fuglemælk. 9-20cm. 5-30 blomster. Frugtstilkene udstående til opstigende. Kapslen med 6 butte ribber. 0-2200m. IV-VII. PR,OL,KY,KH.

O. atticum Boiss.& Heldr. 12-30cm. Bladene vredne som unge, bredt hindekantede. Blosteret 10-15mm. V-VI.

O. fimbriatum Willd. ssp. gracilipes (Zahar.) Landström Håret fuglemælk. 10-20cm. Bladene hårede på begge sider. Blosteret 12-20mm. Kapslen ca. 10mm, ribbet. 900-1500m. V-VI.

O. collinum Guss. Bakkefuglemælk. 7-20cm. Stænglen 0-4cm. Kapslen med 6 smalvingede kanter. 0-1000m. IV-V.

O. sibthorpii W.Greuter 5-15cm. Bladene blågrønne. Halvskærmen sidder lige på jorden. Stilken opsvulmet ved grunden efter blomstringen. Frugtknuden med nedtrykt spids. Kronen 12½-26mm.II-III.

O. exscapum Ten. Stængelløs fuglemælk. Blosteret ikke over 15mm, ellers som foregående. 0-1000m. III-IV.

O. comosum L. Duskfuglemælk. 15-30cm. Bladene blågrønne og randhårede. Blosteret 10-20mm. Frugtknuden med 6 rundede kanter.IV-VI.

O. umbellatum L. Kostfuglemælk. Kapslens kanter jævnt fordelte, adskilte af svage furer. 0-1200m. IV-V.

O. gussonei Ten. (O. orthophyllum) Smalbladet fuglemælk. Kapslen med 6 butte kanter, adskilte af dybe furer. Støvknappen ofte med en mørk plet ved støvtråden. 0-1200m. IV-V.

O. refractum Kit. Lav fuglemælk. 5-8cm. Stænglen ½-1cm. Blosteret 15-24mm. Stilken opsvulmet ved grunden efter blomstringen. Bladene m.m. oprette, ofte over 2 x klasen. 0-400m. III-IV.

O. divergens Boreau Stribet fuglemælk. Kapslens kanter parvist stillede, adskilte af svage furer. 0-2400m. III-VII.

O. nutans L. Nikkende fuglemælk. 0-1100m. III-IV.

O. arabicum L. Storblomstret fuglemælk. 30-80cm. Blomsterne store og åbne, hvide eller flødefarvede. Blosteret 15-32mm. Frugtknuden sortlilla. 0-600m. III-V.

Urginea maritima (L.) Baker Strandløg. Et stort løg på 10-15cm med store, læderagtige blade på 12-20x3-6cm, der først udvikles efter blomstringen. Stænglen 50-150cm med en op til 60cm lang klase med tætsiddende 6-8mm lange, hvide blomster. 0-600m. IX-X.

Scilla bifolia L. Tvebladet vårstjærne. 5-20cm. 2 skinnende, 3-10mm brede blade med ofte noget hætteformet spids. Oftest uden støtteblade. 1-12 blå blomster på 5-10mm. 1000-2400m. II-VI. TA,PR,ME,KY,KH,ER.

S. messenica Boiss. Kantet vårstjærne. 5-7 12-20mm brede blade. Stænglen kantet. Støttebladene ca. 1mm. 7-15 lyseblå blomster på 6-7mm.

S. autumnalis L. Høstvårstjærne. 5-20cm. 6-20 lyst blå- til rødlilla 3-5mm store blomster i en forlænget klase. Ingen støtteblade. De 5-10 1-2mm brede blade udvikles under eller efter blomstringen. 0-1400m. VIII-IX.

Brimeura fastigiata (Viv.) Chouard Syrenhyacint. 3-8cm. Flere oprette blade, der er lidt længere end skaftet, 1-3mm brede. 1-8 oprette, lilla eller hvidlige, klokkeformede, 6-10mm lange blomster. 0-2000m. III-IV.

Strangweia spicata (Sm.) Boiss. (Bellevalia hyacinthoides) Akshyacint. -15cm. 4-8 svagt randhårede blade. Støttebladene med en nedbøjet, valseformet spore. 5-10 oprette, lyseblå blomster på 7-10mm. 0-1000m. sI-IV.

Bellevalia. Rørhyacint. Ligner Muscari, men blomsterne ikke tilsmalnede fortil.

B. trifoliata (Ten.) Kunth Trebladet rørhyacint. 25-40cm. Klasen valseformet. Bladene oprette, 15-30mm brede. Blosteret 8-16 mm, lillat med grønlige tænder. 0-700m. III-IV.

B. dubia (Guss.) Rchb. Slap rørhyacint. 15-40cm. Klasen valseformet. Bladene liggende, 7-11mm brede. Blosteret 5½-8mm, blålillat eller mørkegrønt, med hvidlige, grønårede tænder. III-IV.

B. ciliata (Cyr.) Nees Hængende rørhyacint. 20-50cm. Klasen kegleformet. Bladene 1-3cm brede. Blomsterstilkene 3-3½cm, hængende, indtil 10cm i frugt. Blosteret 9-11mm, lillat. 0-100m. IV-V.

Muscari. Perlehyacint.

1. Modne frugtbare blomster brunlige ..... comosum
" " " blå 2.
2. Blosteret blegblåt. Høstblomstrende ..... parviflorum
" blåt til sorteblåt. Vårblomstrende 3.
3. Tænderne sorteblå ligesom blosteret ..... commutatum
" lysere end blosteret 4.
4. Både golde og frugtbare blomster klart blå ..... botryoides
Frugtbare blomster mørke, golde blomster blegblå 5.
5. Tænderne lyseblå. Blomsten mørkeblå under duggen neglectum
" hvide. Blomsten mørkt rødlilla under duggen pulchellum

Muscari comosum (L.) Miller Duskhyacint. 15-80cm. Let kendelig ved sin endestillede lyslilla halvskærm af golde, 6-25mm lange blomster. Ellers en indtil 40cm lang klase. 0-1500m. IV-VI.

M. botryoides (L.) Miller Perlehyacint. 7-30cm. 2-3 5-12mm brede blade. De frugtbare blomster 2½-4mm, kugle- til krukkeformede; tænderne hvide. 0-2500m. II-VII.

M. neglectum Guss. Druehyacint. 10-30mm. 3-7 blade, 1½-6mm brede, bredt furede med gulnende spids. Blosteret 3½-7mm, ægformet til aflangt krukkeformet. 0-2400m. III-VII.

M. pulchellum Heldr.& Sart. Broget druehyacint. De mørkt rødlilla blomster og hvide tænder giver klasen et broget udseende.

M. commutatum Guss. Mørk druehyacint. 10-20cm. Bladene ½-1½cm brede, 2-5 stykker. Blosteret 5-6mm, noget udvidet før indsnævringen. 0-1800m. III-IV.

M. parviflorum Desf. Småblomstret perlehyacint. 10-25cm. Bladene 1-2(3½)mm brede, furede. 14(8-20) blomster på 3-5mm; tænderne udadbøjede med en mørkere plet. X.

Allium. Løg.

1. Bladene m.m. lavtsiddende, alle sidder lige lavt ..... 2.
" omskeder mindst ¼ af stænglen, udgår fra forskellige højde 10.
2. Skærmen næsten siddende, midt i en bladroset ... chamaemoly
Med veludviklet stængel 3.
3. Blosteret nedbøjet efter blomstring. Bladene 1-5cm brede 4.
" opret " " 5.
4. Blosteret med indadbøjet spids i blomst ..... cyrilli
" udstående under blomstringen nigrum

5. Bladene hårede, eller randhårede ved grunden ..... 6.
" glatte 8.
6. Stænglen håret. Bladene skrueformet indrullede circinnatum
" glat. " rette 7.
7. Blomsterstilkene 3-5 x blomsterne ..... subhirsutum
" 1½-3 x " trifoliatum
8. Stænglen trekantet ..... neapolitanum
" trind 9.
9. Løghinden gennemhullet. Blomsterne mest lyserøde ... roseum
" ikke hullet. " hvidlige phthioticum
10. Indre støvtråde langt trespidsede ..... 11.
" " enkle eller med 2 små tænder 22.
11. Bladene omskedende helt op til skærmen ..... chamaespathum
" omskeder 1/4-2/3 af stænglen 12.
12. Støvknapperne indesluttede eller lidt udragende ..... 13.
" tydeligt udragende 16.
13. Bladene hule, ½-2mm brede ..... vineale
" flade eller trinde 14.
14. Bladene 1mm brede og trådformede ..... gomphrenoides
" 2-40mm brede og flade 15.
15. Støvdragerne meget kortere end blosteret ... scorodoprasum
" ca. lig blosteret ampeloprasum
16. Bladene flade, 4-50mm brede ..... 17.
" hule, i det mindste forneden 19.
17. Bladranden finttandet. Løghinden nettrævlet atroviolaceum
" ru. Løghinden ikke netagtigt optrævlet 18.
18. Indre blosterblade fint savtakkede. Ydre støvtråde ofte 3-spidsede ..... commutatum
Indre blosterblade ikke savtakkede. Ydre støvtråde enkle bourgeaui
19. Indre blosterblade tydeligt længere end ydre amethystinum
Blosterbladene m.m. lige lange 20.
20. Svøbet affaldende, med 1 lappet blad ..... 21.
" blivende, med 2-4 blade sphaerocephalon
21. Med yngleknopper ..... vineale
Uden " guttatum
22. Stænglen hul og opblæst, 1-4cm tyk ..... cepa
" ikke opblæst 23.
23. 1 helrandet svøbblad ..... 24.
2 svøbblade 25.
24. Bladene omskedende næsten op til skærmen ... callimischion
" 1/3-3/4 omskedende cupani
25. Støvknapperne langt udragende ..... 26.
" indesluttede eller lige udragende 29.
26. Blosteret lyserødt ..... 27.
" gult til grønligt 28.
27. Bladskederne hårede, især de nedre ..... hirtovaginum
" glatte stamineum
28. Blosteret citrongult. Stilkene meget uens ..... flavum
" m.m. grønligt. Stilkene næsten ens hymettium
29. Længste svøbblade længere end skærmen ..... 30.
Svøbbladene højst af skærmens længde 34.
30. Skærmen åben, stilkene 10-70mm, meget uens ... paniculatum
Blomsterstilkene 5-18mm, -25mm i frugt 31.
31. Frugtknuden ca. så lang som bred ..... staticiforme
" 2-3 x så lang som bred 32.
32. Støvknapperne røde ..... parnassicum
" gule 33.
33. Blosteret 3½-5mm, mest hvidt ..... pallens
" 5-6½mm, lyserødt eller brunligt achaium
34. Støvknapperne indesluttede ..... 35.
" lidt fremragende 36.
35. Blosteret 3-4mm. Bladene 0,2-0,5mm brede .... obtusiflorum
" 4-5mm. " 1-1,5mm brede maniaticum
36. Blomsterstilkene næsten ens ..... staticiforme
" meget uens frigidum

Allium cepa L. Haveløg. VI-VIII. Dyrket og forvildet.

A. roseum L. Rosenløg. 10-65cm. Løghinden med talrige, små, ofte sekskantede huller. Blosterbladene 7-12x3-5mm, mest lyserøde, ellers hvide. 1 svøbblad, dybt 3-4-lappet. 0-700m. IV-V.

A. circinnatum Sieber ssp. peloponnesiacum Skrueløg. 5-10cm. Skærmen med 2-5 blomster. Blosteret 5-6mm, hvidt, med lyserød ribbe. 0-250m. III-IV.

Allium phthioticum Boiss.& Heldr. 40-65cm. Bladene 5-10mm brede. Svøbbladet med 3-4 trekantede tænder. Ofte med yngleknopper. Blosteret 9-13½mm, hvidt. 1400-2300m. VI-VII. ER,KH.

A. neapolitanum Cyr. Hvidt løg. 20-50cm. Mest 2 blade, ½-2cm brede, kølede nedenunder. Skærmen 5-8cm bred. Blosterbladene 8-12x4-6mm, hvide. 0-800m. V-VI.

A. subhirsutum L. Randhåret løg. 7-30cm. Bladene randhårede, 2-10mm brede, næsten grundstillede. Blosteret 7-9mm, hvidt. Støvknapperne mest brune, sjældent gule. 0-600m. III-V.

A. trifoliatum Cyr. Trebladet løg. 15-45cm. 2-3 svagt hårede blade, 2-15mm brede. Blosteret 7-10mm, hvidt, med lyserødt skær eller ribbe. Gullige støvknapper. 0-800m. IV-V.

A. chamaemoly L. Dværgløg. 1-4cm. Blade og blomster omtrent i jordhøjde. Bladene 3-8mm brede og randhårede. Skærmen med 5-10 hvide blomster på 7-8mm. 0-1000m. XII-III.

A. frigidum Boiss.& Heldr. 10-22cm. 2-3 trådformede blade på -5cm x ¾mm; skeder og blade glatte til lådne. 5-20 lyserøde eller brunlige blomster på 5-6½mm. 1500-2300m. sVI-VIII. TA,PR, ME,KY,KH,ER,Klokos.

A. achaium Boiss.& Orph. Ligner frigidum, men med langt svøbblad. 1000-2200m. VII-VIII. Klokos.

A. cupani Rafin. ssp. hirtovaginatum (Kunth) Stearn Kvastløg. 9-30cm. Ydre løghinde nettrævlet, forlænget opad i en krave. Bladene ½mm tykke. Svøbbladet med rørformet grund, omslutter stilkenes grund. Skærmen noget ensidig. 0-2000m. VI-IX.

A. callimischion Link Brunåret løg. 9-38cm. Bladene trådformede, 1mm tykke. Meget uens blomsterstilke. Blosteret 5-7mm, hvidt med brun eller rød åre. 300-2000m. IX-XI.

A. obtusiflorum DC. Butblomstret løg. 4-18cm. 2-3 blade på 3-15 cm. Skærmen mangeblomstret, stilkene 2-12mm, meget uens, de ydre krumme. Blomsten hvid til blegrød med mørkere åre. V-VI.

A. maniaticum Brullo & Tzanoudakis 4-15cm. 2-4 blade, 4-6cm lange. Skærmen åben med 5-12(20) blomster. Stilkene uens, 3-20 mm. Blosteret blegrødt. VI. Gerolimenas på Mani-halvøen.

A. paniculatum L. Topløg. 20-60cm. Bladene indtil 2mm brede, indrullede som tørre. Skærmen 3½-7cm, halvkugle- til ægformet. Blosteret 4½-7mm, oftest but. 0-1500m. VI-VIII.

A. pallens L. Blegt løg. 10-30cm. Skærmen 1½-3½cm bred, tæt, med 10-70 hvide eller lyserøde blomster. Stilkene næsten ens. Støvknapperne delvist fremragende. 0-1200m. VI-VII.

A. parnassicum (Boiss.) Hal. 10-20cm. Bladene trådformede, 0,6-0,8mm tykke. 4-12 lyserøde eller hvide blomster med brunlilla åre og rand. Stilkene uens. 1800-2400m. VII-IX.

A. staticiforme Sm. 7-30cm. Bladene ½-2mm, hule. Skærmen 1½-2½ cm bred, mest tæt, halvkugleformet; stilkene næsten ens. Blosteret 3-3½mm, lyserødt med rød åre (eller hvidt).

A. flavum L. ssp. flavum Gult løg. 10-30cm. Bladene blågrønne, ¾-1mm brede. Frugtknuden m.m. kugleformet. Blosteret 4½-5mm, but. 900-2300m. VII-VIII. ME?.

Allium hirtovaginum Cand. 10-20cm. Skærmen 2-3½cm bred, åben med 10-25 lyserøde blomster på 4-4½mm. 3 blade, 0,4mm brede. Stilkene uens. Frugtknuden med stilkagtig grund. VI.

A. hymettium Boiss.& Heldr. 4-30cm. Bladene ½mm brede, 2/3-3/4 omskedende. Skærmen 1-3cm bred, med 8-30 blomster. Stilkene 5-12 mm. Blosteret grønligt, med gult eller brunt skær, 3½-4mm.

A. stamineum Boiss. 10-35cm. Bladene ½-1mm tykke. Svøbet mest ikke meget længere end stilkene, disse meget uens. Skærmen åben. Blomsterne blegt rødlilla, 3½-5cm. VI-VII.

A. ampeloprasum L. Porreløg. 45-180cm. Kan have yngleknopper. Skærmen 5-9cm bred, kugleformet, mest tæt, med 30-500 hvide til mørkerøde blomster på 4-5½mm. 0-1200m. IV-VI.

A. atroviolaceum Boiss. Mørkt løg. 50-120cm. Bladene 4-12mm brede. Skærmen 3-6cm bred, kugleformet og mangeblomstret. Blosteret 3½-5mm, mest mørkt rødlilla, spidst. 0-300m. VI.

A. bourgeaui Rech.f. ssp. cycladicum Bothmer 45-100cm. Bladene ½-2½cm brede og kølede. Skærmen 3-6cm bred, mangeblomstret, stilkene næsten ens. Blosteret mørkt rødlillat. 0-800m. VI-VII.

A. commutatum Guss. Savtandet løg. 40-180cm. Bladene indtil 4½ cm brede. Blosteret blegrødt eller gulliggrønt med grøn eller rød ribbe. 0-400m. VII-VIII.

A. scorodoprasum L. ssp. rotundum (L.) Stearn Kugleløg. 30-60cm. Bladene 2-10mm brede, mørkegrønne. Ydre blosterblade mørkt rødlilla, indre blegere. Ingen yngleknopper. 0-600m. V-VII.

A. sphaerocephalon L. Hovedløg. 30-90cm. Bladene 1-4mm, hule. Skærmen 1-6cm bred, kugle- til meget bredt ægformet. 3 underarter:
ssp. sphaerocephalon: Blosteret lyserødt til rødlillat.
ssp. arvense (Guss.) Arc.: Blosteret hvidt med grøn eller lyserød køl. Bloster og stilk jævne.
ssp. trachypus (Boiss.& Spr.) Stearn: Blomsten som hos arvense. Blomst og stilk finvortede.

A. vineale L. Sandløg. 1400-2200m. sVI-fVIII. OL,KY.

A. amethystinum Tausch Ametystløg. 20-120cm. Stænglen ofte rødlig foroven. Bladene ofte visne i blomst. Skærmen tæt, 3½-5cm, m.m. kugleformet. Blomsterne rødlilla, 3-4½mm. 0-1200m. V-VI.

A. guttatum Steven ssp. sardoum (Moris) Stearn (ssp. tenorei) Stribet løg. 10-90cm. Skærmen 1½-5cm bred. Ydre blomsterstilke nedbøjede, indre oprette. Blosteret 2½-4½mm, hvidligt med grøn eller lyserød stribe. 0-800m. IV-VI.

A. gomphrenoides Boiss.& Heldr. 8-24cm. Svøbet -1cm, tolappet, kortnæbbet, blivende. Skærmen 1-2cm bred, tæt, halvkugleformet. Blosteret 5½-7mm, rødt. Bleggule støvknapper. S-Pelop., Kythæra.

A. chamaespathum Boiss. Skedeløg. 25-30cm. Bladene hule, m.m. visne i blomst. Blosteret cylindrisk, 4-4½mm, hvidt eller matgrønt; ydre blosterblade butte, indre afskårne foroven. IX-X.

A. nigrum L. Bredbladet løg. 60-90cm. Bladene 1-8cm brede, med noget bølget rand. Skærmen 5-10cm bred. Blosterbladene 6-9x1½-3½ mm, hvide eller bleglilla med grønlig ribbe. 0-1000m. IV-V.

A. cyrilli Ten. Smalfliget løg. 50-60cm. Bladene blågrønne, 1-3½ cm brede, finttandede. Skærmen 4-7cm bred. Blosteret 6-7x1-1½mm, hvidt med bred grøn stribe. 0-600m. IV-V.

Asparagus acutifolius L. Buskasparges. 30-150cm. Stænglerne forveddede, hvide eller grå. Kladodierne 10-30 sammen, 2-8mm, næsten ens. Blomsterne gulgrønne, 3-4mm. Bærret sort. 0-1300m. VIII-IX.

A. aphyllus L. ssp. orientalis (Baker) P.H.Davis Gitterasparges. 30-50cm. Stænglerne forveddede, grønne. Kladodierne 3-7 sammen, 10-20mm, tydeligt uens. Bærret sort. 0-2000m. VII-IX.

Ruscus aculeatus L. Alm. musetorn. 30-60cm. Stedsegrøn halvbusk med bredt lancetformede, spidse og stikkende kladodier på 20-32 x 8-14mm. Mørkegrønne grene. Blomsterne udgår midt fra kladodiets overside. Et rødt bær. 0-600m. II-V.

Smilax aspera L. Pigtråd. 1-4m. Stedsegrøn slyngplante med glatte, tornede stængler og spredte hjærte-pilformede, læderagtige blade på ofte 8-10x4-5cm. Hvide blomster i skærme eller korte klaser fra de øvre bladhjørner. Rødt eller mørkt bær. VIII-XI.

S. excelsa L. Rundbladet pigtråd. -20m. Bladene bredt ægformede til rundagtige, indtil 12½x9cm, med afrundet eller svagt hjærteformet grund.

AGAVACEAE

Agave americana L. Sekelplante. Tykbladet rosetplante. Bladene tornet-tandede med en solid spids, 1-2m x 15-25cm. Blomstrer een gang med en bred, 2-5m høj top. 0-600m. VII-VIII.

AMARYLLIDACEAE

Sternbergia. Tordenurt. Ligner gule, høstblomstrende krokusser, dog med 6 støvdragere.

S. colchiciflora W.& K. Stængelløs tordenurt. 5-10cm. Bladene dannes om foråret, væk under blomstringen, 4-10cm x 2-5mm. Stænglen mest underjordisk. Blosterrøret ca. så langt som blosterbladene, der er 3-4cm x 2-5mm. 1200-2300m. IX-XI. KY,KH m.m.

S. lutea (L.) Ker-Gaw. Tordenurt. 12-22cm. Bladene til stede under blomstringen, 7-15mm brede, friskgrønne og uden midterstribe. Stænglen 4-10cm under blomstringen. Blosterbladene 3½-6x1-2½cm, butte. 350-600m. IX-XI.

S. sicula Tineo Liden tordenurt. Som den foregående, men bladene mørkegrønne med blågrøn midterstribe, 2-6mm brede. Blosterbladene 3-5cm x 6-15mm, spidse. 100-1000m. IX-XI.

Leucojum aestivum L. Sommerhvidblomme. 35-60cm. Bladene flade. En skærm af 2-5 hvide blomster på 13-22mm med en grøn plet lige under blosterbladets fortykkede spids. 0-300m. IV-V.

Galanthus reginae-olgae Orph. -20cm. En vintergæk med bladene matgrønne ovenpå med en tydelig, blågrøn midterstribe, blågrønne med en svag køl nedenunder. 2 underarter:
ssp. reginae-olgae: Bladene udvikles efter blomsterne. IX-XI. Taygetos, SV-Pelop.
ssp. vernalis Kamari: Bladene udvikles før blomsterne. I-III.

Narcissus serotinus L. Høstnarcis. 10-30cm. Bladene udvikles efter blomstringen, trådformede, 2mm brede. 1 blomst med et støtteblad på 2-3cm. Blosteret hvidt. Bikronen orange, reduceret til en 1-1½mm bred ring. 0-900m. IX-XI.

N. tazetta L. ssp. tazetta Tazet. 20-50cm. Bladene 1cm brede. Støttebladet 5-6cm. 3-8 blomster med en 3-5mm lang, gul eller orange, kopformet bikrone. Blosteret hvidt. 0-1400m. XII-III.

Pancratium maritimum L. Strandlilje. 20-60cm. Bladene op til 50x2cm, mørkt grågrønne. 10-15cm lange, hvide blomster med et 6-8cm langt blosterrør. Den øverste del af blomsten tragtformet med en 12-tandet bikrone. Sandstrand og klitter. VII-IX.

DIOSCOREACEAE

Tamus communis L. Fedtblad. 1-4m. Slyngplante med spredte, retstore (5-10x3-8cm), fedtglinsende blade med krumme og grenede årer. Små 6-fligede, grønne blomster i klaser fra bladhjørnerne. 0-800m. IV-V. 2 underarter:
ssp. communis: Bladene bredt æg-hjærteformede, hele.
ssp. cretica (L.) Kit Tan: Bladene spydformet trelappede; sidelapperne runde, midterlappen lancetformet.

IRIDACEAE

1. Griffelgrenene kronbladsagtige ..... 2.
" ikke kronbladsagtige 4.
2. Bladene med firkantet tværsnit ..... Hermodactylus
" flade 3.
3. Uden blosterrør ..... Gynandriris
Med " Iris
4. Blomsterne i aks ..... Gladiolus
" ikke i aks 5.
5. Blosterrøret højst 1cm. Frugtknuden overjordisk .... Romulea
" over 1½cm. " underjordisk Crocus

Hermodactylus tuberosus (L.) Miller Hermesfinger. 20-40cm. Jordstænglen med 2-4 fingerformede knolde. Bladene 1½-3mm brede. En enlig, gulgrøn irisblomst. Ydre blosterblade brune ovenpå og lysrandede. 0-1400m. II-III.

Iris. Sværdlilje.

1. Ydre blosterblade med en hårstribe (skæg) ..... 2.
" " uden " 3.
2. Stænglen højst 1cm ..... attica
" 40-90cm germanica
3. Blosterrøret 5-20cm ..... unguicularis
" 7-15mm 4.
4. Blosteret hvidt med gule pletter ..... orientalis
" gult pseudacorus

Iris unguicularis Poiret Spids sværdlilje. M.m. stængelløs. Bladene 1-5mm brede. Blomsten blå til lilla med gul stribe omgivet af et hvidligt, mørkstribet felt. 0-1450m. I-IV. 2 underarter:
ssp. carica (W.Schultze) Davis & Jury: Ydre blosterblade 48-79 x 10½-22mm, omvendt lancetformede, farverne mere udviskede.
ssp. cretensis (Janka) Davis & Jury: Ydre blosterblade indtil 55x15mm, smalle; farverne stærkere.

I. pseudacorus L. Gul sværdlilje. 0-1000m. IV-VI.

I. orientalis Miller (I. spuria ssp. ochroleuca) 30-90cm. Bladene 6-20mm brede. 2-4 hvide blomster, de ydre blosterblade med gul midterplet. Frugtknuden med et næb på 2-3cm. V-VI.

I. attica Boiss.& Heldr. 8-12cm. Bladene 4-9mm brede, stærkt seglkrummede. Blomsterne gule, lilla, gule/brunlilla eller hvide/blålilla. Blosterrøret 2½-7cm. 400-2100m. IV-V. PR.

I. germanica L. Havesværdlilje. 50-100cm. Bladene 2½-4½cm brede. Støttebladene 3½-5½cm, hindeagtige i øvre ½. Blomsten 10-12cm, lyslilla eller over i det blå. Gul hårstribe. 500-1500m. IV-V.

Gynandriris sisyrinchium (L.) Parl. (Iris s.) Toknoldet sværdlilje. 8-12cm. Bladene 10-30cm, ofte liggende og halvcirkelformet krummede. Ydre blosterblade 2½-4cm, himmelblå med gul eller hvid plet. Støvknapperne 4½-10mm. 0-850m. I-V.

Crocus. Krokus.

1. Støvknapperne hvide ..... 2.
" gule eller mørke 3.
2. Støvtrådene glatte eller finvortede nederst ..... laevigatus
" finvortet-dunede over det meste boryi
3. Vårblomstrende: I-VI ..... 4.
Høstblomstrende: IX-XII 6.
4. Blomstens grundfarve lilla ..... sieberi
" " gul 5.
5. Griflen med 0-3 grene ..... chrysanthus
" " 6(-15) grene olivieri
6. Støvknapperne sortlilla ..... biflorus
" gule 7.

7. Griflen mangegrenet ..... cancellatus
" med 3 grene, der kan være udvidede og frynsede i spidsen 8.
8. Griffelgrenene over ½ x blosterbladene ..... cartwrightianus
" under ½ x " 9.
9. Løghinden ikke trævlet. Svælget hvidt ..... goulimyi
" fint nettrævlet. Svælget mest gult 10.
10. Støttebladet med grønne eller lilla årer eller pletter niveus
Støttebladet hvidt hadriaticus

Crocus sieberi Gay Fyrrekrokus. Bladene 1½-6mm brede. Blomsterne lavendelblå med gult svælg. Griflen med 3 korte, stærkt udvidede og frynsede grene. 2 underarter:
ssp. sublimis (Herbert) B.Mathew: Blosteret med dunet svælg. 1500-2300m. IV-VI. KY,KH,PN.
ssp. nivalis (Bory & Chaub.) B.Mathew: Blosteret med glat svælg. 1100-2400m. II-VI. TA (Prof.Ilias, Xerovuna).

C. olivieri Gay ssp. olivieri Seksgrenet krokus. Løghinden trævlet. Bladene 2½-4mm brede. Griflen 6-grenet. Griflen ofte kortere end støvdragerne. II-IV.

C. chrysanthus (Herbert) Herbert Guldkrokus. Løghinden jævn, med ringe ved grunden. Bladene ½-2½mm brede. I-V.

C. biflorus Miller ssp. melanantherus Tveblomstret krokus. Blomsterne hvide eller blålilla, ofte stærkt stribede; svælget hvidt, lillat eller gult. 0-1200m. X-XI.

C. cartwrightianus Herbert Langgriflet krokus. Løghinde netformet trævlet. Blomsterne mørkt lilla med mørkere årer eller hvide; svælget hvidt eller lillat. Bladene mest randhårede. X-XII.

C. hadriaticus Herbert Hvid krokus. Griffelgrenene 10-16mm, ikke særligt udvidede i spidsen. Blosteret hvidt (sj. bleglillat), svælget gult (sj. hvidt). X-XII.

C. niveus Bowles Løghinden ofte forlænget i en krave. Blosteret hvidt el. bleglillat, svælget gult. Griffelgrenene ofte udvidede og lappede i spidsen. X-XI. S- og SØ-Pelop.

C. goulimyi Turrill Løghinden glat, opsplittes i smalle, trekantede tænder. Blosteret lyst til mørklillat. Griffelgrenene udvidede til lappede. 300-750m. X-XI. S- og SØ-halvøen.

C. laevigatus Bory & Chaub. Stjærnekrokus. Løghinden jævn, langt trekantet opsplittende ved grunden. Blomsterne hvide eller lilla, svælget gult. 0-1400m. X-II(-IV).

C. boryi Gay Flødekrokus. Løghinden papirsagtig , trævlet opsplittende. Flødefarvede blomster, sjældent med lillat skær. 150-1500m. IX-XII.

C. cancellatus Herbert ssp. mazziaricus (Herbert) B.Mathew Gitterkrokus. Løghinden meget groft nettrævlet. Bladene kommer efter blomstringen. Blomsterne hvide eller bleglilla. IX-XI.

Romulea. Sivstjærne. Trådformede blade uden hvidt bånd. Ofte ret små, mest lilla/hvide blomster, som regel på en kort stængel.

1. Griffel og støvfang rager op over støvdragerne bulbocodium
" " " lig eller kortere end støvdragerne 2.
2. Blomsterne ensfarvet lilla, svælget ikke lysere .. linaresii
" med hvidt eller gult svælg 3.
3. Øvre støtteblad overvejende hindeagtigt ..... columnae
" " " urteagtigt ramiflora

Romulea bulbocodium (L.) Seb.& Mauri Langgriflet sivstjærne. 3-15cm. Blomsten meget forskelligt farvet, 20-35mm uden røret; svælget oftest gult. 0-1200m. II-IV.

Romulea linaresii Parl. ssp. graeca Béguinot Ensfarvet sivstjærne. 5-12cm. Blomsterne 13-20mm. Øvre støtteblade hindeagtigt. 500-1100m. II-IV.

R. columnae Seb.& Mauri Mørkåret sivstjærne. 2-15cm. Blomsterne hvide eller bleglilla med mørkere årer, 9-15mm. 0-950m. II-IV.

R. ramiflora Ten. Blå sivstjærne. 15-40cm. Bladene 6-30cm. Blomsterne lyst til mørkt lilla med mørkere årer. Frugtstilkene indtil 10cm. Blosteret 10-18mm. 0-750m. II-III.

Gladiolus. Bladene sværdformede. Blomsterne rødlilla, lidt uregelmæssige, med ofte krummet blosterrør.

G. italicus Miller Markjomfrufinger. 50-100cm. Støvknappen længere end støvtråden. Nedre skeder ofte blegt til mørkt rødlige. Øvre blosterblad længere end de 2 ved siden af. 0-1150m. IV-V.

G. illyricus Koch Illyrisk jomfrufinger. 25-50cm. Støvknappen kortere end støvtråden. Nedre skeder bleggrønne (evt. med rødligt skær). Øvre blosterblade m.m. ens. 0-500m. V-VI.

JUNCACEAE

Juncus. Siv.

1. Enårige ..... 2.
   Flerårige 6.
2. Bladene med tydelige tværvægge ..... pygmaeus
   " uden tværvægge 3.
3. Stænglen bladløs ..... capitatus
   " med 1-2 blade 4.
4. Blomsterne oftest i knipper på 2-3 ..... hybridus
   " " enlige 5.
5. Kapslen 2-3mm. Støvknappen 1/4-1/3 x tråden ..... minutulus
   " 3-5mm. " ca. ½ x tråden bufonius
6. Alle blade grundstillede, cylindriske, stængellignende ... 7.
   Bladene forskellige fra stænglerne 11.
7. Blomsterstanden trængt til side af det lange, stængellignende støtteblad ..... 8.
   Blomsterstanden længere end sit støtteblad eller lig det 9.
8. Nedre bladskeder sortbrune og skinnende ..... inflexus
   " " gulbrune og matte effusus
9. Indre blosterblade spidse, uden øren ..... maritimus
   " " med brede, hindekantede øren i spidsen 10.
10. Kapslen 4-6mm, over 2 x blosteret ..... acutus
    " 2½-4mm, lig eller lidt længere end blosteret heldreichianus
11. Nedre blade uden eller med svage tværvægge ..... subulatus
    " " med tydelige tværvægge 12.
12. Grundbladene reducerede til bladskeder ..... subnodulosus
    " med veludviklede bladplader 13.
13. Med indtil 2m lange, rodslående udløbere ..... fontanesii
    Ingen udløbere 14.
14. Blade og stængler længdestribede ..... striatus
    " " " jævne articulatus

Juncus maritimus Lam. Strandsiv. Om. VI-VIII.

J. acutus L. Stikkende siv. 50-150cm. Tæt tueformet og stærkt stikkende. Stænglen 2-5mm tyk. Om. IV-VII.

J. heldreichianus Marsson ssp. heldreichianus 50-120cm. Som den foregående, men ikke så stikkende. Stænglen 1½-2½mm tyk. IV-VII.

J. inflexus L. Blågrået siv. 0-2000m. IV-VIII. PR,KY,KH.

J. effusus L. Lysesiv. 0-1850m. V-VIII.

J. subulatus Forsskål Mellembrudt siv. 50-100cm. 2-4 slappe, 6-8mm brede stængelblade. Toppen 10-20cm, åben og mangeblomstret. Blosteret spidst, kapslen but. 0-600m. V-VI.

Juncus bufonius L. Tudsesiv. 0-1700m. V-IX.

J. minutulus Albert & Jah. Spæd siv. 0-2000m. III-VIII.

J. hybridus Brot. Svikkelsiv. 5-20cm. Toppen bred, danner ofte en flad vifte. Blosterbladene uens, de ydre længst, 4-5mm.IV-VII

J. capitatus Weigel Fint siv. 1-20cm. 1-4 hoveder med 2 støtteblade og 5-10 blomster. Blosteret 2 x kapslen. 0-500m. IV-V.

J. pygmaeus Richard Dværgsiv. 1-10cm. 0-1 stængelblade. 1-2 støtteblade. Stænglen med 1-5 hoveder med 2-15 blomster. Blosteret 2 x kapslen. 0-500m. IV-V.

J. subnodulosus Schrank Butblomstret siv. 0-1000m. VI-VIII.

J. striatus Schousb. Stribet siv. 30-60cm. Med krybende jordstængel. Nøglerne m.m. kugleformede. Blosterbladene tilspidsede, de indre længst. Kapslen spids og kegleformet. 0-1000m. V-VI.

J. fontanesii Gay ssp. fontanesii Krybsiv. 10-30cm. Bladskederne med 2 øren. Blosteret 2½-4mm, spidst til tilspidset. Kapslen med et næb på oftest 1-2mm. 0-600m. VI-VII.

J. articulatus L. Glanskapslet siv. 0-2050m. V-VIII.

Luzula. Frytle.

1. Blomsterne enlige ..... forsteri
" i fler- til mangeblomstrede nøgler 2.
2. Blomsterstanden aksformet og nikkende ..... pindica
Blomsterne samlede i flere nøgler 3.
3. Kapslen 4-5mm. Blosterbladene 4½-5½mm ..... nodulosa
" 2-3mm. " 2½-4mm 4.
4. Støvknapperne 1,5-2,2mm, 2-6 x tråden ..... campestris
" 0,4-1,2mm, ¾-2 x " multiflora

Luzula campestris (L.) DC. Markfrytle. 900-2200m. IV-VI. KH.

L. multiflora (Retz.) Lej. Mangeblomstret frytle. 0-2150m.IV-VI

L. pindica (Hausskn.) Chrtek & Krisa Bredbladet aksfrytle. 20-45cm. Bladene 2-5cm x 1-4mm. Støtte- og forblade frynsetrandhårede. Blosteret 2-3mm, mørkebrunt. V-VII. TA,KH,PN.

L. nodulosa (Bory & Chaub.) E.H.F.Meyer 30-50cm. 2-7 hoveder med 5-10(2-15) blomster. Blosteret matbrunt, hindekantet. Grundbladene 2-8mm brede. 350-1300m. IV-V.

L. forsteri (Sm.) DC. Smalbladet fyrtle. 20-30cm. Bladene 2½-3½mm brede. Uden udløbere. Nedre bladskeder rødlilla til lilla. Blosteret 3½-5mm, brunt og hindekantet. 150-1000m. III-VI.

POACEAE

Svøbgræsser: Få småaks i en kort stand, omgivne af et fællessvøb.

Aksgræsser: Småaksstanden et enkelt eller flere kas, hvor de enkelte småaks sidder m.m. lige på aksets akse, eller hvor hvert andet kan være kortstilket.

Duskgræsser: Småaksstanden danner en sammentrængt top, hvor man ved ombøjning kan erkende, at småaksene sidder på korte, grenede stilke og derfor ikke direkte på aksen.

Topgræsser: Småaksstanden en top med for det meste synlige stilke.

Svøbgræsser

Flerårig. Svøbet dækker småaksene helt ..... Lygeum

Aksgræsser

1. Småaksstanden består af flere aks ..... 2.
" " " 1 aks 12.

2. Med knæbøjet stak ..... 3.
Uden " " 5.
3. 3-20 m.m. fingerformet stillede aks ..... Dichanthium
Aksene parvist stillede 4.
4. 1 par endestillede aks ..... Andropogon
Flere par aks fra bladhjørnerne Hyparrhenia
5. Skedehinden hindeagtig ..... 6.
" hårformet eller manglende 8.
6. Småaksene brunlilla ..... Digitaria
" grønne 7.
7. Nedre yderavne væk eller reduceret ..... Paspalum
2 veludviklede yderavner Beckmannia
8. Aksene m.m. fingerformet stillede ..... 9.
" spredtstillede 10.
9. Med krybende jordstængler. 1-blomstrede småaks .... Cynodon
Uden " " . Flerblomstrede småaks Eleusine
10. Småaksene indsænkede i en ret tyk akse ..... Stenotaphrum
" anderledes 11.
11. Småaksene 4-8-blomstrede ..... Aeluropus
" 2-blomstrede Echinochloa
12. Akset kort og kugleformet, avnerne stikkende ... Echinaria
" forlænget 13.
13. Med en forlænget, knæbøjet stak ..... 14.
Stakken ret eller manglende 15.
14. Nederste blomsts inderavne med stak ..... Gaudinia
" " " uden stak Ventenata
15. 2-3 småaks ved hvert led ..... 16.
1 " " " " 17.
16. 3 småaks ved hvert led ..... Hordeum
2 " " " " Taeniatherum
17. Småaksene 1-blomstrede ..... 18.
" flerblomstrede 22.
18. Småaksene ensidigt stillede ..... Nardus
" toradede 19.
19. Inderavnen med stak ..... Psilurus
" uden stak 20.
20. Småakset med 1 yderavne ..... Hainardia
" " 2 yderavner 21.
21. Aksets akse uden hulheder til småaksene ..... Mibora
" " med " " " Parapholis
22. 1 yderavne. Smaaksene vender kanten mod aksen ..... Lolium
2 yderavner 23.
23. Avnerne hvælvede med 2-4 stakke eller tænder .... Aegilops
" med 0-1 stak 24.
24. Yderavnerne med 2 hårede køle ..... Dasypyrum
" " 0-1 køle 25.
25. Flerårig ..... 26.
Enårig 28.
26. Yderavnerne sylformede med 1 ribbe ..... Secale
" m.m. lancetformede med flere ribber 27.
27. Smaaksene 2-4cm, de nedre kortstilkede ..... Brachypodium
" mest kortere, siddende Elymus
28. 2(1-5) småaks på 2-3cm med 6-16 blomster .... Brachypodium
Flere og mindre småaks 29.
29. Inderavnen tæt fintknudret ..... Castellia
" ikke " 30.
30. Yderavnerne m.m. ens ..... Catapodium
" uens Sclerochloa

Duskgræsser

1. To slags småaks: golde og frugtbare ..... 2.
Småaksene ens 4.
2. Frugtbare småaks brede, vinget-kølede ..... Phalaris
" " smalle 3.
3. Golde småaks spidse eller med stak ..... Cynosurus
" " uden stak, butte Lamarckia

4. Dusken lådden af hår eller stakke ..... 5.
" ikke lådden 9.
5. Småaksene uden stak ..... 6.
" med " 7.
6. Yderavnerne lådne, længere end blomsterne ..... Imperata
" glatte, omtrent lig " Melica
7. Småaksene 2-blomstrede. Flerårig ..... Pennisetum
" 1-blomstrede. Enårige 8.
8. Bladene blødhårede. Dusken ægformet ..... Lagurus
" glatte. Dusken forlænget Polypogon
9. Småaksene omgivne af børster ..... 10.
" ikke omgivne af børster 11.
10. Børsterne brunlige, ikke sammenvoksede ..... Setaria
" sammenvoksede forneden Cenchrus
11. Småakset med 1 frugtbar blomst ..... 12.
" " 2-flere frugtbare blomster 19.
12. Yderavnerne med en knude ved grunden. Enårig ... Gastridium
" uden " " " 13.
13. Inderavnen med stak ..... 14.
" uden " 16.
14. Inderavnen med 1 grundstillet, knæbøjet stak og 2 børster i spidsen ..... Triplachne
Inderavnen med 1 rygstillet stak, uden børster i spidsen 15.
15. Yderavnerne lige lange ..... Alopecurus
" uens Anthoxanthum
16. Skedehinden hårformet ..... Crypsis
" hindeagtig 17.
17. Småaksene 11-13mm. Dusken 10-25cm ..... Ammophila
" mindre 18.
18. Yderavnen med en vinget køl ..... Phalaris
" " " uvinget køl Phleum
19. Dusken ensidig ..... 20.
" alsidig 22.
20. Skedehinden hårformet ..... Aeluropus
" hindeagtig 21.
21. Flerårig. 20-130cm ..... Dactylis
Enårig. 2-15cm Sclerochloa
22. Inderavnen med 3-5 brodspidsede tænder foroven ... Sesleria
" spids, but eller kort tokløvet 23.
23. Flerårig ..... Koeleria
Enårig Lophochloa

Topgræsser

1. To slags småaks: frugtbare og golde .... Duskgræsser punkt 3.
Småaksene m.m. ens 2.
2. Småaksene med 1 frugtbar blomst ..... 3.
" " flere frugtbare blomster 15.
3. Toppen dækket af hvide hår ..... Saccharum
" ikke dækket af hvide hår 4.
4. Småaksene i par af 1 siddende og 1-2 stilkede ..... 5.
" alle ens 6.
5. Bladene ca. 3mm brede, langhårede ..... Chrysopogon
" 1-7cm brede, glatte Sorghum
6. Med hårformet skedehinde ..... 7.
Skedehinden hindeagtig eller manglnede 8.
7. Småaksene med 1 frugtbar blomst ..... Sporobolus
" " " " " og 1 gold blomst Panicum
8. Med 1 frugtbar og 1-2 golde blomster ..... 9.
Udne golde blomster 11.
9. Med en rygstillet, knæbøjet stak på 10-27mm .. Arrhenatherum
Uden eller med kort stak 10.
10. Småaksene brune ..... Melica uniflora
" ikke brune Holcus
11. Inderavnen læderagtig, indrullet. Stakken 1½-31cm ... Stipa
" ikke indrullet. Stakken indtil 12mm 12.

12. Inderavnen med hvælvet ryg ..... 13.
" " kølet ryg 14.
13. Inderavnen med stak ..... Oryzopsis
" uden stak Milium
14. Stakken kortere end inderavnen eller mangler .... Agrostis
" 2-5 x inderavnen Apera
15. Inderavnerne omgivne af m.m. lange, hvide hår. Høje planter over 1m ..... 16.
Inderavnerne ikke omgivne af lange, hvide hår 18.
16. Bladranden skarpt savtakket ..... Cortaderia
" helrandet 17.
17. Strået forveddet. Yderavnerne næsten lige lange ... Arundo
" urteagtigt. " uens Phragmites
18. Yderavnerne så lange som eller længere end inderavnerne 19.
" kortere end inderavnerne 29.
19. Ingen eller en endestillet stak ..... 20.
En rygstillet stak 23.
20. Hårformet skedehinde ..... Schismus
Hindeagtig skedehinde 21.
21. En endestillet stak. Sammentrængt top ..... Avellinia
Ingen stak 22.
22. Småaksene meget små, 1-1½mm ..... Airopsis
" 5-9mm Melica
23. Flerårig ..... 24.
Enårig 25.
24. Yderavnerne kølede. Småaksene 4-9mm ..... Trisetum
" hvælvede. Småaksene 10-21mm Helictotrichon
25. Småaksene hængende, 17-45mm ..... Avena
" m.m. oprette, mindre 26.
26. Stakken meget kort og kølleformet ..... Corynephorus
" trådformet 27.
27. Småaksene ca. 10mm, mest med 4-7 blomster ..... Ventenata
" 1½-3½mm, med 2-3 blomster 28.
28. Småaksene gyldne ..... Trisetum aureum
" sølvhvidt hindeagtige Aira
29. Inderavnen med en stak, der rager mindst 2mm ud over småaksets spids ..... 30.
Inderavnen uden eller med en kortere stak 34.
30. Stakken rygstillet og knæbøjet ..... Helictotrichon
" ikke rygstillet 31.
31. Inderavnen kløvet med en stak i selve kløften ..... 32.
" ikke kløvet 33.
32. Bladene børsteformede, 0,3-0,6mm brede .... Danthoniastrum
" flade Bromus
33. Nedre yderavne højst ½ x den øvre. Enårig ..... Vulpia
Yderavnerne ret ens. Flerårig Festuca
34. Skedehinden hårformet ..... 35.
" hindeagtig 36.
35. Toppen åben. Småaksene med 7-12 blomster ..... Eragrostis
" smal. " " 2-4 " Molinia
36. Inderavnen med hjærteformet grund. Hængende småaks Briza
" uden " " 37.
37. Enårig ..... 38.
Flerårig 42.
38. Stive og trekantede topgrene ..... 39.
Bøjelige topgrene 41.
39. Inderavnerne tæt fintknudrede ..... Castellia
" ikke " 40.
40. Topgrenene udspærrede. Åben top ..... Cutandia
" ikke udspærrede Catapodium
41. Småaksene 3-7mm, med 3-5 blomster ..... Poa
" 1-1½mm, med 2 " Molinierella
42. Inderavnerne hvælvede ..... 43.
" svagt eller tydeligt kølede 46.
43. Småaksene mest 2-blomstrede. Inderavnen 3-ribbet Catabrosa
" flerblomstrede. Inderavnen 5-11-ribbet 44.

44. Yderavnerne med 1 ribbe, inderavnerne med 5-11 ... Glyceria
" " 3 ribber, " " 5 45.
45. Inderavnerne spidse ..... Festuca
" butte Puccinellia
46. Nederste topgren enlig ..... Dactylis
" topgrene i krans 47.
47. Inderavnen tydeligt kølet ..... Poa
" svagt kølet, spids eller med kort stak.
Toppen lilla. Bladene 0,4-0,7mm tykke Bellardiochloa

Festuca. Svingel.

1. Skedehinden 1-3mm ..... 2.
" kortere 3.
2. Øvre yderavne næsten helt hindeagtig. Stakken 0,2-2,2mm cyllenica
Øvre yderavne urteagtig. Ingen stak stygia
3. Bladene 3-4mm brede. Planten 30-80cm høj ..... arundinacea
" smallere 4.
4. Bladene bløde, m.m. foldede, ½-1½mm brede, ret langt og tæt hårede på oversiden. Fugtigbundsplante ..... rubra
Bladene m.m. stive, 0,3-0,9mm brede, tæt sammenrullede, glatte eller korthårede på oversiden 5.
5. Stakken 0,1-1,2mm. Småaksene grønne eller med svagt lillat skær ..... jeanpertii
Stakken mest længere. Småaksene mest blågrønne eller lillaanløbne 6.
6. Bladene ru ..... valesiaca
" stort set jævne 7.
7. Gamle bladskeder ikke trævlede ..... polita
" " trævlede 8.
8. De golde skuds bladskeder helt lukkede ..... vizzavonae
" " " " ¼-½ åbne circummediterranea

Festuca stygia Scholz & Strid 40-70cm. Bladene flade og indtil 2½mm brede eller foldede og 1mm tykke. Toppen 10-20cm. Småaksene 9-12mm, mest gulgrønne. 1150-1750m. V. KH (Styx), KY.

F. arundinacea Schreber ssp. fenas (Lag.) Arc. Strandsvingel. Toppen smal og mellembrudt med oprette grene. Småaskene 5-7(-9) mm. 0-800m. IV-VI.

F. rubra L. Rød svingel. Smalbladede, ret tættuede fugtigbundsplanter. 1100-1900m.

F. cyllenica Boiss.& Heldr. ssp. cyllenica 25-80cm. Bladene ret stive og stikkende. Toppen 4-10cm, smal, mat gulgrøn og m.m. lillabroget. Stakken 0,2-2,2mm. 1400-2200m. V-VIII. TA,PR,KY,KH,ER.

F. vizzavonae Ronniger 6-30cm. Bladene 0,3-0,63mm brede, ret bløde. Topgrenene glatte. Småaksene grønne eller lillaanløbne. Stakken 3-4,9mm. 2000-2500m. VII. KY,KH. (F. alpina p.p.)

F. jeanpertii (St-Yves) Markgr. ssp. achaica (MD.) MD. 30-60cm. Bladene 0,6-1mm tykke, glatte og blåduggede. Skederne ½ lukkede, m.m. trævlede som ældre. Småaksene med 5-7 blomster. 500-2100m.

F. circummediterranea Patzke 10-70cm. Bladene 0,5-1,1mm brede, blåduggede. Småaksene med 4-7 blomster, grønne eller lillaanløbne. Stakken indtil 3,7mm. 0-2200m. V-VII. ?

F. polita (Hal.) Tzvelev 14-52cm. Bladene 0,4-0,85mm tykke, stive, m.m. krumme. Toppen 4½-6½cm, mest tæt, grenene jævne eller svagt ru. Stakken ½ x inderavnen. 1600-2300m. TA,PR,ME,KY,KH,ER.

F. valesiaca Schleicher Furet svingel. 25-40cm. Bladene blåduggede. Toppen 3-7cm, lidt mellembrudt, topgrenene svagt ru. Småaksene blåduggede. Stakken mest ½ x inderavnen. 0-2000m. V-VII.

Lolium. Rajgræs.

1. Inderavnen læderagtig med bruskagtig grund ..... temulentum
" ikke bruskagtig ved grunden 2.
2. Med golde skud under blomstringen ..... 3.
Uden " " " " 4.
3. Oftest med stak. Strået næsten altid rut foroven multiflorum
" uden " . " glat foroven perenne
4. Småakset 2-10mm bredt, ikke indsænket i aksen multiflorum
" 1½-3½mm " , m.m. " i den stive akse 5.
5. Aksets akse 1-1½mm tyk ved grunden ..... rigidum
" " 1½-3½mm " " " subulatum

Lolium perenne L. Almindeligt rajgræs. 0-2000m. III-X.

L. multiflorum Lam. Italiensk rajgræs. 0-1300m. V-VII.

L. rigidum Gaudin Rut rajgræs. 18-45cm. 0-800m. IV-VI.

L. subulatum Vis. (L. loliaceum) 15-20cm. Om. V-VI.

L. temulentum L. Giftigt rajgræs. 20-70cm. Enårig. Inderavnerne elliptiske til ægformede, 6-8mm, mest med lang stak. V-VI.

Vulpia. Væselhale.

1. Nedre yderavne 0-1/10 x så lang som den øvre ... fasciculata
" " 1/6-1/2 x så " " " " 2.
2. Inderavnen randhåret ..... ciliata
" glat 3.
3. Toppen 10-20cm, noget bøjet, rører den øverste bladsk. myuros
" 2-8cm, rank, rører ikke den øverste bladsk. bromoides

Vulpia fasciculata (Forsskål) Samp. Strandvæselhale. 8-50cm. Skedehinden ½-1mm. Yderavnerne ½-2 og 15-20mm. Småaksene 10-18mm uden stakke. Sandstrand. IV-VI.

V. bromoides (L.) S.F.Gray Langstakket væselhale. 6-50cm. Yderavnerne 2½-5 og 4½-9mm (med stak). Småaksene 6½-11½mm uden stak.

V. myuros (L.) Gmelin Stor væselhale. 8-65cm. Yderavnerne ½-2½ og 2½-6½mm (med stak på indtil 1mm). Småaksene 6-10½mm uden stakke. 0-1300m. IV-VI.

V. ciliata Dumort Randhåret væselhale. 3-45cm. Ofte med blade lige til toppen. Småakset med 1-3 frugtbare og derover med 2-7 ligeså store golde blomster. Yderavnerne 0,1-1 og 1½-4mm. IV-VI.

Castellia tuberculosa (Moris) Bor (Catapodium t.) Knudeavne. 15-80cm. Opret eller opstigende, m.m. lilla. Bladene 3-6mm brede. Toppen oftest grenet med m.m. udstående sidegrene. 0-600m. IV-V.

Catapodium marinum (L.) Hubbard (Desmazeria m.) Liggende stivgræs. 5-15cm. Glat enårig med halvt liggende stængler. Akset toradet, indtager ofte over ½ af strået. Småaksene 2-4½mm brede, med tætstillede, taglagte inderavner. Om. IV-VII.

C. rigidum (L.) Hubbard ssp. rigidum (Desmazeria r.) Bregnegræs. 5-30cm. Stråene opstigende. Toppen sammentrængt, ofte m.m. ensidig, til sidst med udstående grene. Småaksene 1-1½mm brede, med noget adskilte inderavner. 0-1500m. III-IX.

Cutandia maritima (L.) Richter Strandstivgræs. 10-35cm. Svingelagtige småaks på mest 12-15x3mm i en stivgrenet, oftest udspærret top. Sandstrand. IV-VI.

Poa. Rapgræs.

1. Enårig ..... 2.
Flerårig 3.
2. Stænglen enlig, med lilla grund. Bladene 0,3-0,6mm br. jubata
Flerstænglet. Bladene 2-3mm brede annua
3. Strået med løgformet grund ..... 4.
" uden " " 6.

4. Inderavnen med uldhåret grund ..... bulbosa
" " glat grund 5.
5. Bladene 0,2-0,5mm brede. Skedehinden mælkehvid timoleontis
" 0,5-2mm brede. Skedehinden farveløs pelasgis
6. Stænglerne sammentrykte ..... compressa
" trinde 7.
7. Øvre blades skedehinde 3½-10mm. Med overj. udløb. trivialis
Skedehinderne indtil 3mm. Ingen overjordiske udløbere 8.
8. Med underjordiske udløbere ..... pratensis
Uden udløbere 9.
9. Stængelgrunden omgivet af gamle bladskeder ..... thessala
" uden gamle bladskeder nemoralis

Poa annua L. Enårigt rapgræs. 0-2400m. I-XII.

P. jubata A.Kerner 12-27cm. Bladene foldede. Toppen åben, med ret få småaks. Inderavnen meget tæt langhåret på kølen og randribberne. Småakset med 4-11 blomster.

P. trivialis L. ssp. silvicola (Guss.) H.Lindb.f. Knuderapgræs. 50-90cm. Nedre topgrene 3-4 sammen. Med korte perlesnorsformede, overjordiske udløbere. 0-2000m. VI-VIII. TA,KY.

P. pratensis L. Engrapgræs. 0-2000m. VI-VIII.

P. thessala Boiss.& Orph. (P. pumila) 5-40cm. Bladene ½-3mm brede, m.m. blågrønne, de nedre ofte ret faste og kødede. Småaksene 4-8mm med 3-6 blomster. Inderavnen m.m. læderagtig. 1000-2500m. VI-VIII. TA,PR,ME,OL,KY,KH,ER.

P. compressa L. Fladstrået rapgræs. 800-2200m. VII-VIII.

P. nemoralis L. Lundrapgræs. 0-2100m. V-X.

P. bulbosa L. Løgrodet rapgræs. 2 underarter:
ssp. bulbosa: Inderavnen glat mellem ribberne. Lavlandsrace.
ssp. pseudoconcinna (Schur) Domin: Inderavnen tiltrykt dunet mellem ribberne. 1100-2200m. V-VII. TA,PR,ER.

P. timoleontis Heldr. Finbladet rapgræs. 10-20cm. Skedehinden 3-6mm. Inderavnerne 2,4-3mm. 0-2200m. III-VII. TA,PR.

P. pelasgis H.Scholz 10-20cm. Stængelbladenes skedehinde 2-3mm, grundbladenes ½-1mm. Inderavnerne 1,8-2,5mm. 100-1360m. III-VI.

Bellardiochloa violacea (Bell.) Chiov. Violet rapgræs. 20-30 (-50)cm. Tættuet med oprette, trådformede blade. Skedehiden 3-7 mm. Toppen 5-12cm, sammenkneben, rugrenet, grønt og lillat broget. Minder om en svingel. 1500-2200m. mVI-mVIII. TA.

Puccinellia distans (L.) Parl. Udspærret annelgræs. Bladene mest flade. Støvknapperne ½-1mm. Yderavnerne m.m. spidse.

P. festucaeformis (Host) Parl. Svingelagtigt annelgræs. 40-60 cm. Bladene sammenfoldede. Støvknapperne 1,2-2,5mm. Yderavnerne butte. Om. VI-VIII.

Sclerochloa dura (L.) Beauv. Stivaks. 2-15cm. Enårig med flade blade, de øvre med lidt oppustet skede og noget omsluttende den meget tætte, noget ensidige dusk. Planten grågrøn. Yderavnerne stærkt kølede; inderavnerne bredt hindekantede. 0-600m. IV-VI.

Dactylis glomerata L. Hundegræs. 0-1900m. III-VIII. 2 underar:
ssp. glomerata: Toppen bred forneden. Skedehinden 2-5mm.
ssp. hispanica (Roth) Nyman: Dusken lige bred foroven og forneden. Skedehinden 4-8mm. Strågrunden ofte fortykket og trævlet.
ssp. hackelii (Asch.& Gr.) Cifferi & Giacomini: Dusken af ensartet bredde. Bladene altid blågrønne. Øvre bladskeder m.m. oppustede. Strået ofte forgenet foroven.

Beckmannia eruciformis (L.) Host Radegræs. 30-150cm. Opret flerårig. Bladene 4-10mm brede, flade og ru. Skedehinden 5-8mm. Aksstanden 18-25cm med 1-3cm lange, siddende aks. Småaksene 2½-3mm, bugede. Inderavnen ofte med en lille krog. 0-300m. V-VI.

Cynosurus cristatus L. Alm. kamgræs. Flerårig. Dusken smal, 3-5 mm bred. 0-2000m. IV-VI.

C. echinatus L. Pindsvinekamgræs. 20-60cm. Enårig med tæt, ægformet top. Bladene 3-9mm brede. Frugtbare blomsters stakke 1-2 x inderavnen. 0-2000m. V-VI.

C. elegans Desf. (C. effusus) Grenet kamgræs. 10-60cm. Enårig. Toppen mere langgrenet og åben. Bladene 1-3mm brede. Frugtbare blomsters stakke 4-5 x inderavnen. 0-1000m. IV-VI.

Lamarckia aurea (L.) Moench Guldgræs. 7-15(-20)cm. Enårig. En løs, ofte ensidig, først bleggrøn, siden gylden top med m.m. hængende grene. Frugtbare småaks med stak, de golde med 6-9 fjærntsiddende, små, butte inderavner. 0-300m. IV-V.

Catabrosa aquatica (L.) Beauv. Tæppegræs. 0-1900m. V-VII.

Apera spica-venti (L.) Beauv. Vindaks. 0-1000m. V-VI.

Psilurus incurvus (Gouan) Sch.& Th. Slangehalegræs. 10-30cm. Stængler, blade og aks trådformede. Akset meget skørt og til sidst m.m. indrullet. Yderavnen reduceret til et skæl på højst ½mm. 1 blomst med stak af inderavnens længde. 0-1000m. IV-V.

Mibora minima (L.) Desv. Dværggræs. 2-15cm. Tueformet med trådfine strå. Bladene indtil 2cm. Akset ½-2cm, ofte lillat. Småaksene 2-3mm, toradede. Yderavnerne hvælvede, længere end de tæt hårede inderavner. 0-900m. III-V.

Briza maxima L. Stort hjærtegræs. 20-50cm. Toppen med 1-12 meget store, sølvhvide/rødbrune småaks på 14-25mm med 5-20 blomster. 0-1700m. IV-VI.

B. minor L. Lidet hjærtegræs. 15-30cm. Mange bleggrønne småaks på 3-5mm med 4-8 blomster. Topgrenene udstående, mest længere end småaksene. Bladene 3-10mm brede. 0-800m. IV-V.

B. humilis Bieb. Lavt hjærtegræs. 8-20(-40)cm. Mange grå småaks på 3-5mm med 4-8 blomster. Topgrenene oprette, mest kortere end småaksene. Bladene højst 1mm brede. 350-1200m. V-VI.

Sesleria. Hovedgræs.

1. Inderavnen glat til svagt dunet mellem ribberne ..... 2.
" håret til lådden mellem ribberne 3.
2. Nedre blade ½-1mm brede ..... taygetea
" " 1½-4mm " vaginalis
3. Øverste blad ½-1½cm x ½-2mm ..... tenerrima
" " 2-3cm x 2-3mm ¼.
4. Bladskederne hårede til lådne ..... coerulans
" glatte bielzii

Sesleria coerulans Friv. 15-30cm. Grundbladene 2-3½mm brede, mest foldede. Dusken 15-18x8-12mm, med mindst 50 småaks. Inderavnens mellemste stak 2½-4mm. 2000-2500m. V-VII. ?

S. bielzii Schur Bladene 1½-2½mm brede, flade eller foldede. Dusken 16(11-30)x7-10mm. Inderavnens mellemste stak 2-3mm. ?

S. tenerrima (Fritsch) Hayek Låddent hovedgræs. 10-30cm. Nedre blade 1-3mm brede, oftest hårede ovenpå. Skederne mest hårede. Dusken 9-15x7-9mm, med indtil 50 småaks. 1700-2900m. KY,KH. VI-VIII.

S. taygetea Hayek Trådhovedaks. 15-25cm. Grundbladene børsteformede. Øverste blad 2-4cm. Skederne glatte. Dusken 15-22x7-9mm med indtil 11x5mm store, iøjenfaldende støtteblade. 500-1300m. sIV-fVI. TA samt S og SØ-Pelop.

S. vaginalis Boiss.& Orph. 20-50cm. Børstehovedgræs. Grundbladene med en bleg, børsteformet spids på indtil 2mm. Øverste blad 2-5 cm. Dusken 15-30x8-9mm. 1100-2500m. V-VII. TA,PR,ME,KY,KH,ER.

Melica. Flitteraks.

1. Inderavnen håret ..... 2.
" glat 3.
2. Bladene indrullede, uden fremtrædende midterribbe ciliata
" mest flade, midterribben fremtrædende transsilvanica
3. Yderavnerne uens, den nedre ½ hindeagtig ..... minuta
" m.m. ens, den nedre ¼ hindeagtig 4.
4. Nedre stilke meget længere end småaksene ..... uniflora
Stilkene ikke længere end småaksene rectiflora

Melica uniflora Retz. Enblomstret flitteraks. 0-800m. V-VI.

M. rectiflora Boiss.& Heldr. Smalt flitteraks. 20-60cm. Bladene 2-3mm brede. Toppen 3-7cm, smal og klaseagtig. Skedehinden modsat bladpladen. 0-2100m. IV-VII. TA (Langada-kløften), SØ-Pelop.

M. minuta L. Klippeflitteraks. 10-60cm. Bladene indrullede. Tueformet. Toppen pyramideformet med udstående grene. Yderavnerne med lilla ryg. 2 frugtbare blomster. 0-600m. IV-V.

M. ciliata L. Skægflitteraks. 20-60(-100)cm. Dusken 6-12x1-1½ cm, ret tæt, men ofte mellembrudt, m.m. ensidig. Yderavnerne m.m. ens. 0-2200m. V-fVIII. TA,PR,ME,KY,KH,ER.

M. transsilvanica Schur Duskflitteraks. 30-120cm. Planten grøn. Duskens akse dækket af de ofte brunligt anløbne småaks. Nedre yderavne 1/3-2/3 x den øvre. 500-1200m. VI-VII.

Echinaria capitata (L.) Desf. Pindsvinegræs. 5-25cm. Enårig. Akset kuglerundt, ca. 1cm. Yderavnerne med 1 og 2 staklignende tænder; inderavnerne med 5(7) staklignende tænder. 0-800m. IV-V.

Glyceria fluitans (L.) R.Br. Mannasødgræs. Toppen ensidig. Inderavnen 5½-7½mm, m.m. spids, stærkt ribbet. Støvknapperne 1,5-2-5mm. 0-1800m. V-VII.

G. spicata (Biv.) Guss. Kortstilket sødgræs. 50-150cm. Toppen ensidig. De korte grenes småaks og de længere grenede sidestillede småaks m.m. siddende. Inderavnen 5-6mm, afrundet til afskåret, svagt ribbet. Støvknapperne 1,1-1,6mm.

G. plicata (Fries) Fries Butblomstret sødgræs. Toppen ikke ensidig. Inderavnen 3½-4½mm, meget but, 7-ribbet. Støvknapperne 0,7-1,3mm. 0-1800m. V-VIII.

Bromus. Hejre.

1. Flerårig ..... 2.
Enårig 5.
2. Toppen åben, med udstående eller nikkende småaks ..... 3.
" ofte smal, småaksene oprette. Trævlet stængelgrund 4.
3. Nederste topgrene 2 sammen, hver med flere småaks ramosus
" " 3-5 sammen, nogle med 1 småaks benekenii
4. Grundbladene over 10cm, 2-3mm brede og flade ..... riparius
" sj. over 10cm, indtil 1½mm brede cappadocicus
5. Yderavnerne med 1 og 3 ribber ..... 6.
" " 3-5 og 7-9 ribber 12.
6. Topgrenene m.m. hængende ..... 7.
" m.m. oprette 8.
7. Topgrenene ru. Stænglen glat foroven ..... sterilis
" dunede. Stænglen dunet foroven tectorum
8. Småaksene med stak 2-5cm, næsten siddende i tæt dusk .... 9.
" " " 3-9cm, i grenet top 10.
9. Topgrenene med 1-2 småaks. Modne stak ofte krum fasciculatus
" " 4-5 " . " " ret rubens
10. Inderavnen 15-17mm med en stak på 20-25mm .... madritensis
" 20-30mm " " " " 25-75mm 11.
11. Nedre topgrene 1-3 sammen, 1-3cm lange ..... rigidus
" " 3-6 " , indtil 8cm lange diandrus

12. Inderavnens rand til sidst indrullet og overlapper derfor næppe den følgende inderavne ..... arvensis
    Inderavnens rand ikke indrullet og overlapper derfor den følgende inderavne i frugttilstanden 13.
13. Toppen tæt, stilkene meget kortere end småaksene ..... 14.
    " åben, nogle stilke lig eller længere end småaksene 17.
14. Småaks 25-50mm (÷ stak). Stakken mest vreden forneden alopecurus
    Småaks 12-25mm (÷ stak). Stakken lidet vreden forneden 15.
15. Småaks 20-25mm. Stakken 8-15mm. Vifteformet top chrysopogon
    " 12-20mm. " 6½-9mm. M.m. ægformet top 16.
16. Inderavnen højst 2mm bred. Toppen med kilef. grund scoparius
    " 3-5mm bred. Toppen m.m. ægformet hordeaceus
17. Toppen nikkende, stilkene mest længere end småaksene ... 18.
    " opret, stilkene mest lig eller kortere end småaks. 19.
18. Toppen mest ensidig, med få, lidt sammentrykte småaks squarrosus
    Toppen alsidig, med mange, trind småaks japonicus
19. Inderavnen 6-9mm. Topgrenene tynde ..... intermedius
    " 12-20mm. Topgrenene mest stive lanceolatus

Bromus diandrus Roth Storakset hejre. 35-90cm. Toppen op til 25 cm, meget åben, nikkende. Grenene meget ru, ofte kun med 1 småaks. Stakken 3½-6½cm. 0-1200m. IV-V.

B. rigidus Roth Stivtoppet hejre. 20-40cm. Toppen 15-20cm, tæt og opret. Småaks med stak 5-8cm, heraf udgør stakken 3-5cm. IV-VI.

B. sterilis L. Gold hejre. 0-1350m. IV-VI.

B. tectorum L. Taghejre. 0-2000m. IV-VI.

B. madritensis L. Spansk hejre. 10-50cm. Stråene oftest glatte. Bladene langt blødhårede. Småaks 3-5cm. Stakken 12-20mm. III-IV.

B. fasciculatus Presl Duskhejre. 5-20cm. Blade og skeder blødhårede. Inderavnen 11-12mm med en stak på 1-1½cm. Småaks 2-3cm (÷ stak). 0-1000m. III-V.

B. ramosus Hudson Sildig skovhejre. 0-1500m. V-VII.

B. benekenii (Lange) Triman Tidlig skovhejre. 0-1500m. V-VII.

B. riparius Rehmann Trævlhejre. 30-90cm. Toppen 10-20x3-7cm. Grenene med 1-2 småaks på 2-3cm, oftest bleggrønne. Inderavnen 11-13mm. Stakken 5-8mm. 1500-2500m. V-VIII. TA,PR,ME.

B. cappadocicus Boiss.& Bal. ssp. lacmonicus (Hausskn.) P.M.Sm. 25-50cm. Toppen 5-10cm, opret og åben. Grenene med 1-2 ofte lillagrønne småaks på 11-15mm. Inderavnen 8-10mm. V-VII. KH,ME(Tzelati)

B. arvensis L. Agerhejre. 80-110cm. Toppen meget åben, småaksene til sidst udstående eller hængende, 10-25mm. Stakken ret. Støvknappen mindst ½ x inderavnen, indtil 5mm. 0-1500m. V-VII.

B. hordeaceus L. ssp. molliformis (Lloyd) Maire Blød hejre. Småaksene 12-17mm, ofte rødlige. Stakken flad ved grunden, udstående som moden, 6-10mm, ofte vreden forneden. 0-1000m. IV-VI.

B. scoparius L. Kosthejre. 10-30cm. Knæene ofte mørke. Toppen ægformet, 3-5cm. Stakken 7-9mm, udstående og knæbøjet. IV-VII.

B. alopecuros Poiret Rævehalehejre. 20-80cm. Inderavnen 10-15mm, stakken 12-15mm. Toppen næsten linjeformet til smalt elliptisk. ssp. alopecurus: Inderavnen med totandet spids. 0-700m. IV-VI. ssp. biaristulatus (Maire) Acedo & Llamas: Inderavnen med 2 brodde på ca. 2mm.

B. lanceolatus Roth Stakhejre. 30-80cm. De nedre topgrene forlængede, 2-4cm, men stive og oprette. Småaksene 2½-4½cm. Stakken knæbøjet, indtil 15mm. 0-1200m. IV-VI.

B. intermedius Guss. Smalbladet hejre. 10-75cm. Topgrenene 1-2

sammen, bugtede, ofte sammenviklede. Småakset 10-15mm. Stakkene udspærrede. 0-1700m. V-VI.

Bromus chrysopogon Viv. 20-25cm. Toppen 4-5x1-2½cm, æg-viftefor-met. Småaksene lancetformede, næsten siddende. Inderavnen 9-11½ x 3-4mm. Stakken 8-15mm, lidt udstående.

B. japonicus Thunb. Stortoppet hejre. 20-80cm. Toppen åben, mest ret bred. Inderavnen 8-9mm, stakken 6-10mm. 0-800m. V-VI.

B. squarrosus L. Udspærret hejre. 20-60cm. Inderavnen 8-11x6-9 mm, med stumpvinklet rand. Stakken ca. 10mm, stærkt udstående. Toppen meget åben. 0-2200m. IV-VII. TA,PR,ME,OL,KY,KH,ER,PN.

B. rubens L. Rød hejre. 10-30cm. Bladene hårede, skederne blødt dunede. Toppen 2-10cm, ofte rødligbrun. Inderavnen 14-15mm, stak-ken 1½-2cm. Småaks (÷ stak) 18-25mm. 0-1000m. IV-V.

Brachypodium. Stilkaks.

1. Enårig. Akset med 2 (1-5) småaks ..... distachyon
   Flerårig. Akset mest med flere småaks 2.
2. Tueformet. Stakken mindst lig inderavnen ..... silvaticum
   Med udløbere. Stakken højst ½ x inderavnen 3.
3. Bladene indrullede, med fremtrædende ribber på overs. ramosum
   " m.m. flade, uden fremtrædende ribber på oversiden 4.
4. Bladene helt flade, grønne ..... pinnatum
   " indrullede mod spidsen, noget blågrønne rupestre

Brachypodium silvaticum (Hudson) Beauv. Skovstilkaks. 2 ssp.:
ssp. silvaticum: 50-100cm. Bladene flade, friskgrønne, med hårede skeder. Akset nikkende. 0-1700m. VI-VIII.
ssp. glaucovirens Murb.: -2m. Bladene ofte indrullede, blågrønne og stive, med glatte skeder. Akset opret. 0-1200m. VI-VII.

B. rupestre (Host) R.& Sch. Seglstilkaks. 40-70cm. Småaksene 30-50mm, oftest noget seglkrummede. Stakken højst 3mm. Inderav-nen glat. 0-1900m. V-VII.

B. pinnatum (L.) Beauv. Bakkestilkaks. 40-70cm. Småaksene 18-40 mm, oftest rette. Inderavnen ofte noget korthåret. Stakken 1-6mm.

B. ramosum (L.) R.& Sch. (B. retusum) Toradet stilkaks. 20-40cm. Bladene tydeligt toradet stillede, især på de golde skud. Småak-sene 2-3cm, 1-5 stykker. Stakken 2-4mm. 0-600m. IV-VI.

B. distachyon (L.) Beauv. (Trachynia d.) Enårigt stilkaks. 2-15 (-45)cm. Bladene glatte eller svagt hårede. Oftest 2 småaks på 2-3cm. Stakken 7-15mm. 0-1900m. IV-VI.

Elymus. Kvik.

1. Tueformet; kan have korte udløbere ..... 2.
   Med udløbere; ikke tuedannende 5.
2. Aksets akse skør, med glatte kanter ..... rechingeri
   " " fast, oftest med randhårede kanter 3.
3. Yderavnernes ribber m.m. ru ..... panormitanus
   " " glatte 4.
4. Nedre blade flade, 1-2mm brede ..... flaccidifolius
   Bladene 2½-5mm brede som flade elongatus
5. Nedre småaks kortere end aksleddene ..... farctus
   Småaksene længere end aksleddene 6.
6. Bladene stikkende ..... pycnanthus
   " ikke stikkende 7.
7. Yderavnen but eller afskåret. Planten grågrøn .... hispidus
   " spids repens

Elymus panormitanus Parl. Storakset kvik. 40-90cm. Akset 10-20 cm, kraftigt og stift. Småaksene 15-20mm, stakkene 2-3cm. 700-1400m. V-VI.

E. flaccidifolius (Boiss.& Heldr.) Melderis Slapbladet kvik. 35-65cm. Nedre blade bløde. Yderavnerne mest 4-6mm, læderagtige.

Aksets akse næsten flad ud for småaksene. Om. VI-VII.

Elymus elongatus (Host) Runemark Langakset kvik. 50-80cm. Bladene læderagtige, flade eller indrullede. Yderavnerne 7-11mm, læderagtige. Aksets akse næsten flad ud for småaksene. Om. V-VII.

E. pycnanthus (Godron) Meld. Stiv kvik. 70-110cm. Bladene blågrønne. Aksene tætte, 6-12cm. Småaksene ofte 3-4 x aksleddene. Mest uden stak. 0-600m. V-VI.

E. repens (L.) Gould Alm. kvik. 0-1400m. V-VII.

E. hispidus (Opiz) Meld. ssp. hispidus Grågrøn kvik. 0-2000m.

E. farctus (Viv.) Runem. Strandkvik. Om. IV-VI.

E. rechingeri (Runem.) Runem. 15-45cm. Stængelgrunden ofte fortykket. Bladene 1-1½mm brede, indrullede. Akset 2-10cm. Yderavnen 5-12mm, med 4-5 ribber. Kystklipper. IV-VI.

Aegilops. Bukkekorn.

1. Akset (÷ stakkene) over 10 x så langt som bredt ..... 2.
" " højst 9 x " " " " 3.
2. Stakkene længere end akset ..... caudata
" kortere " " cylindrica
3. Sidesmåaksenes yderavner kortstakkede eller tandede comosa
" " langstakkede 4.
4. Sidesmåaksenes yderavner med 1 stak og 1 tand uniaristata
" " " 2-5 stakke 5.
5. Sidesmåaksenes yderavner med (3)4-5 stakke ..... geniculata
" " " 2-3 stakke 6.
6. Akset (÷ stakkene) 5-9 x så langt som bredt ..... 7.
" " ca. 5 x så langt som bredt 8.
7. Nedre småakses inderavner med ens tætte, uens tykke ribber triuncialis
Nedre småakses inderavner med uens tætte, ens tykke ribber peregrina
8. Alle småaks frugtbare ..... biuncialis
Øvre 1-3 småaks golde neglecta

Aegilops caudata L. (A. dichasians) Langhalet bukkekorn. 25-50 cm. 4-7 frugtbare + 2 golde, grundstillede småaks. Bladene hårede. 0-1500m. V-VI.

A. cylindrica Host Smalakset bukkekorn. 20-40cm. 4-6 frugtbare + 1-2 golde, grundstillede småaks. Bladene glatte eller svagt hårede. 0-600m. V-VI.

A. comosa Sm. Toppet bukkekorn. 15-40cm. Akset 2-7cm x 2-4mm, med 1-2 golde småaks forneden. V-VI. 2 underarter:
ssp. comosa: Yderavnerne ikke bugede.
ssp. heldreichii (Boiss.) Eig.: Yderavnerne tydeligt bugede.

A. uniaristata Vis. Kort bukkekorn. 20-40cm. De 2(3) sidestillede småakses yderavner tydeligt bugede. Mest 3 golde, grundstillede småaks. Endesmåaksets stak 3-4cm. 0-300m. V-VI.

A. geniculata Roth Alm. bukkekorn. 10-30cm. Nedre 2(3) frugtbare småaks med ægformede, 6-10mm lange yderavner med 3-4(5) stakke på 15-25mm. 0-900m. IV-VI.

A. triuncialis L. Trestakket bukkekorn. 20-25cm. Nedre småakses yderavner 1½-2 x så lange som brede, med (2)3 stakke, der er smallere ved grunden. 0-600m. V-VI.

A. peregrina (Hackel) Maire & Weiller 15-40cm. Nedre småakses yderavner 6-8x4-6mm, med 2-3 stakke, der er ½-2mm brede forneden. Sandkyster. IV-V.

A. biuncialis Vis. (A. lorentii) Langstakket bukkekorn. 15-30cm. 2-3(4) småaks, der mest alle er frugtbare. Bladene randhårede. 0-1500m. V-VI.

Aegilops neglecta Req. Goldt bukkekorn. 25-35cm. 2(3) nedre småaks frugtbare. Bladene hårede. 0-500m. V-VI.

Dasypyrum villosum (L.) Cand. Børsterug. 20-60cm. Enårig. Akset 6-10cm. Yderavnen med en stak på 25-32mm og to fremtrædende køle med bundter af korte børster. Inderavnen med en stak på 35-41mm og noget randhåret. 0-1600m. IV-VI.

D. hordeaceum (Cosson & Durieu) Cand. Kortstakket børsterug. 50-60cm. Flerårig med kort, krybende jordstængel. Akset 2-5cm. Stakkene højst 15mm. 1500-2000m. sVI-VIII. TA,ER.

Secale montanum Guss. Bjærgrug. 30-80(-120)cm. Grågrøn, tueformet flerårig. Akset 4-8(-11)cm, med skør akse med randhårede kanter. Yderavnerne 8-10mm, rukølede. Inderavnen 8-13mm, med en stak på indetil 2½cm. 1050-2000m. VI-VII. KH.

Hordeum. Byg.

1. Flerårig. Strået med løgformet grund ..... bulbosum
   Enårig. Strået ikke med løgformet grund 2.
2. Mellemste småaksinderavners stakke 4-14cm, kraftige vulgare
   " " " indtil 3cm, tynde 3.
3. Yderavnen randhåret på midtersmåakset ..... murinum
   " uden randhår på midtersmåakset 4.
4. Sidesmåaksenes yderavner uens, en bred og en smal .. marinum
   " " ens hystrix

Hordeum bulbosum L. Løgrodet byg. 60-150cm. Grøn og tættuet. Nedre blade lådne. Akset 6-13cm uden stakke. 0-1450m. IV-VI.

H. vulgare L. Seksradet byg. Dyrket. III-V.

H. murinum L. Gold byg. 0-1600m. IV-VI. 3 underarter:
ssp. leporinum (Link) Arc.: Sidesmåaksene længere end midtersmåakset. Bladene grønne.
ssp. murinum: Sidesmåaksene ikke længere end midtersmåakset. Bladene grønne. Støvknapperne 0,7-1,1mm.
ssp. glaucum (Steudel) Tzvelev: Sidesmåaksene ikke længere end midtersmåakset. Bladene blågrønne. Støvknapperne 0,2-0,5mm.

H. marinum Hudson Strandbyg. 10-30cm. Nedre bladskeder glatte eller med indtil ¼mm lange hår. Akset aflangt og opad tilsmalnet. 0(-600)m. III-V.

H. hystrix Roth (H. geniculatum) Vejbyg. 10-30cm. Nedre bladskeder med ½-1mm lange hår. 0-1100m. IV-V.

Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski Medusahovedbyg. 5-55 cm. Bladene smalle, 1-2½mm brede. Akset ca. 4cm. Yderavnerne sylformede, sammenvoksede ved grunden. 0-1300m. IV-VI. 2 ssp.:
ssp. asper (Simonkai) Meld.: Modne yderavner m.m. udspærrede. Inderavnen 6-8mm. Stakken 4-7cm, 0,3-0,5mm bred nederst.
ssp. crinitum (Schreber) Meld.: Modne yderavner m.m. oprette. Inderavnen 8½-12mm. Stakken 7-11cm, 0,6-1,2mm bred nederst.

Avena. Havre.

1. Inderavnerne ender i 2 stakke på 3-12mm ..... barbata
   " med højst 1½mm lange tænder 2.
2. Småakset med 0-1 stakke ..... 3.
   " " 2-3 " 4.
3. Inderavnen m.m. glat; udrandet eller meget korttandet sativa
   " stivhåret; med tænder på 1-1½mm sterilis
4. Småakset 18-25mm. Toppen alsidig ..... fatua
   " 25-45mm. " ensidig sterilis

Avena barbata Link ssp. barbata Skæghavre. 30-100cm. Inderavnen oftest hvidgult lådden. Småakset 18-30mm. Inderavnen 9-ribbet. 0-1150m. III-VI.

A. sativa L. Almindelig havre. V-VI. Dyrket.

Avena fatua L. Flyvehavre. 0-1800m. IV-VI.

A. sterilis L. Gold havre. 50-120cm. Inderavnen rusthåret i nedre halvdel. Modne småaksakse skør. V-VII. 2 underarter:
ssp. sterilis: Småaks 35-45mm, med 3-5 blomster. Stakkene 6-9cm, kraftige. 0-500m.
ssp. ludoviciana (Durieu) Nyman: Småaks 25-30mm, med 2-3 blomster. Stakkene 3-6cm. 0-1400m.

Helictotrichon convolutum (C.Presl) Henrard Trindbladet havre. Tæt tueformet. Bladene ¾-1½mm brede. Skedehinderne 0,3-1mm, afskårne. Toppen med 15-50 småaks med 2-4 frugtbare blomster.V-VI.
ssp. convolutum: Strået 50-80cm. Småakset 10-12mm. Yderavnerne 9-10 og 10-11mm. Bladene indrullede, 0,7-1,2mm tykke.
ssp. heldreichii (Parl.) Gervais: Strået 80-100cm. Småakset 12-17 mm. Yderavnerne 10-12 og 12-14mm. Bladene ofte m.m. flade.

H. aetolicum (Rech.f.) Holub (Avenula a.) 30-70cm. Løsttuet. Øvre skedehinder spidse, over 3mm. Småaksene 13-22mm, med 4-6 blomster. Toppen 6-10cm med 4-7 småaks. Inderavnen glat. Småaksaksen med 2-2½mm lange hår. 1500-2400m. fVI-sVIII. KH.

H. agropyroides (Boiss.) Henrard (Avenula peloponnesiaca) Løsttuet. Øvre skedehinder spids, over 3mm. Småaksene 20-30mm, med 6-9 blomster. Toppen 10-22cm, med 5-15 småaks. Inderavnen ofte silkehåret i nedre ½. Småaksaksen glat eller højst med 1-1½mm lange hår. -1650m.

Arrhenatherum elatius (L.) Presl Draphavre. Småaksene 7-10mm. Indtil 0,6mm akse mellem de 2 blomster. Stakken 10-20mm, udgår fra inderavnens nedre 1/3. 0-1800m. V-VII. TA,ME,KH.

A. palaestinum Boiss. Sydlig draphavre. 50-100cm. Småaksene 11-13mm. 1-1½mm akse mellem de 2 blomster. Stakken 20-27mm, udgår nær inderavnens grund, 300-1400m. VI-VII.

Danthoniastrum compactum (Boiss.& Heldr.) Holub Børstehavre. 15-45cm. Meget tættuet. Nedre blade stive og børsteformede. Toppen klaseagtig med 3-6 gulgrønne småaks på 14-20mm med 4-7 blomster. Yderavnerne bredt hindekantede. 1700-2400m. TA,ME,KH.

Gaudinia fragilis (L.) Beauv. Akshavre. 30-60cm. Enårig med m.m. lådne blade. Akset ganske langt, op til 35cm. Småaksene 10-12mm, med 3-4 blomster og stakke på 5-8mm. 0-1200m. IV-VI.

Ventenata macra (Bieb.) Boiss. (Gaudiniopsis m.) Smal bunkehavre. 10-50cm. Bladene indrullede eller sammenfoldede. Skedehinden laset. Klasen aksagtig, 4-10cm med oprette grene. Småaksene ca. 10mm med oftest 4-7 blomster. Stakkene 7-15mm. IV-VI.

Koeleria lobata (Bieb.) R.& Sch. Løgrodet kambunke. 15-45cm. Tættuet og grågrøn med løgformet stængelgrund. Dusken tæt, cylindrisk, ofte lillaanløben. 1400-2100m. VI-VIII. TA,ME,OL,KH,ER.

K. macrantha (Ledeb.) Schultes (K. cristata) Spinkel kambunke. 40-70cm. Løsttuet, stængelgrunden ikke løgformet. Dusken lancetformet, m.m. lappet forneden, mest gulliggrøn. 600-1800m.VI-VII.

Lophochloa cristata (L.) Hyl. (Rostraria c.) Enårig kambunke. 5-20cm. Blade og skeder lådne til dunede. Strået glat. Dusken 1-12x½-1cm. Småaksene 3-7½mm. Inderavnens stak 1-3mm. IV-VII.

Trisetum. Guldhavre.

1. Enårig ..... aureum
   Flerårig 2.
2. Med udløbere. Bladene filtede ..... laconicum
   Løsttuet. Bladene glatte til spredt hårede 3.
3. Toppen åbenog gylden. Bladene flade, 2-4mm brede flavescens
   " smal og brunlilla. Bladene indrullede tenuiforme

Trisetum laconicum Boiss.& Orph. 50-60cm. Bladene oprette, indtil 4mm brede. Nedre skeder filtede. Toppen 6-15x2-3cm, valsefor-

met. Øvre yderavne klar og skinnende. Stakken 5-10mm. PR.

Trisetum flavescens (L.) Beauv. ssp. splendens (Presl) Arc. Guldhavre. 35-55cm. Toppen med over 50 småaks. Nedre skeder med lange, nedadrettede hår. 1100-2000m. VI-VIII.

T. tenuiforme Jonsell (T. flavescens ssp. tenue) Smalbladet guldhavre. 20-40cm. Bladene indtil 2mm brede i flad tilstand. Toppen med under 50 småaks. 1400-2400m. VII-VIII. TA.

T. aureum Ten. Sandguldhavre. 5-25cm. Bladskederne lidt oppustede. Toppen 1-5x½-3cm, gulligt til brunligt skinnende. Småaksene 2½-3mm. Stakken 2-3½mm, vreden og brunlig. 0-600m. V-VI.

Lagurus ovatus L. Harehale. 8-50cm. Enårig. Bladene blødhårede. Dusken ægformet med 1-blomstrede småaks med lådne yderavner, der får toppen til at virke meget blødhåret. Inderavnen med 2 endestillede børster på 2-6mm og en stak på 8-20mm. 0-1000m. III-V.

Aira elegantissima Schur Hårdværgbunke. 10-30cm. Toppen meget åben. Stilkene mest 2-5 x småaksene, disse 1½-2½mm, skinnende. 0-900m. V-VI. 2 underarter:
ssp. elegantissima: Nedre blomsts inderavne spids, uden stak.
ssp. ambigua (Arc.) M.Dogan: Begge blomsters inderavner kløvede og med stak.

Molinierella minuta (L.) Rouy Violet dværgbunke. 5-20cm. Som Aira, men yderavnerne kortere end småakset. Toppen meget åben, ofte lillaanløben. Småaksene 1-1½mm. Inderavnen stakløs. III-IV.

Airopsis tenella (Cav.) Asch.& Gr. Skivebunke. 5-20cm. Bladene indrullede, 1½mm brede. Toppen tæt, op til 5x1cm, med hårfine grene og 2-blomstrede småaks på 1,2-1,5mm med næsten halvskiveformede yderavner. 0-600m. IV-V.

Anthoxanthum. Gulaks.

1. Flerårig ..... odoratum
   Enårig 2.
2. Småaksene 10-12mm ..... gracile
   " (4-)6-8mm 3.
3. Dusken ægformet og tæt ..... ovatum
   " forlænget og løs aristatum

Anthoxanthum odoratum L. Alm. gulaks. 0-2700m. IV-VIII. TA,KH.

A. ovatum Lag. Æggegulaks. 10-40cm. Bladene ca. 5mm brede, m.m. hårede. Øvre golde blomsts stak rager ikke ud. 0-1000m. V-VI.

A. aristatum Boiss. Enårigt gulaks. 10-40cm. Bladene ca. 3mm brede. Øvre golde blomsts stak rager oftest ud. 0-1000m. V-VI.

A. gracile Biv. Stakgulaks. 10-30cm. Dusken åben og fåblomstret. De 2 golde blomster med stakke på 1 og 2 cm. 0-1000m. IV-V.

Holcus lanatus L. Fløjlsgræs. 0-1500m. V-VII.

H. setiglumis Boiss.& Reuter (H. annuus) Enårigt fløjlsgræs. 25-35cm. Som den foregående, men enårig. Bladene 1-4mm brede. Begge yderavner med stak, den øvre 1½-3mm. 0-300m. V-VI.

Corynephorus divaricatus (Pourret) Breistr. Enårigt sandskæg. 20-60cm. Glat, ikke blågrøn enårig. Bladene ru og indrullede. Skederne ofte lilla. Knæene sorte. Skedehinden indtil 8mm. IV-VI.

Avellinia michelii (Savi) Parl. Svingelbunke. 10-25cm. Enårig. Toppen 2-7cm, tæt og hvidliggrøn. Småaksene 3-5mm. Nedre yderavne ¼ x den øvre og sylformet. Inderavnerne med en kort stak fra spidsen. 0-300m. IV-VI.

Triplachne nitens (Guss.) Link Glansaks. 10-40cm. Enårig. Bladene ru. Skederne opblæste. Knæene sortagtige. Dusken 1-5cm, bleggrøn og skinnende. Småaksene 3½-4mm med spidse, lancetformede yderavner. Stakken m.m. indesluttet. 0-300m. III-V.

Agrostis. Hvene.

1. Toppen åben hele tiden. ..... gigantea
" sammenkneben hele tiden eller efter blomstringen 2.
2. Toppen meget tæt, ligner en lappet dusk .. Polypogon viridis
" sammenkneben efter blomstringen, åben under 3.
3. De fleste topgrene 2-3 x delte, uden småaks i nedre ½ castellana
De fleste topgrene 1-2 x delte, med småaks i nedre ½ stolonifera

Agrostis gigantea Roth Stortoppet hvene. 0-2000m. VI-VIII.

A. stolonifera L. Krybhvene. 0-2400m. V-VIII. KY.

A. castellana Boiss.& Reuter Hornhvene. 20-80cm. Nogle gange med forlængede jordstængler og udløbere. Bladene 1-2mm brede, flade eller ofte indrullede. Småaksstilkenes kølleformede spids helt jævn. 0-2000m. V-VII.

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. Skægaks. 10-40cm. Enårig. Dusken halvt cylindrisk til svagt lappet, silkeagtigt gulgrøn. Småaksene 2mm. Yderavnerne udrandede, med stak på 5-7mm. Inderavnen også med stak på 1-1½mm. 0-600m. III-V.

P. maritimus Willd. ssp. maritimus Purpurskægaks. 10-30cm. Enårig. Dusken m.m. cylindrisk, tæt, ofte lillaanløben. Yderavnerne kløvede, med stak. Inderavnen uden stak. 0m. III-V.

P. viridis (Gouan) Breistr. Duskhvene. 20-80cm. Flerårig. Stænglerne liggende og rodslående forneden. Minder om en Krybhvene, men toppen ganske tæt, næsten som en lappet dusk. Ingen stak. 0-1000m. III-V.

Gastridium ventricosum (Gouan) Sch.& Th. Gniddergræs. 10-40cm. Enårig med tæt og lappet dusk, let kendelig ved yderavnernes hvidlige knude forneden. Småaksene enblomstrede, 3-4mm. Yderavnerne glatte med ru køl, brodspidsede, 1/3 forskellige i længde. Stakken indtil 6mm. 0-1000m. V-VII.

G. scabrum Presl Som den foregående, men dusken tættere, ikke lappet. Yderavnerne ru, ikke brodspidsede, 1/5 forskellige i længde. 0-600m. III-V.

G. phleoides (Nees & Meyen) Hubbard 10-40cm. Dusken ikke lappet. Småaksene 6-8mm med en stak på 6-8mm. Yderavnerne med ru køl.

Ammophila arenaria (L.) Link ssp. arundinacea H.Lindb.f. Hjælme.

Phleum. Rottehale.

1. Flerårig ..... 2.
Enårig 4.
2. Yderavnerne jævnt tilspidsede ..... montanum
" brat eller skævt afskårne fortil 3.
3. Dusken bredt cylindrisk til ægformet. Stakken 1½-4mm alpinum
" cylindrisk. Stakken 0,2-2mm bertolonii
4. Yderavnerne med afskåret spids ..... echinatum
" jævnt tilsmalnede 5.
5. Yderavnen aflangt-ægformet. Kølen mest glat ..... subulatum
" aflangt-lancetformet. Kølen tæt randhåret 6.
6. Duskens grund afrundet. Yderavnens spids udbøjet ... graecum
" " kileformet. Yderavnens spids opret arenarium

P. bertolonii DC. Knoldrottehale. 0-1700m. IV-X.

P. alpinum L. Fjældrottehale. 15-40cm. Dusken 12-30x6-9mm, tæt, ofte grålilla. Yderavnerne med langt randhåret, grøn køl og bred hindekant. 1700-2600m. VI-VIII. TA,ME,KY,KH,ER,PN.

P. montanum C.Koch Bjærgrottehale. 15-50cm. Stængelgrunden omgiven af blivende bladskeder. Bladene hvidt rukantede. Dusken 3-8cm x 4-7mm, lappet ved ombøjning. -2100m. V-mVIII.

Phleum arenarium L. Sandrottehale. 8-25cm. Skederne opblæste foroven. Dusken 2-2½cm x 7mm, bleg- til hvidliggrøn. Yderavnens brod 0,3-1mm. Om. IV-VI.

P. graecum Boiss.& Heldr. (P. exaratum) Køllerottehale. 10-20cm. Dusken 4-10cm. 0-500m. V-VII. 2 underarter:
ssp. graecum: Småaksene 2½-3½mm. Yderavnen tæt randhåret, hårene ca. af yderavnens bredde.
ssp. aegaeum (Vierh.) Greuter: Småaksene 2-2½mm. Yderavnen svagt randhåret, hårene under ½ x yderavnens bredde. Kythæra, Antikyth.

P. echinatum Host Pindsvinerottehale. 10-30cm. Dusken 2½-3cm x 12mm, bleg- eller hvidliggrøn, kort cylindrisk eller ægformet. Yderavnerne med randhåret køl. 0-800m. III-V.

P. subulatum (Savi) Aasch.& Gr. ssp. subulatum Tynd rottehale. 10-40cm. Dusken bleggrøn, 3-6cm x 4-6mm. Yderavnerne bådformede. 0-600m. V-VI.

Alopecurus. Rævehale.

1. Yderavnerne m.m. glatte, med vinget køl ..... 2.
" tydeligt hårede; kølen uvinget 3.
2. Yderavnerne 1/3-1/2 sammenvoksede ..... myosuroides
" 1/2-2/3 " creticus
3. Stakken udragende, af yderavnens længde ..... rendlei
" indesluttet gerardii

Alopecurus myosuroides Hudson Agerrævehale. Enårig. Dusken valseformet, tilspidset i begge ender, 7-12cm x 4-6mm. IV-VI.

A. creticus Trin. 10-40cm. Dusken 2-3½cm. Småaksene 3-4mm (4-6 mm hos myos.). Yderavnerne med divergerende spidser. Inderavnens stak 3-6mm. Støvknappen 1,2-2,5mm. V-VI.

A. rendlei Eig (A. utriculatus (L.) Pers.) Kølrævehale. 10-40 cm. Yderavnerne 1/4-1/3 sammenvoksede, brat indsnørede ovre midten, stivhårede i nedre ½. Enårig. 0-1000m. IV-VI.

A. gerardii Vill. Hvid rævehale. 15-30cm. Flerårig. Dusken 7-20 x 5-10mm. Småaksene 4-6mm. Yderavnerne med en lang brod på 1½-3½ mm, hvidlådne især på kølen. 1700-2870m. sVI-IX. TA,KY,KH.

Parapholis. Spidshale.

1. Yderavnens køl uvinget ..... incurva
" " tydeligt vinget 2.
2. Støvknappen 0,5-0,9mm. Aksene mest i grupper ..... marginata
" 2½-3½mm. Aksene mest enlige filiformis

Parapholis incurva (L.) Hubb. Krum spidshale. 2-25cm. Øverste bladskede opblæst. Akset ofte stærkt krummet, med 10-20 småaks, enligt. Støvknappen 0,5-0,9mm. IV-VII.

P. filiformis (Roth) Hubb. Kølet spidshale. -25cm. Øverste bladskede næppe opblæst. Akset med 10-20 småaks, m.m. ret. V-VI.

P. strigosa (Dum.) Hubb. Alm. spidshale. Som den foregående.

Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter Lang spidshale. 5-30cm. Opret til opstigende enårig med et 5-15cm langt, stift, cylindrisk aks med indsænkede småaks. 0-300m. V-VI.

Phalaris. Glansfrø.

1. Flerårig ..... 2.
Enårig 3.
2. Yderavnens køl tandet foroven ..... coerulescens
" " helrandet aquatica
3. Yderavnen med stak og en tand nær spidsen ..... paradoxa
" uden stak minor

Phalaris coerulescens Desf. Violet glansfrø. 40-100cm. Stråret løgformet forneden. Dusken ofte lillaanløben. Småaksene i grupper på 5-7 med 1 frugtbart og resten golde. 0-1000m. IV-V.

Phalaris aquatica L. Knoldglansfrø. 50-150cm. Strået ofte med løgformet grund. Dusken forlænget. Yderavnens køl jævnt tilsmalnende i begge ender. 0-700m. IV-VI.

P. paradoxa L. Stakglansfrø. 25-65cm. Dusken ofte dækket forneden af den øverste bladskede og ofte lillabroget. Småaksene i grupper på 5-7 med 1 frugtbart og resten golde. 0-800m. IV-V.

P. minor Retz Lidet glansfrø. 10-60cm. Dusken nærmest cylindrisk, 4-5x1-1½cm. Yderavnens køl tandet. 0-800m. IV-V.

Milium vernale Bieb. Vårmiliegræs. 10-50cm. Opret enårig. Bladene ru og glatte. Skederne ru, ofte lilla og bredt hindekantede. Toppen 1½-8cm med opret-udstående grene. 0-1500m. IV-VI.

Oryzopsis miliacea (L.) Bentham & Hooker (Piptatherum m.) Alm. rishirse. 50-120cm. Flerårig. Toppen stor, åben og mangeblomstret, op til 30cm. Yderavnerne 3-3½mm, hindeagtige. Inderavnen med en 3-5mm lang stak. 4-8(-20) topgrene sammen. 0-900m. IV-IX.

O. coerulescens (Desf.) Richter (Piptatherum c.) Blå rishirse. 30-70cm. Bladene højst 2½mm brede, ofte indrullede. Toppen stor- og fåblomstret med ofte bølgede brene. Yderavnerne 6-8mm, grønt og blåligt brogede. Stakken indesluttet, 3mm lang. 0-600m. IV-V.

O. holciformis (Bieb.) R.& Sch. (Piptatherum h.) Storakset rishirse. -100cm. Bladene 5-9mm brede. Skedehinden 6-10mm. Småaksene 8-9mm. Stakken ca. 10mm, langt udragende. V-VI.

Stipa. Stakgræs.

1. Stakken med hår på 3-5mm ..... 2.
   " glat eller med hår på højst 1mm 3.
2. Inderavnen 18-21½mm, med (5-)7 hårstriber ..... endotricha
   " 11-13mm, jævnt håret cyllenea
3. Stakken ret, 11-16mm ..... bromoides
   " knæbøjet, 5-20cm 4.
4. Stakken glat for det blotte øje ..... capillata
   " korthåret 5.
5. Yderavnerne uens, 12-15mm og 7-10mm ..... parviflora
   " m.m. ens 6.
6. Enårig. Stakken 7-10cm ..... capensis
   Flerårig. Stakken 15-19(12-20)cm fontanesii

Stipa endotricha Martinovsky 40-80cm. Strået korthåret under knæene og på de øverste led. Bladene ½-1mm tykke, mest indrullede. Stakken 28-31cm. 1300-2200m. V-VII. TA,PR,ME,KY,KH,ER.

S. cyllenea Strid (S. lessingiana ssp. c.) 55-80cm. Grundbladenes skedehinder 0,2-0,5mm, bladene 0,5-0,8mm tykke. Yderavnerne m.m. ens, 26-33mm. Stakken 14-22cm. 1450-1800m. VI-fVII. KY.

S. capensis Thunb. Snoet stakgræs. 10-30(-80)cm. Toppen tæt, 3-10 cm. Yderavnerne 12-16mm. Stakken stærkt snoet i sin nederste del. Inderavnen 6-7mm. 0-1000m. IV-V.

S. capillata L. Hårstakgræs. 40-100cm. Tættuet flerårig. Øvre blades skedehinde 15-20mm. Toppen ret åben. Yderavnerne 25-35mm, inderavnen 10-12mm. Stakken 12-18mm. 0-1200m. VI-VIII.

S. fontanesii Parl. (S. holosericea) Sylstakgræs. 40-80cm. Toppen ca. 25cm med få småaks. Yderavnerne ca. 30mm, inderavnen 13-14 mm, med en hårring ved spidsen. 0-600m. IV-V.

S. parviflora Desf. Småblomstret stakgræs. 30-70cm. Bladskederne randhårede, langhårede øverst. Toppen åben, indtil 30cm, mangeblomstret. Inderavnen 4-7mm. Stakken 5-10cm. III-VI.

S. bromoides (L.) Dörfl Ret stakgræs. 60-100cm. Flerårig. Bladene indrullede, under 1mm brede. Toppen linjeformet, 15-30cm. Yderavnerne 8-9mm. Inderavnen 6-7mm, lådden forneden. 0-1000m. V-VI.

Arundo donax L. Kæmperør. 2-5m. Strået 1-2cm tykt og bambusagtigt. Bladene 1-8cm brede. Toppen 30-60cm. Småakset mindst 12mm,

oftest med 3 blomster. Inderavnen med kløven spids. 0-900m. VIII-XI.

Arundo plinii Turra (A. pliniana) Strandrør. 1-2m. Strået 3-7mm tykt. Bladene 1(2)cm brede. Småaksene ikke over 10mm, med 1-2 blomster. Inderavnen ikke kløven. 0-600m. VII-X.

Phragmites australis (Cav.) Trin. Tagrør. 0-1200m. VI-X.

Cortaderia selloana (Sch.& Sch.f.) Asch.& Gr. Pampasgræs. -3m. Bladene 1-3m, blågrønne, hårde, med skærende kant. Toppen 50-100 cm, hvidlådden. Småaksene ca. 15mm, sølvhvide. 0-600m. VI-VII.

Schismus arabicus Nees Stor kløftavne. 10-24cm. Bladene indrullede, ofte langt hvidhårede ved oversidens grund. Enårig. Småaksene 5-7mm. Yderavnerne bredt hindekantede. Nedre inderavne 1/3-1/4 kløvet, ofte med kort stak i spidsen. III-V.

Molinia caerulea (L.) Moench Blåtop. 0-2000m. VII-IX.

Nardus stricta L. Katteskæg. 1700-2600m. VI-VII. TA,KY,KH.

Lygeum spartum L. Espartogræs. 20-30cm. Jordstænglen og strågrunden med læderagtige skæl. Bladene 1½mm tykke, indrullede og stive. Blomstersvøbet 3-4cm, æg-lancetformet og spidst. Småakset med 2 blomster med langhåret grund. 0-300m. III-V. Lerskrænter.

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. Kattefodsgræs. 10-25cm. Lange, nedliggende stængler med stive, udstående, ret korte blade. Dusken en tosidet klase af m.m. siddende aks med toradet stillede småaks, 2½-5cm lang, smalt ægformet og lappet. VI-VIII. Om.

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees Tueformet og tæppedannende. Bladene indtil 1m, buehængende. Strået 50-120cm. Toppen 15-30cm og grågrøn. Småaksene 5-12mm, med 7-12 blomster. VI-VIII. Forv.

Sporobolus pungens (Schreber) Kunth Stikkende ribbensgræs. 20-50 cm. Jordstænglen langt krybende i sandet. Golde skud med faste, indrullede, toradede blade. Toppen grålilla, stærktgrenet, tæt og sammentrængt. Klitter. VII-VIII.

Crypsis aculeata (L.) Aiton Hovedsumpaks. 3-15cm. Enårig med m.m. oppustede skeder og blågrønne blade. Dusken pudeformet, bredere end lang, 1½cm bred, med et svøb af 2(4) udstående, stive blade med en noget tornagtig spids. Klitlavninger. VII-IX.

C. schoenoides (L.) Lam. Ægformet sumpaks. 5-25cm. Som foregående, men dusken 2-4 x så lang som bred, ægformet og meget tæt. Fugtige steder, især nær kysten. 0-300m. VII-X.

Eleusine indica (L.) Gaertner Enårig fingerrap. 15-85cm. Enårig med ofte hårede blade med bred bruskrand. 2-5 linjeformede aks. Småaksene rapgræsagtige, toradede, med 3-6 stakløse blomster. 0-500m. VII-XI. Indslæbt.

Cynodon dactylon (L.) Pers. Hundetandsgræs. 10-40cm. Ligner Digitaria, Fingeraks, men let kendelig ved sine blågrønne, toradede blade. Småaksene 1-blomstrede, med lancetformede yder- og bådformede inderavner. 0-800m. VI-IX.

Panicum repens L. Krybehirse. 15-60cm. Flerårig med lange, ofte overjordiske udløbere. Bladene næsten regelmæssigt toradede. Toppen tæt med m.m. oprette grene. Glatte yderavner. 0-100m.VI-X.

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Hanespore. 25-100cm. VI-X.

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Blodhirse. 20-50cm. Øvre yderavne 1/3-1/2 x småakset. Bladene mest tvesidet hårede. VI-XI.

D. ciliaris (Retz.) Koeler Randhåret fingeraks. 20-50cm. Øvre yderavne 2/3-3/4 x småakset. Den golde nedre inderavne med jævne ribber (ru hos sang.). Bladene mest fåhårede inderst. VIII-X.

Paspalum dilatatum Poiret Savaks. 30-80(-150)cm. Tættuet flerå-

Siden indeholder rettelser (november 2016)

rig. Bladene næsten glatte, 3-10mm brede. 3-6 spredtstillede aks på 4-11cm. Småaksene 3-3½mm, gulgrønne, 2-blomstrede, uden stak. 0-600m. VII-IX. Indslæbt.

Paspalum paspalodes (Michx) Scribner Tvillingaks. 10-50cm. Flerårig med udløbere. Blade og skeder ofte randhårede. 2 ret oprette aks sammen på 2-7cm med en smal, affladet akse. 0-600m. VII-IX.

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze Kvellergræs. 5-30cm. Med lange, rodslående udløbere. Stråene liggende til opstigende. Bladene 5-9mm brede. Spredte eller delvist knippestillede, leddelte, bleggrønne aks. Om. VII-IX. Forvildet.

Setaria. Skærmaks.

1. Børsterne med nedadrettede modhager, så de hænger i ..... 2.
   " " opadrettede " , hænger ikke i 3.
2. Bladskeden foroven ca. 1mm langt randhåret .... verticillata
   Bladskedens rand foroven glat adhaerens
3. Dusken mellembrudt, dens akse kort stivhåret ..... decipiens
   " ej " , " " også blødhåret viridis

Setaria verticillata (L.) Beauv. Kransskærmaks. 20-60cm. Dusken mellembrudt forneden. Børsterne ikke eller svagt røde. Småaksene 2-2,3mm. 0-800m. V-X.

S. adhaerens (Forsskål) Chiov. Burreskærmaks. Småaksene 1,7-2mm.

S. decipiens Nyman (S. ambigua) Kortbørstet skærmaks. 20-50cm. Aksen synlig mellem kransene (helt dækket hos viridis). De fleste børster kun 3-4mm (alle 5-10mm hos viridis). VI-X.

S. viridis (L.) Beauv. Grønt skærmaks. 0-1600m. VI-X.

Pennisetum villosum R.Br. Dungræs. 50-70cm. Flerårig. Bladene flade eller indrullede. Dusken 3-10x2-4cm, hvidlig eller lillabroget. Hvert småaks med et svøb af 3-7cm lange børster, der er fjerformede nederst. VI-VIII. Forvildet.

P. ciliare (L.) Link (Cenchrus c.) Randhåret dungræs. 25-60cm. Ofte med udløbere. Dusken 5-10cm, valseformet. 2-3 småaks sammen på 2-5,5mm, omgivne af et svøb af randhårede børster på 8-15mm. 0-600m. V-X.

Imperata cylindrica (L.) Beauv. Sølvgræs. 50-120cm. Bladene indtil 50cm, indrullede og stift oprette. Dusken indtil 20cm, tæt og cylindrisk, hvidulden af de lådne yderavner. Småaksene tobloms-trede, 4-6mm. 0-300m. V-VII. Klitlavninger og flodbredder.

Saccharum spontaneum L. Vildt sukkerrør. 1½-2½m. Bladene ½-1½cm brede, glatte og ru, ofte indrullede. Toppen lancetformet, 20-50 cm, uldhåret. Småaksene 3½-7mm, deres akse med hår på 2-3 x småakset. Inderavnen uden stak. Om. IX-XI.

S. ravennae (L.) Murray (Erianthus r.) Sølvrør. 1-4m. Bladene indtil 1cm brede, men ofte indrullede, til sidst ofte rødlige med hvide ribber. Toppen 30-50cm, hvidulden og lappet. Småakshårene af småaksets længde. Inderavnen med stak. Om. VII-X.

Sorghum halepense (L.) Pers. Vild durra. 40-140cm. Opret flerårig med udløbere. Bladene 1-2cm brede, ofte med hvid midterribbe. Toppen stor og rødbrun med udstående grene. Småaksene 4½-6mm. Stakken 10-16mm eller manglende. 0-600m. VII-X.

Chrysopogon gryllus (L.) Trin. Gyldent skæggræs. 30-100cm. Flerårig. Hårformet skedehinde. Toppen åben og udspærret, med gyldent og lillabrogede småaks i grupper på 3 med det midterste siddende og med en stak på 3-4cm. 0-1000m. VI-VII.

Dichanthium ischaemum (L.) Roberty Almindeligt skæggræs. 15-60 cm. Tættuet flerårig. 3-15 fingerformede aks på 3-7cm med tiltrykte småaks. Bladene krummede og teglstensrøde om sommeren. Stakken 10-15mm. 0-1300m. VI-XI.

Siden indeholder rettelser (november 2016)

Andropogon distachyos L. Hornet skæggræs. 30-90cm. 2 endestillede aks på 4-14cm. Småaksene 9-12mm. Inderavnens stak 15-30mm. 0-600m. V-IX.

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf Tvillingskæggræs. 30-100cm. Toppen dannes af mange parvise klaser på 3-4cm på fælles stilke fra bladhjørnerne. 0-600m. V-X.

ARACEAE

1. Ingen blade under blomstringen ..... Biarum
   Med " " " 2.
2. Bladene fodfligede ..... Dracunculus
   " ikke fligede 3.
3. Bladet med afrundet eller kileformet grund ..... Biarum
   " " pilformet grund 4.
4. Hylsterbladet sammenvokset forneden, hætteformet foroven Arisarum
   Hylsterbladet frit forneden 5.
4. Hylsterbladet rørformet nederst, æg-lancetformet øverst Arum
   Hylsterbladet tragtformet, snehvidt Zantedeschia

Zantedeschia aethiopica (L.) Sprengel Hvid kalla. 50-150cm. Bladene pil-spydformede med butte lapper, 15-40x10-30cm. Hylsterbladet 10-25cm. Kolben gul, 5-10cm, med blomster over det hele. 0-300m. IV-VI. Forvildet.

Arum alpinum Schott & Kotschy (A. maculatum p.p.) 20-32cm. Hylsterbladet lysegrønt, røret med et lillat tværbånd indvendigt ud for hanblomsterne. Kolbens øvre del tynd og ormeagtig, 3-5cm x 2½-4mm, lyst chokoladebrun til mørklilla. 900-1400m. IV-V.

A. concinnatum Schott 30-45cm. Knolden med udløbere, danner derfor større bevoksninger. Bladene 15-55cm, ofte lidt gråplettede. Hylsterbladet 16-29cm, bleggrønt, randen med lillat skær. Kolbens øvre del 9-15mm tyk. Af de 2 golde afsnit mellem blomsterne er det nedre 2-2½mm og det øvre 6-7mm. 0-650m. IV-V.

A. italicum Miller Hvidåret lygtemand. 40-100cm. Nær foregående, men bladene ofte hvidribbede. Af de 2 golde afsnit mellem kolbens blomster er det nedre 3-7mm og det øvre 3½-6mm. IV-V.

Biarum tenuifolium (L.) Schott Brun ormetunge. Mest høstblomstrende uden blade, sjældnere vårblomstrende med blade. Hylsterbladet 8-20cm, sidder på jorden, mørklillat med grønligt skær, lancetformet. Kolben ofte længere end hylsterbladet. Bladene 5-20cm x 3-15mm, m.m. linjeformede. Med golde blomster både mellem kolbens han- og hunblomster såvel som over hanblomsterne. 0-800m. IX-XI(-VI).

B. spruneri Boiss. Vårormetunge. Som den foregående, men blomstrer i det sene forår med blade. Ingen golde blomster oven over hanblomsterne.

Arisarum vulgare Targ.-Tozz. Munkehætte. 10-30cm. 1-få blade på 4-10cm, der ligner små Arum-blade. Hylsterbladet 3-5cm, grønligt med brunlilla længdestriber, foroven hætteagtigt fremoverbøjet. 0-800m. X-V.

Dracunculus vulgaris Schott Dragerod. 30-100cm. Bladene nærmest juleroseagtige med 9-15 fodformet anbragte flige, 15-20 x 25-35cm. Hylsterbladet 20-40cm, grønligt udvendigt og mørkt brunlillat indvendigt. Kolben mørklilla og glat. 0-1450m.IV-VI.

LEMNACEAE

Lemna gibba L. Tyk andemad. 0-800m.

L. minor L. Liden andemad. 0-1600m.

SPARGANIACEAE

Sparganium erectum L. ssp. neglectum (Beeby) Sch.& Th. Grenet pindsvineknop. 0-500m. VI-VIII.

TYPHACEAE

Typha angustifolia L. Smalbladet dunhammer. Bladskederne ofte ørede. Hunakset brunt. Hunblomsternes skæl matte og mørkebrune.

T. domingensis Pers. Stor dunhammer. 1-3m. Bladskederne uden øren. Hunakset lysebrunt. Hunblomsternes skæl lysebrune og gennemskinnelige. 0-400m. IV-VII.

CYPERACEAE

Scirpus. Kogleaks.

1. Småaksene samlede i kugleformede hoveder ..... holoschoenus
   " ikke samlede i kugleformede hoveder 2.
2. Blomsterstanden øjensynligt endestillet ..... maritimus
   " " sidestillet 3.
3. Ofte enårig. Stænglen under 1mm tyk ..... 4.
   Flerårig. Stænglen over 2mm tyk 5.
4. Støttebladet ofte omtrent af småaksenes længde. Nødden m.m. glat ..... cernuus
   Støttebladet ofte længere end småaksene. Nødden længderibbet setaceus
5. Stænglen trekantet ..... litoralis
   " trind 6.
6. Avnerne glatte. Stænglen grøn. Mest 3 støvfang ... lacuster
   " småvortede. Stænglen blågrøn. Mest 2 støvfang tabernaemontani

Scirpus maritimus L. Strandkogleaks. 0m. V-X.

S. holoschoenus L. Kuglekogleaks. 30-50cm. Stænglen trind. Aksstanden tilsyneladende sidestillet, bestående af mest 1-10 kugleformede, stilkede hoveder på op til 12mm. 0-1600m. IV-VI.

S. lacuster L. Søkogleaks. 0-1500m. V-VIII.

S. tabernaemontani Gmelin Blågrønt kogleaks. 0-900m. V-VIII.

S. litoralis Schrader Sumpkogleaks. 50-120cm. Et Søkogleaks med trekantede stængler. 0m. V-VI.

S. setaceus L. Børstekogleaks. 5-20cm. 1-4 småaks sammen.

S. cernuus Vahl Damkogleaks. 3-15cm. Som setaceus, men 1(-3) småaks sammen. På fugtigt sand. 0-1300m. V-X.

Blysmus compressus (L.) Link Fladtrykt kogleaks. VI. KY.

Eleocharis palustris (L.) R.& Sch. Alm. sumpstrå. 0-1600m.VI-IX.

Cyperus. Fladaks.

1. Enårig ..... fuscus
   Flerårig 2.
2. Blomsterstanden et hovede ..... capitatus
   " en skærm eller et knippe 3.
3. Aksene i et sidestillet knippe ..... laevigatus
   " " en endestillet skærm 4.
4. Uden blade, kun med støtteblade for skærmen .. alternifolius
   Med blade 5.
5. 50-120cm. Uden rodknolde ..... longus
   10-40cm. Med rodknolde 6.
6. Bladene blågrønne, 2-6mm brede. Aksene rødbrune ... rotundus
   " friskgrønne, 5-10mm brede. Aksene strågule til rødlige esculentus

Cyperus longus L. Langt fladaks. 50-120cm. Stænglens nederste ofte 20cm dækkede af bladløse skeder. Skærmen ofte med 2-4 støtteblade på 7-17cm x 6-8mm. Aksene mørke- eller rødbrune. VI-VIII.

Cyperus rotundus L. Knoldfladaks. Alle blade grundstillede. Skederne ofte rødlige. 2(4) støtteblade op til 5cm. 0-600m.VI-XI.

C. esculentus L. Spiseligt fladaks. 2-9 skærmstråler. Aksene 6-12mm med m.m. udstående avner. 0-300m. VII-X.

C. alternifolius L. 45-100cm. Med 11-25 støtteblade, 6-10mm brede og ca. 2 x skærmens længde. 20-25 skærmstråler. Forvildet.

C. fuscus L. Brunt fladaks. 2-35cm. Stænglen trekantet med konkave sider. Bladene 2-3mm brede, kølede. Aksene 3-8mm, mørke- eller rødbrune. Avnerne med grønlig køl. 0-1500m. VII-IX.

C. capitatus Vandelli Hovedfladaks. 10-50cm. Grågrøn sandplante med lange udløbere. Stænglen trind, ofte krum. Bladene sivformet indrullede og stive. Hovedet 2-3cm bredt med 3-6 støtteblade på 3-12cm. Om. V-IX.

C. laevigatus L. ssp. distachyos (All.) Maire Sivfladaks. 20-40 cm. Stråene but trekantede, omgivne af bladskeder forneden. Aksstanden med oftest 2-6 aks på 2-15mm lange stilke, omgivne af 2 støtteblade, hvoraf det ene forlænger stænglen. 0-300m. VI-VIII.

Cladium mariscus (L.) Pohl Avneknippe. 0-800m. V-VII.

Schoenus nigricans L. Sortskæne. 15-60cm. Tæt tueformet flerårig med sortagtige nedre bladskeder. Et hovede på 5-10 sortbrune aks med 2 højblade, hvoraf det nedre forlænger stænglen lidt. 0-1500m. IV-VII.

Carex. Star.

1. Aksene ens af udseende ..... 2.
" forskellige, hanaks foroven, hunaks forneden 12.
2. Ikke tueformet ..... divisa
Tueformet (kan evt. også have udløbere) 3.
3. 3 støvfang ..... 4.
2 " 5.
4. Nederste aks langstilket og grundstillet ..... illegitima
" " kortstilket og højerestillet distachya
5. Hunblomsterne sidder øverst i det enkelte aks ..... 6.
" " nederst i aksene 7.
6. Nederste støtteblade 10-20cm lange og bladlignende remota
" " meget kortere ovalis
7. Stænglen m.m. vinget, tværsnittet med konkave sider ..... 8.
" uvinget, tværsnittet ikke med " " 9.
8. Støttebladene med mørkebrun, øreformet omfattende grund. Nedre bladskeder sortagtige, stærkt trævlede .. vulpina
Støttebladene med bleggrøn grund. Nedre bladskeder lysebrune, næppe trævlede otrubae
9. Frugten med en tydelig tværfure og svampet underdel spicata
" uden tværfure 10.
10. Aksene tætsiddende; nederste aksmellemrum under 1cm muricata
De nedre aks med afstande på 1-4cm 11.
11. Frugten 3½-4mm, blegbrun. Nedre aksmellemrum længere end aksene ..... divulsa
Frugten 4½-5mm, mørkebrun. Nedre aksmellemrum ikke længere end aksene polyphylla
12. 2 støvfang ..... 13.
3 " 14.
13. Nedre bladskeder netformet optrævlede ..... elata
" " hele acuta
14. Flere veludviklede hanaks (se på flere planter) ..... 15.
1 hanaks 18.
15. Frugterne uden tydeligt næb, ruprikkede eller hårede flacca
" med " " 16.
16. Blade og frugter hårede ..... hirta
Bladene glatte 17.

17. Frugten stivhåret foroven ..... hispida
" glat riparia
18. Frugterne dunede eller filtede ..... 19.
" glatte eller højst hårede langs kanten 21.
19. Med 1-2 grundstillede, mest langstilkede hunaks halleriana
Uden grundstillede hunaks 20.
20. Hunaksene siddende og oprette ..... macrolepis
" stilkede og m.m. hængende kitaibeliana
21. Hunaksene hængende ..... 22.
" oprette 23.
22. Hunaksenes dækskæl grønlige ..... silvatica
" " rødbrune pendula
23. Frugterne skinnende brune ..... liparocarpos
" lysere 24.
24. Hunaksenes dækskæl brodspidsede ..... extensa
" " butte eller spidse 25.
25. Frugterne skinnende, m.m. udstående ..... punctata
" matte, tiltrykte distans

Carex divisa Hudson Skænestar. 10-50cm. Stænglerne m.m. ru. Bladene 1-3mm brede. Aksstanden 1½-2½cm, ægformet med 3-8 brune, tætsiddende aks, der er hanlige øverst. 0-600m. IV-VI.

C. illegitima Cesati Fodstar. 20-40cm. Bladene blågrønne, 1-3mm brede, op til 2 x stråene. Nedre skeder sortbrune. Tueformet samt med lange udløbere. Nedre støtteblade lange, 6-15cm. III-IV.

C. distachya Desf. Pinjestar. 15-45cm. Bladene ½-1mm brede. Stråene butkantede. 2-4 løse aks med 2-5 hunblomster. Nedre støtteblade lange, 6-15cm. Frugterne 1-ribbede. 0-1000m. IV-VI.

C. remota L. Akselblomstret star. 0-1300m. V-VII.

C. ovalis Good. Harestar. 1600-2000m. V-VI.

C. vulpina L. Rævestar. IV-VI.

C. otrubae Podp. Syltstar. 0-1500m. IV-VI.

C. spicata Hudson Spidskapslet star. 0-1700m. IV-VII.

C. muricata L. (C. pairaei) Pigget star. 1700-2000m. VI. TA.

C. divulsa Stokes Sydlig mellembrudt star. 20-60cm. Ligner den følgende, men bladene 2-3mm brede (3-4mm hos pol.) 0-800m. IV-VI.

C. polyphylla Kar.& Kir. (C. divulsa ssp. leersii) Mellembrudt star. 200-1500m. V-VI.

C. elata All. Stiv star. 0-1500m. IV-V.

C. acuta L. Nikkende star. 0-1800m. IV-VI.

C. flacca Schreber Blågrøn star. 0-2050m. III-VI. 2 underarter:
ssp. flacca: Hunaksene ofte hængende. Dækskællene med 1 ribbe, næppe længere end den 2-3mm store frugt.
ssp. serrulata (Biv.) Greuter: Hunaksene oprette. Dækskællene med 3 ribber, lig eller længere end den 3-4mm lange frugt.

C. hirta L. Håret star. 0-1900m. IV-VI.

C. hispida Willd. Ru star. 45-100cm. Stænglerne kraftige, butkantede. Nedre skeder sortbrune og trævlede. Bladene 5-8mm brede. 2-4 cylindriske, 2-3½cm lange, langt adskilte hunaks. Frugterne flaskeformede, grønlige, flerribbede. 0-800m. III-V.

C. riparia Curtis Tykakset star. 0-600m. IV-VI.

C. halleriana Asso Stilkstar. 10-40cm. Nedre skeder brune og trævlede. 1-2 5-15cm langt stilkede, grundstillede + 3-5 korte, tætsiddende, ægformede hunaks. 0-1500m. III-V. TA.

C. macrolepis DC. Bredskællet star. 30-60cm. Nedre skeder rødbrune til mørkt brunlilla. 1(2) hunaks på 7-12mm, ægformede til aflange. Frugten 3½-6mm, mørkt brunlilla. 800-2100m. IV-V.

Carex kitaibeliana Becherer Koststar. 10-40cm. Nedre skeder brune til røde, alle bladede. Bladene lidt slappe, ½-1mm brede. Frugten 4-6mm, med fremtrædende ribber og et smalvinget næb. 400-2900m. V-VI. KH,KY.

C. silvatica Hudson Skovstar. 0-1100m. IV-V.

C. pendula Hudson Kæmpestar. 60-140cm. Bladene 7-12(-16)mm brede. Hunaksene 5-26cm lange, 5-7mm brede. 50-800m. IV-V.

C. liparocarpos Gaudin Glansstar. 10-30cm. Bladene 1-2mm brede. 2-3 mest overlappende hunaks på 5-15x5-6mm med 5-12 blomster. Dækskællene rødbrune, bredt hindekantede. 0-1850m. III-V.

C. extensa Good. Udspilet star. 0m. V-VI.

C. punctata Gaudin Prikstar. 20-50cm. Bladene 4-8mm brede, friskgrønne. Støttebladene ofte stængeloverragende. Hunaksene cylindriske eller aflange. 0-1100m. IV-V.

C. distans L. Fjærnakset star. 0-1900m. IV-VI.

ORCHIDACEAE

1. Planten uden grønne blade, kun med farvede skælblade .... 2.
   " med " " 3.
2. Planten lilla ..... Limodorum
   " brun Neottia
3. Blomsterne uden spore ..... 4.
   " med " 10.
4. 2 ægformede, modsatte blade midt på stænglen ..... Listera
   Bladene anderledes 5.
5. Små, hvide, skruestillede blomster på 4-7mm .... Spiranthes
   Større og anderledes stillede blomster 6.
6. Underlæben firfliget. Hjælmdannende blosterblade .... Aceras
   " ikke firfliget 7.
7. Underlæben ikke tværdelt ..... Ophrys
   " delt på tværs i en inder- og yderlæbe 8.
8. Frugtknuden stilket ..... Epipactis
   " m.m. siddende 9.
9. Frugtknuden snoet. Hvide/rødlilla blomster .. Cephalanthera
   " ikke snoet. Læben rødbrun Serapias
10. Støttebladene hindeagtige ..... 11.
    " urteagtige 13.
11. Underlæben med 2 lameller nær grunden ..... Anacamptis
    " uden lameller 12.
12. Blomsterne under 5mm ..... Neotinea
    " over 5mm Orchis
13. Sporen 1-1½mm ..... Nigritella
    " længere 14.
14. Læben udelt og smal; hvid blomst ..... Platanthera
    " anderledes 15.
15. Læben 4-fliget med krusede sideflige ..... Barlia
    Læbens sideflige ikke krusede Dactylorhiza

Epipactis helleborine (L.) Cr. Skovhullæbe. Bladene længere end stængelleddene. 500-1600m. sVI-fIX.

E. microphylla (Ehrh.) Sw. Småbladet hullæbe. 15-50cm. Bladene mest kortere end stængelleddene. Støttebladene kortere end frugtknuden. Klasen m.m. ensidig. Blomsterne mest nikkende. Yderlæben med vortet grund. 0-1200m. VI-VIII.

Cephalanthera rubra (L.) Rich Rød skovlilje. 20-60cm. Blomsten rødlilla. 400-2200m. mV-VIII.

C. longifolia (Hudson) Fritsch Sværdskovlilje. 20-45cm. Blomsterne hvide. 6-10 blade, der er mindst 6 x så lange som brede.

C. damasonium (Miller) Druce Hvidgul skovlilje. Blomsterne hvidlige-flødefarvede. 3-5 blade, der er 2-3 x så lange som brede. 0-1600m. V-VII.

Limodorum abortivum (L.) Swartz Fuglestok. 20-80cm. Stænglen med skælblade og 6-20 lilla blomster med en spore på 15-25mm. V-VII.

Neottia nidus-avis (L.) Rich. Rederod. 0-1500m. V-VII.

Listera ovata (L.) R.Br. Ægbladet fliglæbe. 500-1800m. V-VII.

Spiranthes spiralis (L.) Chevall Skrueaks. 10-25cm. Bladene ægformede til elliptiske, grundstillede. Underlæben udelt. De små blomster tætstillede i en skrueformet række. 0-900m. X-XI.

Platanthera bifolia (L.) Rich Bakkegøgelilje. 0-2000m. V-VII.

Nigritella nigra (L.) Rchb.f. Brunkulle. 10-20cm. Grundbladene græsagtige. Akset tæt, 1½-2cm, næsten kugleformet i fuld blomst. Blomsterne mørke- til sortrøde. Læben udelt, sidder foroven i blomsten, så lang som blosterbladene. Over 1600m. mVI-VII. TA.

Dactylorhiza. Gøgeurt.

1. Sporen opadrettet ..... romana
   " vandret eller nedadrettet 2.
2. Sporen tyndt valseformet, 1-1½mm tyk ..... iberica
   " bredt valse- til kegleformet, tykkere end 2mm 3.
3. Blomsterne gule eller mørkerøde med gult svælg ... sambucina
   " m.m. rødlilla, ikke gule omkring svælget saccifera

Dactylorhiza iberica (Bieb.) Soó Roegøgeurt. 25-50cm. Blosterbladene næsten hjælmdannende. Bladene linje-lancetformede, upletted. Sporen 5-7mm, nedadbøjet. Lyserød blomst. 600-1800m.VI-mIX.

D. sambucina (L.) Soó Hyldegøgeurt. 700-2000m. mV-sVI.

D. romana (Seb.) Soó 15-35cm. Bladene indtil 15x1½cm. Blomsterne gule, hvidlige eller rødlilla. Læben 3-lappet. 0-600m. III-VI.

D. saccifera (Brongn.) Soó Tragtgøgeurt. 25-90cm. Sporen næppe bøjet, lidt nedadpegende, ret tyk og lidt kegleformet. Underlæben med stribe- og pletmønster. -2000m. mV-sVIII.

Neotinea maculata (Desf.) Stearn Kyseblomst. 10-30cm. Bladene lidt blågrønne og oftest småplettede. Akset tæt, 2-6cm, noget ensidigt. Blosterbladene hjælmdannende, mat lyserøde eller grønlighvide. Læbens midterflig parallelsidet. 0-1600m. IV-V.

Orchis. Gøgeurt.

1. I det mindste nogle blosterblade udstående ..... 2.
   Alle 5 blosterblade hjælmdannende 12.
2. Blomsterne gule ..... 3.
   " røde 5.
3. Læben uden røde prikker ..... pallens
   " med " " 4.
4. Bladene plettede. Læben med et knæk på ca. 60° provincialis
   " uplettede. Læben lige fremstrakt pauciflora
5. Bladene linje-lancetformede, ingen egentlig roset laxiflora
   " ofte bredere, med roset 6.
6. De øvre blomster springer først ud .....boryi
   " nedre " " " " 7.
7. Læben helt udelt ..... collina
   " m.m. tredelt 8.
8. Sporen nedadbøjet ..... 9.
   " opadrettet 10.
9. Ydre blosterblade grønne ..... spitzelii
   " " rødlilla quadripunctata
10. Sporen trådformet ..... anatolica
    " valseformet, ofte bredere mod spidsen 11.
11. Sidestillede blosterblade vender fladen fremad pinetorum
    " " " m.m. kanten fremad mascula
12. Læben m.m. udelt ..... papilionacea
    " delt 13.
13. Sporen opadbøjet eller vandret ..... 14.
    " nedadbøjet 15.

14. De øvre blomster springer først ud ..... boryi
" nedre " " " " morio
15. Læbens midterflig mindre end sidefligene ..... 16.
" " større " " 17.
16. Læbens midterflig rødplettet og finvortet-håret coriophora
" " uplettet og glat sancta
17. Støttebladene noget kortere end til lig frugtknuden ... 18.
" meget " " frugtknuden 19.
18. Ydre blosterblade med grønt på sig. Konveks læbe .. lactea
" " uden grønt. Læben flad eller konkav tridentata
19. Blosterbladene brunrøde ..... purpurea
" bleglilla til lyserøde 20.
20. Læbens flige spidse. Bladranden bølget ..... italica
" " lidt butte. Bladranden jævn simia

Orchis papilionacea L. Sommerfuglegøgeurt. 15-40cm. Blosterbladene ikke helt hjælmdannende, stribede og vinrøde. Læben ofte lys, med brudt stregmønster, ofte rudeformet. Nedadkrummet spore.

O. boryi Rchb. Lyslæbet gøgeurt. 20-45cm. Støttebladene ca. ½ x frugtknuden. Rødlilla blomst med lysere, svagt trelappet læbe med 2 rækker af 1-3 pletter. 300-1200m. IV-V.

O. morio L. Salepgøgeurt. 0-1300m. IV-V.

O. coriophora L. ssp. fragrans (Pollini) Sudre Tægegøgeurt. 15-60cm. Hjælmens blosterblade tilspidsede. Blomsterne brune, røde, lyserøde eller grønlige. 0-1000m. IV-VI.

O. sancta L. Kroggøgeurt. 15-45cm. Blosterbladene langt tilspidsede; spidsen udgør 1/3-2/5 af den hvælvede inderdel. IV-VI.

O. tridentata Scop. ssp. commutata (Tod.) Nyman Tretandet gøgeurt. 15-45cm. Hjælmbladene langspidsede, blegt rødlilla med mørkere striber. Læben rigeligt rødlillat prikket. 0-1500m. IV-mVI.

O. lactea Poiret Mælkegøgeurt. 10-20cm. Blosterbladene med spids, hvidlige eller grønlige med rødlilla striber. Læben hvid eller lyserød, ret rødprikket. 0-600m. III-IV.

O. italica Poiret Flammegøgeurt. 20-40cm. Hjælmbladene langt tilspidsede, blegt rødlilla med mørkere årer. Underlæben med 4 smalle og lange flige. 0-600m. III-IV.

O. simia Lam. Abegøgeurt. 20-45cm. Som foregående, men hjælmbladene ofte svagt årede. 0-1100m. IV-VI.

O. purpurea Hudson Stor gøgeurt. 0-1300m. IV-VI.

O. spitzelii Sauter Alpegøgeurt. 20-40cm. Blosterbladene grønne med rødt anstrøg og røde prikker. Læben rød og plettet.sIV-V.

O. mascula (L.) L. Tyndakset gøgeurt. 0-2100m. IV-VI.

O. pinetorum Boiss.& Kotschy -2400m. III-VI.

O. pallens L. Bleg gøgeurt. 15-35cm. Bladene uplettede. Læben rundagtig-rudeformet, 3-lappet. Sporen opadbøjet. 600-2200m. IV-VII. TA,ME,KH m.m.

O. provincialis Balbis Krumsporet gøgeurt. 15-35cm. 5-20 blomster. 0-1700m. IV-V.

O. pauciflora Ten. Fåblomstret gøgeurt. 15-30cm. Mest 3-7 blomster. 0-1500m. III-V.

O. anatolica Boiss. Langsporet gøgeurt. 15-40cm. Bladene mest plettede. Underlæben foldet, med en lang, dobbelt punktrække. Blomsten rødlilla til blegrød. Sporen 15-25mm. 100-1700m. III-V.

O. quadripunctata Ten. Firplettet gøgeurt. 10-30cm. Blomsten lyst rødlilla. Ydre blosterblade vinkelret udstående i eet plan, de to indre fremadrettede mod hinanden. Læben med ca. 4 prikker nær svælget. 0-1200m. IV-VI.

Orchis laxiflora Lam. 20-60cm. Blomsterne mørkt rødlilla. Underlæbens midterfelt hvidt og oftest uprikket. Sporen skråt opadrettet, 10-19mm. Kær og våde enge. 0-1200m. IV-VI.

O. collina Sol. (O. saccata) Sækgøgeurt. 10-40cm. Blosteret grønligbrunt; læben vinrød. Sporen 5-7(10)mm, ca. 2 x så lang som tyk, nedadrettet. 0-1200m. II-IV.

Aceras anthropophorum (L.) Ait.f. Den hængte mand. 10-40cm. Akset smalt valseformet og tætblomstret. Øvre blosterblade grønlige. Læben okkergul, lang og firfliget, så den ligner en mand med arme og ben. 200-1200m. III-IV.

Barlia robertiana (Loisel.) Greuter Kruslæbe. 25-60cm. Blosterbladene hjælmdannende, ikke spidse, af forskellige farve og rødplettede indvendigt. Læben 13-20mm. Sporen kegleformet, 4-6mm. 0-500m. II-IV.

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich Horndrager. 20-60cm. Akset 2-8 cm, kegle- til kort valseformet. Blomsterne lyst til mørkt rødlilla. Underlæben med 3 korte, næsten lige store lapper. Sporen 10-15x½mm. 0-1400m. V-VI.

Serapias. Hønsetunge.

1. Læben allerinderst med 1 sort vulst ..... lingua
   " " " 2 åse 2.
2. Ydre sidestillede blosterblade med dråbeformet grund og tilspidsede. Læbens ydeflig 7-11½mm lang .... parviflora
   Ydre sidestillede blosterblade med rundagtig grund og sylformet spids. Læbens yderflig over 12mm lang 3.
3. Yderlæben hjærteformet, største bredde over 2 x bredden ved grunden ..... cordigera
   Yderlæben lancetformet, største bredde højst 1,6 x bredden ved grunden 4.
4. Yderlæben 13½-18mm. Blosterbladene 18½-24mm vomeracea ssp. laxiflora
   Yderlæben 18-33mm. Blosterbladene 23-33mm 5.
5. Støttebladene mest meget længere end blosterbladshjælmen, 13-18½mm brede ..... vomeracea ssp. vomeracea
   Støttebladene næppe længere end blosterbladshjælmen, 18-25mm brede orientalis

Serapias lingua L. 10-30cm. Støttebladene kortere end den m.m. vandrette blosterhjælm. Blosterbladene 15-21mm. Yderlæben 13-18 mm, 7-12mm bred midtpå. 0-1200m. III-V.

S. parviflora Parl. Småblomstret hønsetunge. 15-25cm. Hjælmen ofte indesluttet under det 3-4cm lange støtteblad. Yderlæben 3½-4½mm bred midtpå. 0-800m. IV-V. (S. politisii er en form med grønne støvsække (gule hos parviflora)).

S. vomeracea (Burm.f.) Briq. Plovskærshønsetunge. III-V. 2 ssp:
ssp. vomeracea
ssp. laxiflora (So6) Gölz & Reinhard (S. bergonii E.G.Camus)

S. orientalis (Greuter) Baumann & Künkele 10-30cm. III-V.

S. cordigera L. Purpurhønsetunge. 20-40cm. Stængel og blade lillaprikkede ved grunden. Yderlæben brunrød til brunlilla, 15-28 x 18-26mm. 0-650m. IV-V.

Ophrys. Flueblomst.

1. Griffelstøtten but ..... 2.
   " spids 9.
2. Ydre blosterblade rødlige ..... tenthredinifera
   " " grønlige 3.
3. Læben tæthåret langs hele randen ..... 4.
   " ikke stærkt randhåret 5.
4. Læbens midterfelt fladt eller lidet hvælvet ..... speculum
   " stærkt hvælvet vernixia

5. Læben brun med hårede sideflige ..... bombyliflora
Læbens sideflige kun finvortede 6.
6. Læbens rand fladt udbredt eller opadbøjet ..... lutea
" " nedadbøjet 7.
7. Læben uden eller kun med svagt antydet fure ved grunden omegaifera
Læben ved grunden med 2 åse og en fure imellem dem 8.
8. Læbens mærke skinnende blåt ..... iricolor
" " gråt, brunt eller lillat fusca
9. Læben helt uden mærke, udelt ..... helenae
" med et mærke 10.
10. Mærket omslutter ikke læbens grund ..... 11.
" " læbens grund 15.
11. Læben sortagtig med hvidt mærke ..... reinholdii
" med blåt mærke 12.
12. Læbens spids med et ret stort 3-lappet vedhæng delphinensis
" " uden eller med et lille vedhæng 13.
13. Læbens bageste randbehåring lang og hvid ..... argolica
" " " kort og mørk 14.
14. Læbens hovedlap smalt trekantet i omrids ... gottfriediana
Læben bred, mest udelt ferrum-equinum
15. Læben m.m. udelt ..... 16.
" tydeligt tredelt 20.
16. Læbens spids med et stort, ofte 3-tandet vedhæng ..... 17.
" " uden eller med et lille vedhæng 18.
17. Læbens mærke skjoldformet, bredt hvidrandet ..... candica
" " med H-formet grundstruktur holoserica
18. Læbens glatte rand flad eller lidt opadbøjet .. aesculapii
" rand skråt nedadrettet 19.
19. Ydre sidestillede blosterblade grønne ..... sphegodes
" " " grønne, men med brunrødt skær i nederste halvdel mammosa
20. Læben uden eller med et lille vedhæng i spidsen ..... 21.
" med et stort, ofte 3-tandet vedhæng i spidsen 22.
21. Ydre blosterblade mest rødlilla. Læbens grundfarve sortrødbrun til sortlilla ..... spruneri
Ydre blosterblade grønne. Læbens grundfarve brun sphegodes
22. Læbens vedhæng bøjet ind under læben ..... apifera
" " opadbøjet, ofte 3-tandet 23.
23. Læbens sidelapper med korte, stumpe horn ..... delphinensis
" " " veludviklede, spidse horn 24.
24. Øverste blosterblad bøjet ind over griffelstøtten umbilicata
Øverste blosterblad opret eller tilbagebøjet (hvis fremadrettet, dækker det ikke griffelstøtten) scolopax

Ophrys tenthredinifera Willd. Stor flueblomst. 10-30cm. Læben firkantet til trapexformet, helrandet, med et opadbøjet vedhæng i spidsen samt 2 knuder; oftest bredt gulrandet, ellers brunlilla med et lilla, hvidrandet, oftest blåt mærke. 0-600m.IV-V.

O. speculum Link (O. ciliata) Spejlflueblomst. 5-25cm. Læben noget forlænget, butlappet og med bred, udrandet midterflig, hvor det skinnende, blålilla, gulrandede mærke fylder det meste.

O. vernixia Brot. 15-50cm. Læbens hår orange til brungule. Læben lidet udrandet. Ellers som foregående. III-IV.

O. bombyliflora Link Humleflueblomst. 5-20cm. Ret små blomster. Læben stærkt hvælvet, håret. Ydre blosterblade grønne og ret brede. 0-600m. IV-V.

O. lutea Cav. Gul flueblomst. 10-25cm. Læben ret flad og lang i det, butlappet med let udrandet midterflig, med brunt midterfelt og blålillat mærke. 0-400m. IV-V. 3 underarter:
ssp. melena Renz: Læben brun med brun rand.
ssp. lutea: Læben bredt gulrandet, 14-18mm, med et knæk nedad tæt ved grunden.

ssp. galilaea (Fleischm.& Bornm.) Soó: Læben bredt gulrandet, 8-13½mm, uden knæk.

Ophrys omegaifera Fleischm. Blåbugtet flueblomst. 10-25cm. Læben helt uden fure ved grunden, ofte kloagtigt tilbagebøjet, kort pelsagtigt behåret. 0-900m. II-III.

O. iricolor Desf. Stålflueblomst. 10-35cm. Læben mest 15-23mm, mest med sortlilla grundfarve, næppe gulrandet. 0-1200m. III-IV.

O. fusca Link Mørk flueblomst. 10-40cm. Læben lang i det og butlappet, sortagtig med et oftest mørkeblåt, bredt, omvendt V-formet mærke, smalt gulrandet. 0-1400m. III-IV.

O. helenae Renz Blodrød flueblomst. 15-40cm. Læben vinrød til mørkt brunrød, kort fløjlshåret, 11½-17½x15-23mm (som udbredt), uden knuder. 0-700m. mIV-mV. Nær Pyrgos.

O. reinholdii Fleischm. Næbflueblomst. 20-60cm. Læben ofte smalt trapezformet. Mærket mest hvidt: 2 længdemærker, med eller uden tværbånd. Sidefligene ofte tæt hvidhårede. 0-1300m. III-V.

O. delphinensis O.& E. Danesch 20-40cm. Lyserøde blosterblade. Læben 3 lappet, sidelapperne tæt, lyst langhårede. Ofte med en kastanjebrun plet nær læbens grund. 0-1100m. IV-V.N-Pelop.

O. argolica Fleischm. 15-30cm. Blosterbladene lyserøde, de 2 indre m.m. behårede. Læben udelt til noget trelappet, mørkebrun, ofte med lillaanløben rand. 0-800m. III-V. Udbredt.

O. gottfriediana Renz Nær den følgende. Blosterbladene mest lyserøde, kan være grønlige, det øvre ofte fremadbøjet. Læben sortbrun, midterlappen med stærkt nedbøjede sider. 0-600m. IV.

O. ferrum-equinum Desf. Hesteskoflueblomst. 10-30cm. Læben rundagtig, mørkebrun, uden knuder, med hesteskoformet, blåt mærke.

O. candica Greuter & al. Penselflueblomst. 15-40cm. Ydre blosterblade hvidlig til lyserøde. Læben rektangulær til trapezformet, med brun grundfarve. 0-800m. III-IV.

O. holoserica (Burm.f.) Greuter Dødningeflueblomst. 10-30cm. Blosterbladene røde eller grønne. Læben firkantet til trapezformet, med brun grundfarve og 2 indtil 3mm høje knuder eller horn. Mærket ofte med øjer ud til siderne. 0-1000m. V-VI. (O. fuciflora)

O. aesculapii Renz 15-40cm. Læben brun med 2-3mm bred m.m. gul, glat rand. Mærket H-formet, gråligt. Grønne blosterblade, de indre bølgede, de sidestillede ofte med brunrødt skær. III-V.

O. sphegodes Miller Edderkopflueblomst. 10-40cm. Indre blosterblade ofte bølgede. Læben brun, lådden. Mærket H-formet, ret langt, mest gråblåt. 0-1200m. III-IV.

O. mammosa Desf. Vortefluebloms t. 20-60cm. Indre blosterblade ofte krusede. Læben brun til sortebrun, ofte med noget rudeformet omrids, med glat forrand. Mærket som hos foreg. 0-1400m. III-IV.

O. spruneri Nyman 15-40cm. Læben dybt til svagt 3-lappet. Mærket H-formet, blåt, ofte meget langt. 0-900m. III-V.

O. apifera Hudson Snabelflueblomst. 20-50cm. Griffelstøtten af læbens længde og med bølget spids. Læben stærkt hvælvet, ofte brun, med et skjoldformet, brunt, blå- eller gulkantet mærke.

O. scolopax Cav. Sneppeflueblomst. 10-65cm. Blosterbladene mest rødlige, de 2 indre ret små. Læben med et blåt eller brunt, hvidrandet mærke, der ofte breder sig stærkt. 0-2000m. IV-V. 3ssp.:
ssp. heldreichii Schlechter: Læben 13-16mm. Vedhænget 2½-4½mm. Sidelappernes horn indtil 5mm høje.
ssp. cornuta (Steven) Camus: Læben 7-12mm. Vedhænget 1½-2mm. Sidelappernes horn 6-12mm. (O. oestrifera).
ssp. scolopax: Som foregående, men sidelappernes horn indtil 4mm.

Ophrys umbilicata Desf. (O. attica) Vingefluebloms t. 15-35cm. Ydre blosterblade mest grønne, ellers rødlighvide. Læben som hos foregående. Sidelappernes horn 1-3mm. 0-800m. II-V.

TILFØJELSER

Crataegus monogyna Jacq. Engriflet hvidtjørn. 0-1600m. IV-VI. ssp. monogyna: Bladoversiden m.m. glat, undersiden lådden langs ribber og i ribbehjørner. Kviste og kvaste ofte m.m. glatte. ssp. azarella (Griseb.) Franco: Bladene m.m. tæt lådne på begge sider. Kviste og kvaste lådne.

C. azarolus L. Akselved. 2-10m. Kvistene m.m. tæt uldhåret-filtede. Bladene m.m. læderagtige, m.m. skinnende mørkegrønne ovenpå. Frugten 8-21x8-18mm. 100-650m. III-V.

C. orientalis Pallas (C. laciniata) Fliget hvidtjørn. 1-6m. Tæt uldhårede kviste. Blomsterskuddenes ydre blade 22-40x19-40mm, de nedre flige 80-90% dybe, 2,4-5,0 x så lange som brede. TA,KH,ER.

C. heldreichii Boiss. Uldhåret hvidtjørn. -6m. Blomsterskuddenes ydre blades nedre flige 1,6-3,3 x så lange som brede, hver flig med 1-7 tænder; oversiden mørkegrøn. 20-1550m. V-VI.

C. pycnoloba Boiss.& Heldr. Tykgrenet hvidtjørn. -4m. Blomstrende skuds ydre blade 7-25x6-20mm, nederste flige 2½-6 x så lange som brede, hver flig med 1-3 tænder. 800-1700m. VI-VII. ME,KY,KH.

C. kyrtostyla Fingerhuth (C. subsphaerica) (C. monogyna x rhipidophylla) Nær C. monogyna, men mere tandede blade og fodflige. 870-1650m.

C. albanica Pojark (C. monogyna x orientalis) -7m. Langskudsbladene indtil ca. 62x61mm, ofte meget dybt indskåret-savtakkede; fodfligene indtil 30mm og med indtil 30 tænder. 600-1500m.VI-VII.

C. killinica K.I.Christensen (C. heldreichii x monogyna) -3m. Langskudsbladene indtil ca. 40x35mm, ikke dybt indskåret tandede; fodfligene indtil ca. 12mm, med indtil 9 tænder.1060-1170m.KY,PN.

C. peloponnesiaca Byatt (C. heldreichii x pycnoloba) -5m. Støttebladene 2,7-9,7 x så lange som brede, med 0-7 tænder, affaldende. Bladene med parallelsidede eller indad smallere flige. 1100-1550m. KY,KH (især over Vrakhnion).

SLÆGTSOVERSIGT

Abies 4
Abutilon 90
Acacia 60
Acantholimon 108
Acanthus 138
Acer 87
Aceras 219
Achillea 161
Acinos 128
Adiantum 2
Adonis 32
Aegilops 203
Aeluropus 210
Aethionema 47
Aethiorhiza 173
Agave 188
Agrimonia 54
Agrostemma 22
Agrostis 207
Ailanthus 86
Aira 206
Airopsis 206
Ajuga 121
Alcea 90
Alchemilla 55
Alisma 177
Alkanna 116
Alliaria 40
Allium 184
Alnus 6
Alopecurus 208
Althaea 90
Alyssum 44
Amaranthus 14
Amelanchier 56
Ammi 104
Ammoides 104
Ammophila 207
Amorpha 64
Amygdalus 58
Anacamptis 219
Anacyclus 162
Anagallis 108
Anagyris 60
Anchusa 117
Andrachne 83
Andropogon 212
Andryala 176
Anemone 31
Anethum 102
Angelica 104

Anogramma 2
Anthemis 159
Anthericum 179
Anthoxanthum 206
Anthriscus 100
Anthyllis 77
Antirrhinum 134
Apera 199
Aphanes 56
Apium 104
Aptenia 16
Aquilegia 35
Arabidopsis 40
Arabis 43
Arbutus 107
Arceuthobium 9
Arctium 164
Aremonia 55
Arenaria 17
Argemone 37
Arisarum 212
Aristolochia 9
Armeniaca 58
Armeria 108
Arnebia 115
Arrhenatherum 205
Artemisia 162
Arthrocnemum 14
Arum 212
Arundo 209
Asclepias 111
Asparagus 187
Asperugo 118
Asperula 140
Asphodeline 179
Asphodelus 179
Asplenium 2
Aster 155
Asteriscus 158
Asterolinon 108
Astragalus 62
Asyneuma 151
Athamantha 102
Athyrium 3
Atractylis 163
Atriplex 13
Atropa 131
Aubrieta 44
Aurinia 44
Avellinia 206
Avena 202
Avenula 205

Baldellia 177
Ballota 124
Barbarea 42
Barlia 219
Beckmannia 198
Bellardia 137
Bellardiochloa 198
Bellevalia 184
Bellis 155
Bellium 155
Berberis 35
Berteroa 46
Berula 101
Beta 12
Biarum 212
Bidens 158
Biebersteinia 81
Bifora 100
Biscutella 48
Biserrula 64
Bituminaria 64
Blackstonia 110
Blechnum 3
Blysmus 213
Bolanthus 27
Bongardia 35
Bonannia 104
Borago 118
Botrychium 2
Brachypodium 202
Brassica 49
Brimeura 184
Briza 199
Bromus 200
Broussonetia 7
Bryonia 96
Bufonia 19
Bunias 40
Bunium 101
Bupleurum 103
Butomus 177

Cachrys 103
Cakile 49
Calamintha 128
Calendula 163
Calepina 50
Calicotome 60
Callitriche 120
Calystegia 112
Camelina 47
Campanula 149
Camphrosoma 14
Capparis 38
Capsella 47
Cardamine 43
Cardaria 48
Cardiospermum 88
Cardopatium 163
Carduncellus 170
Carduus 164
Carex 214
Carlina 163
Carpinus 6
Carpobrotus 16
Carrichtera 49
Carthamus 169
Carum 104
Castanea 6
Castellia 197
Catabrosa 199
Catananche 170
Catapodium 197
Caucalis 104
Celtis 7
Cenchrus 211
Centaurea 167
Centaurium 110
Centranthus 147
Centunculus 108
Cephalanthera 216
Cephalaria 148
Cerastium 19
Cerasus 58
Ceratocephalus 34
Ceratonia 60
Ceratophyllum 30
Cercis 60
Cerinthe 116
Cestrum 131
Ceterach 3
Chaenorhinum 134
Chaerophyllum 100
Chamaecytisus 60
Chamaemelum 161
Chamaespartium 61
Chamomilla 162
Cheilanthes 2
Cheiranthus 40
Chenopodium 12
Chondrilla 174
Chrozophora 83
Chrysanthemum 162
Chrysopogon 211
Cicendia 110
Cicer 64
Cichorium 170
Cionura 111
Cirsium 165
Cistus 94
Cladium 214
Clematis 31
Clinopodium 128
Clypeola 46
Cnicus 169
Cnidium 104
Colchicum 179
Coleostephus 162
Colutea 62
Conium 102
Conringia 48
Consolida 31
Convolvulus 112
Conyza 155
Coridothymus 129
Coris 108
Cornus 97
Coronilla 77
Coronopus 48
Corrigiola 21
Cortaderia 210
Corydalis 37
Corylus 6
Corynephorus 206
Cosentinia 2
Cotinus 87
Cotoneaster 57
Cotula 162
Crambe 50
Crassula 50
Crataegus 57 + 222
Crepis 174
Cressa 112
Crithmum 101

Crocus 189
Crucianella 139
Cruciata 143
Crupina 169
Crypsis 210
Cupressus 4
Cuscuta 111
Cutandia 197
Cyathophylla 27
Cyclamen 107
Cydonia 56
Cymbalaria 135
Cymodocea 178
Cynanchum 111
Cynara 166
Cynodon 210
Cynoglossum 119
Cynosurus 199
Cyperus 213
Cystopteris 3
Cytinus 9
Cytisus 60

Dactylis 198
Dactylorhiza 217
Damasonium 177
Danthoniastrum 205
Daphne 90
Dasypyrum 204
Datura 131
Daucus 107
Delphinium 31
Desmazeria 197
Dianthus 28
Dichanthium 211
Dichondra 113
Dictamnus 86
Didesmus 50
Digitalis 135
Digitaria 210
Diplotaxis 49
Dipsacus 148
Doronicum 162
Dorycnium 75
Draba 46
Dracunculus 212
Dryopteris 3
Drypis 27

Ebenus 79
Ecballium 96
Echinaria 200
Echinochloa 210
Echinophora 100
Echinops 164
Echium 116
Edraianthus 152
Elaeagnus 90
Elaeoselinum 106
Elatine 96
Eleocharis 213
Eleusine 210
Elymus 202
Emex 12
Enarthrocarpus 45
Ephedra 5
Epilobium 97
Epipactis 216
Equisetum 1
Eragrostis 210
Erianthus 211
Erica 107
Eriobotrya 56
Erodium 80
Erophila 46
Eruca 49
Erucaria 49
Eryngium 100
Erysimum 40
Eucalyptus 96
Euonymus 88
Euphorbia 83
Euphrasia 137
Evax 156

Falcaria 104
Fedia 147
Ferula 105
Ferulago 105
Festuca 196
Fibigia 46
Ficus 7
Filago 156
Flaveria 158
Foeniculum 102
Fragaria 55
Frangula 88
Frankenia 95
Fraxinus 110
Fritillaria 181
Fumana 95
Fumaria 37

Gagea 180
Galactites 166
Galanthus 118
Galium 141
Garidella 30
Gastridium 207
Gaudinia 205
Gaudiniopsis 205
Genista 61
Gentiana 111
Geocaryum 101
Geranium 79
Geum 55
Gladiolus 191
Glaucium 36
Glechoma 127
Glinus 16
Globularia 137
Glyceria 200
Glycyrrhiza 64
Gnaphalium 156
Gomphocarpus 111
Groenlandia 178
Gymnocarpium 3
Gymnospermium 35
Gynandriris 189
Gypsophila 27

Hainardia 208
Halimione 13
Halimium 94
Halocnemum 14
Halophila 178
Hammatolobium 78
Hedera 98
Hedypnois 170
Hedysarum 78
Helianthemum 94
Helianthus 158
Helichrysum 156
Helictotrichon 205
Heliotropium 114
Helleborus 30
Heptaptera 103
Heracleum 105
Hermodactylus 189
Herniaria 21
Hesperis 41
Hibiscus 90
Hieracium 176
Hippocrepis 78
Hirschfeldia 49
Holcus 206
Holosteum 19
Hordeum 204
Hornungia 47
Humulus 7
Hymenocarpus 77
Hymenolobus 47
Hymenonema 170
Hyoscyamus 131
Hyoseris 170
Hyparrhenia 212
Hypecoum 36
Hypericum 91
Hypochoeris 171

Iberis 48
Imperata 211
Inula 157
Ipomoea 113
Iris 189
Isatis 40
Isoetes 1

Johrenia 105
Juglans 6
Juncus 191
Juniperus 4
Jurinea 164

Kickxia 135
Knautia 148
Kochia 14
Koeleria 205
Kundmannia 102

Lactuca 173
Lagoecia 100
Lagurus 206
Lamarckia 199
Lamium 124
Lamyropsis 166
Lantana 120
Lapsana 174
Laserpitium 106

Lathyrus 66
Laurentia 152
Laurus 35
Lavandula 130
Lavatera 89
Legousia 151
Lemna 212
Lens 66
Leontice 35
Leontodon 171
Lepidium 48
Leucojum 188
Ligustrum 110
Lilium 182
Limodorum 217
Limonium 109
Linaria 134
Linum 81
Lippia 120
Listera 217
Lithodora 115
Lithospermum 114
Lobularia 46
Lolium 196
Lonicera 145
Lophochloa 205
Loranthus 9
Lotus 76
Lunaria 44
Lupinus 61
Luzula 192
Lychnis 22
Lycium 131
Lycopus 129
Lygeum 210
Lysimachia 108
Lythrum 96

Macrotomia 115
Malabaila 105
Malcolmia 41
Malephora 16
Malope 89
Malosorbus 56
Malus 56
Malva 89
Mandragora 131
Mantisalca 167
Maresia 42
Marrubium 123
Marsilea 3
Matricaria 162
Matthiola 42
Medicago 70
Melia 86
Melica 199
Melilotus 69
Melissa 127
Melittis 124
Mentha 129
Mercurialis 83
Mesembryanthemum 16
Mibora 199
Micromeria 127
Micropus 156
Milium 209
Minuartia 18
Mirabilis 15
Misopates 134
Moehringia 18
Moenchia 20
Molinia 210
Molinierella 206
Monotropa 107
Montia 16
Morina 148
Morus 7
Muscari 184
Myagrum 40
Mycelis 173
Myosotis 118
Myosurus 35
Myriophyllum 97
Myrrhoides 100
Myrtus 96

Narcissus 188
Nardus 210
Nasturtium 42
Neatostoma 114
Neotinea 217
Neottia 217
Nepeta 126
Nerium 111
Neslia 47
Nicotiana 131
Nigella 30
Nigritella 217
Nonea 117
Notholaena 2
Notobasis 165
Nymphaea 30

Odontites 137
Oenanthe 102
Olea 110
Omphalodes 119
Onobrychis 78
Ononis 68
Onopordum 166
Onosma 115
Ophioglossum 1
Ophrys 219
Opopanax 105
Opuntia 96
Orchis 217
Origanum 128
Orlaya 106
Ornithogalum 182
Ornithopus 77
Orobanche 138
Oryzopsis 209
Ostrya 6
Osyris 8
Otanthus 162
Oxalis 79

Paeonia 35
Paliurus 88
Pallenis 158
Pancratium 188
Panicum 210
Papaver 35
Parapholis 208
Paraskevia 117
Parentucellia 137
Parietaria 8
Parnassia 53
Paronychia 21
Paspalum 210
Pastinaca 105
Pedicularis 137
Pennisetum 211
Periploca 111
Persica 58
Petrorhagia 27
Peucedanum 105
Phagnalon 157
Phalaris 208
Phedimus 52
Phillyrea 110
Phleum 207
Phlomis 124
Phragmites 210
Phyllitis 3
Physalis 131
Physospermum 102
Phytolacca 15
Picnomon 165
Picris 171
Pimpinella 101
Pinguicula 139
Pinus 4
Piptatherum 209
Pistacia 87
Pisum 68
Plantago 144
Platanthera 217
Platanus 54
Plumbago 108
Poa 197
Podocytisus 60
Polycarpon 22
Polygala 86
Polygonum 10
Polypodium 3
Polypogon 207
Polystichum 3
Populus 5
Portulaca 16
Posidonia 178
Potamogeton 178
Potentilla 55
Prasium 123
Primula 107
Procopiania 117
Prunella 127
Prunus 57
Pseudorlaya 107
Psilurus 199
Psoralea 64
Pteridium 2
Pteris 2
Pterocephalus 148
Ptilostemon 165
Ptilotrichum 46
Puccinellia 198
Pulicaria 158

Pulmonaria 117
Punica 97
Putoria 139
Pyracantha 57
Pyrola 107
Pyrus 56

Quercus 6

Radiola 83
Ranunculus 32
Raphanus 45
Rapistrum 49
Reichardia 173
Reseda 50
Rhagadiolus 170
Rhamnus 88
Rhinanthus 137
Rhodalsine 19
Rhus 87
Ribes 53
Ricinus 83
Ridolfia 104
Rindera 120
Robinia 62
Roemeria 36
Romulea 190
Rorippa 42
Rosa 54
Rosmarinus 129
Rostraria 205
Rosularia 51
Rubia 143
Rubus 54
Rumex 11
Ruppia 178
Ruscus 188
Ruta 86

Saccharum 211
Sagina 20
Salicornia 14
Salix 5
Salsola 14
Salvia 130
Sambucus 145
Samolus 108
Sanguisorba 55
Sanicula 99
Santolina 159
Saponaria 27
Sarcocornia 14
Sarcopoterium 55
Satureja 127
Saxifraga 52
Scabiosa 148
Scaligeria 101
Scandix 100
Schinus 87
Schismus 210
Schoenus 214
Scilla 183
Scirpus 213
Scleranthus 20
Sclerochloa 188
Sclerochorton 102
Scolymus 170
Scorpiurus 78
Scorzonera 172
Scrophularia 133
Scutellaria 122
Secale 204
Securigera 77
Sedum 51
Selaginella 1
Selinum 104
Sempervivum 51
Senecio 162
Serapias 219
Seseli 102
Sesleria 199
Setaria 211
Sherardia 139
Sideritis 123
Silene 22
Silybum 167
Sinapis 49
Sisymbrium 39
Smilax 188
Smyrnium 101
Solanum 131
Solenanthus 120
Solenopsis 152
Solidago 155
Sonchus 173
Sorbus 56
Sorghum 211
Sparganium 213
Spartium 61
Spergula 22
Spergularia 22
Spiranthes 217
Sporobolus 210
Stachys 125
Staehelina 164
Stellaria 19
Stenotaphrum 211
Sternbergia 188
Stipa 209
Strangweia 184
Streptorhamphus 173
Styrax 110
Suaeda 14
Symphytum 117

Taeniatherum 202
Tagetes 159
Tamarix 90
Tamus 188
Tanacetum 162
Taraxacum 173
Taxus 5
Teesdalia 47
Telephium 22
Teline 61
Tetragonolobus 77
Teucrium 122
Thalictrum 35
Thamnosciadium 102
Thapsia 106
Theligonum 97
Thesium 8
Thlaspi 47
Thymelaea 90
Thymus 128
Tilia 88
Tillaea 50
Tolpis 170
Tordylium 105
Torilis 106
Trachelium 151
Trachynia 202
Tragopogon 172
Tremastelma 149
Tribulus 81
Trifolium 71
Triglochin 178
Trigonella 69
Trinia 105
Triplachne 206
Tripleurospermum 162
Tripodion 77 + 78
Trisetum 205
Tuberaria 94
Tulipa 181
Turgenia 106
Tussilago 162
Typha 213
Tyrimnus 166

Ulmus 7
Umbilicus 50
Urginea 183
Urospermum 170
Urtica 7
Utricularia 139

Vaccaria 27
Valantia 143
Valeriana 147
Valerianella 146
Velezia 30
Ventenata 205
Verbascum 132
Verbena 120
Veronica 136
Viburnum 145
Vicia 64
Vinca 111
Vincetoxicum 111
Viola 92
Viscum 9
Vitex 120
Vitis 88
Vulpia 197

Xanthium 158
Xeranthemum 163

Zannichellia 178
Zantedeschia 212
Ziziphora 127
Zostera 178