

Ophioglossum lusitanicum L. Netåret slangetunge. 1-3 m.m. lancetformede blade sammen på 1-3cm x 2-7mm. 5-10 par sporehuse.

O. vulgatum L. Almindelig slangetunge. Bladene 3-15x2-5cm. 14-40 par sporehuse.

Botrychium lunaria (L.) Sw. Almindelig månerude. Bladet midterstillet; stilken 0-1/4 x pladen. VI-VIII.

B. simplex Hitch. Enkel månerude. Bladet ofte lavtsiddende; stilken 1/3-1 x pladen. VII. NP: Smolikas.

Osmunda regalis L. Kongebregne.

Notholaena marantae (L.) Desv. (Cheilanthes m.) Pelsbregne. 4-35cm. Bladpladen linje-lancetformet, omtrent af den mørkebrune stilks længde, med mørkegrøn og glat overside og lysebrun underside.

Cosentinia vellea (Aiton) Tod. (Notholaena v., Cheilanthes catanensis) Filtet skælbregne. 8-25cm. Stilken gulbrun og tætskællet. Bladet tæt gulskællet på begge sider, linje-lancetformet.

Cheilanthes. Skælbregne. 3-22cm. Små, stivløvede, mørkegrønne, 2-3 x delte bregner i klippesprækker.

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|
| 1. Bladundersiden tydeligt, spredt håret | | persica | |
| " glat | | | 2. |
| 2. Den ombøjede, sporedækkende bladrand frynset (lup) | | acrostica | |
| " " " " ikke frynset | | | 3. |
| 3. Den sporedækkende bladrand bred, 0,5-1mm, m.m. sammenhængende | | | |
| eller med små, nærmest rektangulære lapper | | guanchica | |
| Den sporedækkende bladrand smal, 0,2-0,4mm, med afrundede lapper | | | maderensis |

Cheilanthes maderensis Lowe Bugtet skælbregne. Bladstilken tæt besat med lyst kastanjebrune skæl hele vejen. 1.ordens afsnit trekantet-ægformede, ikke særligt delte.

C. guanchica Bolle Smalfliget skælbregne. Stilkens nedre halvdel tæt besat med sortbrune skæl, øvre halvdel mere glat. Bladene ret smalfligede.

C. acrostica (Balbis) Tod. Frynset skælbregne. Stilken med kastanjerøde skæl i hele sin længde. Bladet 2-3 x delt. Den sporedækkende bladrand 0,4-0,8mm bred. Den almindeligste Cheilanthes-art.

C. persica (Bory) Mett. Håret skælbregne. Af form som foregående, men den ombøjede bladrand med lange, trådformede skæl.

Adiantum capillus-veneris L. Venushår. 10-40cm. Skinnende bladstilk. Bladet 2-3 x delt med oftest helt adskilte, vifteformede afsnit på 1-3cm med let bugtet forrand.

Pteris cretica L. Kantbregne. Stilken indtil 30cm. Bladet op til 40cm med 2-9 linjeformede afsnit på 10-15x1cm, hvoraf de nederste kan være tvedelte ved grunden.

P. vittata L. Kamvingebregne. Stilken op til 10cm, bladet op til 60cm