

- |   |              |
|---|--------------|
| 7. Svøbbladene sortrandede. Bladene ofte gråfildede ..... | 8.           |
| "          med lysebrun rand. Bladene ikke fildede        | 9.           |
| 8. Frugterne hvide, 1,5-2,5mm, pyramidef. firkantede      | cupaniana    |
| "          brune, 2,5-3,5mm, m.m. kegleformede            | ismelia      |
| 9. Svøbbladene med rødbrun, frynset spids .....           | triumfetti   |
| "          "      klar rand                               | maritima     |
| 10. Bladene tykke med kirtelprikket underside .....       | 11.          |
| "          uden kirtelprikket underside                   | 12.          |
| 11. 10-20 randkroner. Kurvstilkens bladløs foroven        | secundiramea |
| Ca. 5 randkroner. Kurvstilkens bladet til spidsen         | urvilleana   |
| 12. Kurvbundens avner butte eller afrundede .....         | 13.          |
| "          "      spidse                                  | 14.          |
| 13. Rørkronerne poser ud over frugten .....               | praecox      |
| "          slanke over frugten                            | chia         |
| 14. Stinkende plante. Kurvbundens avner børsteformede ..  | cotula       |
| Ikke stinkende. Avnerne bredere                           | 15.          |
| 15. Bladene smalle og noget røllikeagtige .....           | mixta        |
| "          bredere  | 16.          |
| 16. M.m. filtet. Frugten med en skæv krone .....          | tomentosa    |
| Håret til dunet. Frugten lige afskåret                    | arvensis     |

Anthemis montana L. ssp. montana Bjærggåseurt. (A. cretica L.)  
10-35cm. Bladene kirtelprikkede og m.m. fildede. Kurvene 2-4cm  
brede. Svøbbladene noget frynsede med brunlig rand. 1200-1900m.  
VI-VIII. Madonie.

A. aetnensis Schouw Vulkangåseurt. 6-25cm. Halvkugleformet og  
tuedannende. Bladene lidt kødede og gråfildede. Svøbbladene med  
lyst brunlig eller næsten klar rand. Lava og vulkansk sand.  
1800-2400m eller endnu højere. V-VIII. Ætnas skrån timer. Alm.

A. cupaniana Tod. (A. punctata Vahl p.p.) Prikbladet gåseurt.  
10-60cm. Kamillelugtende og m.m. kruset hvidfiltet. Ydre avner  
3-tandede. Frugterne med en indtil 1mm bred krave. Beskyggede  
klipper. 500-1800m. IV-VI. Busambra, Madonie, Pizzuta m.m. Sj.

A. ismelia Lojac. 30-60cm. Bladundersiden kirtelprikket. Frugter-  
ne med en indtil 1,5mm bred krave. N-siden af Monte Gallo. IV-VI.

A. maritima L. Strandgåseurt. 12-70cm. Glat til svagt dunet  
dværgbusk. Svøbbladene spidse og lyst hindekantede. Randkro-  
nerne ofte nedadrettede. Sandstrand. V-XI. Lokalt alm.

A. secundiramea Biv. Sortfrugt gåseurt. 10-30cm. M.m. glat.  
Bladstilkens ofte med omfattende flige. Ydre frugter med knudrede  
ribber. Kystnær. IV-VI. 2 underarter:

ssp. secundiramea: Frugtstilkene lange og kølleformede. Kurvene  
ofte små og ensidigt rettede. Sj.

ssp. intermedia (Guss.) Fern.: Frugtstilkene korte, ikke fortyk-  
kede. Større kurve. N- og Ø-kysten samt nærliggende øer.

A. urvilleana (DC.) Somm. & Car.-G. Femtung gåseurt. 1-20cm.  
Som foregående, men vellugtende. Frugtstilkene ikke fortykkede.  
Især på kystklipper. IV-V. Pantelleria, Maltesiske Øer. Alm.

A. muricata (DC.) Guss. Knopgåseurt. 2-15cm. Som de 2 foregåen-  
de, men stinkende. Brodspidsede bladflige. Fortykkede kurvstilke.  
Indre svøbblade lyst hindekantede. IV-V. Caltanissetta, Delia og  
Caltagirone. Sj.

A. asperula Bertol. Lav gåseurt. 2-4cm. Meget lav, oftest låd-  
den. Ingen stængelomfattende bladflige. Fortykkede og tit krum-  
me frugtstilke. V-VII. S-Sic.: Vittorio, Comiso, Villarosa. Sj.

A. tomentosa L. Filtet gåseurt. 2-30cm. Sandet jord nær kysten.  
V-VI. Messinese. Sj. M

A. arvensis L. Agergåseurt. IV-VI. Alm. 2 underarter: