

2. Stængelbladene helrandede saligna
 " tandede eller lappede 3.
 3. Bladene bløde. Toppen halvskærmformet sativa
 " finttornede. Toppen kegleformet 4.
 4. Bladene ofte lodretstillede. Frugten grålig, finttornet
 foroven serriola
 Bladene oftest vandretstillede. Frugten purpursort, glat virosa

Lactuca viminea (L.) Presl Rissalat. Stænglen benhvid. Bladene blågrønne, de nedre smalfligede, de øvre ofte helrandede og linjeformede. Kuryene siddende på lange, udelte grene. VI-VIII. Sj.

L. serriola L. Tornet salat. VII-IX. Alm. M

L. sativa L. Havesalat. V-VIII. Forvildet.

L. saligna L. Pilsalat. 30-100cm. Stænglen benhvid. Nedre blade hele til fjerfligede, øvre aflange til linjeformede med pilformet grund. Blomsterne ofte purpuranløbne. V-VIII. Alm. M

L. virosa L. Giftsalat. 30-150cm. VI-IX. Sj. M

Mycelis muralis (L.) Dumport. Skovsalat. VII-VIII. Sj.

Reichardia picroides (L.) Roth Haresalat. 10-45cm. Glat flerårig med noget grenet stængel. Stængelbladene omfattende. 1-5 kurve med mange små, hindekantede skælblade. Ydre svøbblade ægformede med en 1/2 mm bred hindekant. I-XII. Alm. M

R. tingitana (L.) Roth Sandharesalat. 20-30cm. Som picroides, men svøbbladene bredere hindekantede. Kronerne med purpurfarvet grund. Kystnære steder. IV-VI. Linosa og Lampedusa. M.sj.

Aetheorrhiza bulbosa (L.) Cass. Knoldhøgeskæg. 8-30cm. Flerårig med underjordiske rodknolde. Bladene linje-spatelformede i roset, 0-2 stængelblade. Ofte kun 1 kurv med sortagtige, kølleformede kirtelhår ved grunden og på den øvre stilk. III-VI. Alm. M

Crepis. Høgeskæg.

1. Planten stængelløs pusilla
 " med stængel 2.
 2. Ydre svøbblade oppustede vesicaria
 " " ikke oppustede 3.
 3. Kurvsvøbbladene filtede 4.
 " uden filt 6.
 4. Kronerne med grønlig yderside bursifolia
 " uden " " 5.
 5. Stængelbladene små, ikke omfattende spathulata
 " med øret grund hyemalis
 6. Svøbbladene tatkirtlede foetida
 " ukirtlede 7.
 7. Stænglen m.m. glat, fågrenet foroven leontodontoides
 " stivhåret, rigtgrenet corymbosa

Crepis leontodontoides All. Løvetandshøgeskæg. 10-40cm. 2-flerårig. Næsten glat. Bladene lange, høvlformet tandede eller fligede. Kurvsvøbet 7-8mm. Skov og krat. 0-1800m. IV-X. Alm.

C. foetida L. Stinkende høgeskæg. 10-50cm. Bladene fligede med uregelmæssigt tandede flige. Kurvene 10-12mm, noget valseformede. Ydre frugter uden, indre med næb. VI-X. Alm.

C. pusilla (Sommer) Merxm. Dværghøgeskæg. 2-8cm. Bladene 2-7cm x 2-5mm, i roset, helrandede til høvlfligede. 2-8 kurve på 3-4mm siddende midt i rosetten. III-IV. Malta. Sj.

C. corymbosa Ten. Hindebægerhøgeskæg. 10-40cm. Enårig. Grundbladene op til 17x2cm. Stænglen grenet fra grunden. Kurvene 3-7mm, oftest tætbørstede. IV-VI. Sj.