

Crepis spathulata Guss. Spatelhøgeskæg. 15-30cm. Grundbladene linje-spatelformede, svagt bugtet-tandede. Stængelbladene linje- eller skælformede. 1-4 kurve på 12-13mm med blomster på 15-17mm. XI-V. V-Sicilien. Sj. Måske uddød?

C. vesicaria L. Opblæst høgeskæg. 10-80cm. Stærkt delte blade. Ydre svøbblade ofte bredt hindkantede. Kurvstilkene med opblæste støtteblade, der ligner de ydre svøbblade. I-XII. Alm.

C. hyemalis (Biv.) Ces.& al. Vinterhøgeskæg. Kurvsvøbbladene med en række sorte hår. Kronerne gule eller lyserøde. Kurvene nikken- de før blomstringen. XI-IV.

C. bursifolia L. Hvidtandet høgeskæg. 5-35cm. M.m. dunet flerår- ig med mange liggende eller buetformet opstigende stængler. Frug- ten med et ca. dobbelt så langt næb. IV-IX. Alm.

Hieracium. Høgeurt.

- | | | |
|--|-------|-----------------------|
| 1. Bladene m.m. spatelformede. Frugten med en knudret ring | ... | 2. |
| " bredere. Frugten med en jævn ring foroven | | 3. |
| 2. Stænglen med 3-50 kurve | | <u>piloselloides</u> |
| Kurvene enlige | | <u>hoppeanum</u> |
| 3. 0-1 stængelblade. Med bladrosen | | 4. |
| Mange stængelblade, der undertiden kan danne en falsk | | 5. |
| rosen lidt over grunden | | |
| 4. Bladene med 2-10mm lange hår på rand og midterribbe | | <u>pallidum</u> |
| " uden sådanne lange hår | | <u>silvaticum</u> |
| 5. Bladene skinnende læderagtige og glatte | | <u>lucidum</u> |
| " hårede | | 6. |
| 6. Bladene ikke egentligt stilkede, blot tilsmalnedede | .. | <u>crinitum</u> |
| Med 3-5 tydeligt stilkede blade | | <u>symphytifolium</u> |

Hieracium hoppeanum Schultes Butskællet høgeurt. 20-35cm. Korte eller manglende udløbere. Bladundersiden tæt hvidt stjernefiltet. Kurven 9-13mm. 500-1900m. V-VIII. Madonie. Sj.

H. piloselloides Vill. Tungehøgeurt. 20-70cm. Oftest uden udlø- bere. Grundbladene smalle, noget blågrønne og ofte rødligt anløb- ne, med 3-5mm lange børster. Kurvsvøbet 5-7mm. V-VIII. Alm.

H. silvaticum (L.) L. Skovhøgeurt. (H. murorum) V-VIII. Sj.

H. pallidum Biv. Bleg høgeurt (H. schmidtii). 10-40cm. Ligner en lille Skovhøgeurt. Bladstilken langhåret. Kurvsvøb og kurvstilke uden kirtelhår. V-VII. Sj.

H. lucidum Guss. Skinnende høgeurt. 10-30cm. Med 12-20 blade, de nedre tætstillede og store, de øvre meget mindre. Kurvsvøbet 12- 15mm, bleggrønt og kirtelhåret. Kalkklipper. 0-600m. V-Sic.: M. Gallo (X-XI) og M.Cofano (V-VI). M.sj.

H. symphytifolium Froelich Hvidfiltet. Kurvsvøbet 10-12mm. Mel- lemform mellem lucidum og crinitum. Kalkklipper. 1000-1600m. Ma- donie. M.sj.

H. crinitum Sibth.& Sm. (H. racemosum p.p.) 30-60cm. Nedre blade lancetformede til smalt elliptiske, 10-20x3-5cm; øvre blade brat mindre, 1-4cm. Kurvsvøbet 8-9mm, med mørkegrønne, stivhårede el- ler m.m. kirtelhårede skæl. VIII-X. Alm.

ALISMATACEAE

Alisma plantago-aquatica L. Vejbredskeblad. V-VII. Alm. M

A. lanceolatum With. Lancetskeblad. 20-40cm. Bladene lancetfor- mede, indtil 1,5cm brede, med kileformet grund. V-VII. Sj. M