

Tanacetum achilleifolium (Bieb.) Sch.Bip. Røllikebladet rejnfan. 10-40 cm. Bladene 2 x delte; grundbladene 10-12cm, linjeformede, alle grågrønt dunede. 2-15 kurve. Randkronerne 1-2mm. U K

● T. paczoskii (Zefirov) Tzvelev Kuglerejnfan. Nær foregående, men blade-
ne m.m. glatte. K

T. millefolium (L.) Tzvelev Kortkronet rejnfan. 20-50cm. Forveddet for-
neden. Bladene 2 x delte, dunede som unge, siden ofte halvglatte. 2-10
(15) kurve i uregelmæssig halvskærm. Randkronerne 1,8-3mm. U K
(T. odessanum (Klokov) Tzvelev har kortere kurvstilke og større kurve.)

T. parthenium L. Matrem. (U K)

T. corymbosum (L.) Sch.Bip. Lundokseøje. 40-80cm. Bladene nærmest rejn-
fansagtige, med aflange, takkede til snitdelte afsnit. Mest 3-10 kurve.
Randkronerne 10-16mm. U K. 2 underarter:

ssp. corymbosum: Bladoversiden mat. Svøbbbladernes rand lysebrun. U K

ssp. clusii (Fischer) Heyw.: Bladoversiden skinnende. Svøbbbladernes rand
sortbrun. Randkronerne 15-20mm (10-15mm hos cor.). U (Karpaterne)

T. partheniifolium (Willd.) Sch.Bip. Storblomstret matrem. Nær Matrem,
men bladafsnittene aflangt-elliptiske til ægformede, indskåret-tandede.K

T. macrophyllum (W. & K.) Sch.Bip. Storbladet okseøje. 40-100cm. Bladene
glatte ovenpå, tæthårede nedenunder, med 3-5 par lancetformede, indskå-
ret tandede flige. 5-6 randkroner på 2-4mm. (U)

T. cinerariifolium (Trev.) Sch.Bip. Sølvokseøje. 15-45cm. Tueformet,
sølvgråt silkehåret flerårig. Bladene kirtelprykkede, de nedre 10-20cm,
2 x delte med 2-3mm brede flige. Kurven 4-5cm bred, langstilket. (U K)

Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev Sumpokseøje. 30-150cm. Bladene
siddende, smalt rudeformede, savtakkede, med 2-4 småflige ved grunden.
Randkronerne 10-25mm, hvide eller rødlige. U

Balsamita major Desf. Balsam. 30-120cm. Matgrøn, tæthåret flerårig.
Bladene aflange, tandede, stærkt kirtelprykkede, læderagtige. 30-100,
5-8mm brede kurve (uden randkroner) eller 10-16mm brede med hvide rand-
kroner; disse 4-6mm. (U)

Leucanthemopsis alpina (L.) Heyw. Alpeokseøje. 5-15cm. Stænglen kun med
få, helrandede småblade. Nedre blade 1 x delte. Kurvene enlige, 2-4cm
brede med sortbrunt randede svøbbblade. U (Karpaterne)

Leucanthemum. Okseøje.

- | | |
|---|-------------|
| 1. Bladene i øvre stængelhalvdel spidse og regelmæssigt finttandede | 2. |
| " " | 3. |
| 2. Mest ugrenet. Kurven 6-9cm bred. Grundbladene ikke runde .. maximum | |
| " grenet. Kurvene mindre. Grundbladene runde | waldsteinii |
| 3. Mellemste stængelblade i nedre 1/3 med tænder, der er meget | |
| kortere end midterstykkets halve bredde | ircutianum |
| Mellemste stængelblade i nedre 1/3 med tænder, der er mindst | |
| så brede som midterstykkets halve bredde | 4. |