

oftest med 3 blomster. Inderavnen med kløven spids. 0-900m. VIII-XI.

Arundo plinii Turra (A. pliniana) Strandrør. 1-2m. Strået 3-7mm tykt. Bladene 1(2)cm brede. Småaksene ikke over 10mm, med 1-2 blomster. Inderavnen ikke kløven. 0-600m. VII-X.

Phragmites australis (Cav.) Trin. Tagrør. 0-1200m. VI-X.

Cortaderia selloana (Sch.& Sch.f.) Asch.& Gr. Pampasgræs. -3m. Bladene 1-3m, blågrønne, hårde, med skærende kant. Toppen 50-100 cm, hvidladden. Småaksene ca. 15mm, sølvhvide. 0-600m. VI-VII.

Schismus arabicus Nees Stor kløftavne. 10-24cm. Bladene indrullede, ofte langt hvidhårede ved oversidens grund. Enårig. Småaksene 5-7mm. Yderavnerne bredt hindekantede. Nedre inderavne 1/3-1/4 kløvet, ofte med kort stak i spidsen. III-V.

Molinia caerulea (L.) Moench Blåtop. 0-2000m. VII-IX.

Nardus stricta L. Kattesæg. 1700-2600m. VI-VII. TA,KY,KH.

Lygeum spartum L. Espartogræs. 20-30cm. Jordstænglen og strågrunden med læderagtige skæl. Bladene 1½mm tykke, indrullede og stive. Blomstersvøbet 3-4cm, æg-lancetformet og spidst. Småakset med 2 blomster med langhåret grund. 0-300m. III-V. Lerskrænter.

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. Kattefodsgræs. 10-25cm. Lange, nedliggende stængler med stive, udstående, ret korte blade. Dusken en tosidet klase af m.m. siddende aks med toradet stillede småaks, 2½-5cm lang, smalt ægformet og lappet. VI-VIII. Om.

Eragrostis curvula (Schr.) Nees Tueformet og tæppedannende. Bladene indtil 1m, buehængende. Strået 50-120cm. Toppen 15-30cm og grågrøn. Småaksene 5-12mm, med 7-12 blomster. VI-VIII. Forv.

Sporobolus pungens (Schreber) Kunth Stikkende ribbensgræs. 20-50 cm. Jordstænglen langt krybende i sandet. Golde skud med faste, indrullede, toradede blade. Toppen grålilla, stærktgrenet, tæt og sammentrængt. Klitter. VII-VIII.

Crypsis aculeata (L.) Aiton Hovedsumpaks. 3-15cm. Enårig med m.m. oppustede skeder og blågrønne blade. Dusken pudeformet, bredere end lang, 1½cm bred, med et svøb af 2(4) udstående, stive blade med en noget tornagtig spids. Klitlavninger. VII-IX.

C. schoenoides (L.) Lam. Ægformet sumpaks. 5-25cm. Som foregående, men dusken 2-4 x så lang som bred, ægformet og meget tæt. Fugtige steder, især nær kysten. 0-300m. VII-X.

Eleusine indica (L.) Gaertner Enårig fingerrap. 15-85cm. Enårig med ofte hårede blade med bred bruskrand. 2-5 linjeformede aks. Småaksene rapgræsagtige, toradede, med 3-6 stakløse blomster. 0-500m. VII-XI. Indslæbt.

Cynodon dactylon (L.) Pers. Hundetandsgræs. 10-40cm. Ligner Digitaria, Fingeraks, men let kendelig ved sine blågrønne, toradede blade. Småaksene 1-blomstrede, med lancetformede yder- og bådformede inderavner. 0-800m. VI-IX.

Panicum repens L. Krybehirse. 15-60cm. Flerårig med lange, ofte overjordiske udløbere. Bladene næsten regelmæssigt toradede. Toppen tæt med m.m. oprette grene. Glatte yderavner. 0-100m. VI-X.

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Hanespore. 25-100cm. VI-X.

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Blodhirse. 20-50cm. Øvre yderavne 1/3-1/2 x småakset. Bladene mest tvesidet hårede. VI-XI.

D. ciliaris (Retz.) Koeler Randhåret fingeraks. 20-50cm. Øvre yderavne 2/3-3/4 x småakset. Den golve nedre inderavne med jævne ribber (ru hos sang.). Bladene mest fåhårede inderst. VIII-X.

Paspalum dilatatum Poiret Savaks. 30-80(-150)cm. Tættuet flerå-