

Panicum miliaceum L. Alm. hirse. Enårig. VII-VIII. Sj. forv.

P. repens L. Krybehirse. Flerårig med lange, ofte overjordiske udløbere. Bladene næsten regelmæssigt toradede. Toppen tæt med m.m. oprette grene. Yderavnerne glatte. Fugtigt sand. VI-X. Sj. M

P. compressum Biv. 30-60 mm. Tueformet flerårig. Strået sammentrykt. Toppen m.m. opret. Yderavnerne hårede på rand og ripper. Kalkklipper. X-I. Fra Palermitano til Messina. Sj.

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Hanespore. 25-100 cm. De længste aks 2-10 cm. Småaksene 3-4 mm, ofeste med stak. VI-X. Alm. M

E. colunum (L.) Link Spinkel hanespore. 10-70cm. Aksene sjældent over 3 cm. Småaksene 1½ - 3 mm, uden stak. VII-IX. Sj. M

Brachiaria erucaeformis (S. & S.) Griseb. Røvehalehanespore. 30-60cm. Enårig. Blomsterstanden dannet af 2-10 lodrette, tiltrykte klaser på 1/2 - 2 1/2 cm. Småaksene uden stak. Yderavnerne hårede. VIII-X. Sj.

Digitaria sanguinalis (L.) Blodhirse. 20-50cm. Blade og bladskeder stivhårede. OFtest 4-7 aks sammen. Småaksene lilla, 2-blomstrede. VI-XI. M. alm. M

Paspalum dilatatum Poiret Savaks. 30-80(-150)cm. Tættuet flerårig. Bladene næsten glatte, 3-10mm brede. 3-6 spredtstilkede aks på 4-11cm. Småaksene 3-3½ mm, gulgrønne, 2-blomstrede, uden stak. VII-IX. Forv. på Malta.

P. paspalodes (Michx) Scribner Tvillingaks. 10-50cm. Flerårig med udløbere. Blade og skeder ofte randhårede. 2 ret oprette aks sammen på 2-7cm med en smal, affaldet akse. Småaksene gulgrønne, stakløse. Fugtige steder. VII-IX. Alm.

Stenataphrum secundatum (Walter) Kuntze Kvellergræs. 5-30cm. Med lange, rodslående udløbere. Stråene liggende eller opstigende. Blade 5-9mm brede. Spredte eller delvist knippestillede, leddede aks, bleggrønne. VII-IX. Stranden ved Catania. Forv.

Setaria. Skærmaks.

1. Yderavner ret ens, ½ - 2/3 af den tværrynkede inderavne. *glauca*
- " uens, ½ og 1 x den meget svagt rynkede inderavne. 2.
2. Dusken m.m. lappet forneden, 2-3 cm bred. *italica*
- " cylindrisk, under 1 cm bred. 3.
3. Børsterne med nedadvendte småtorne. *verticillata*
- " " opadvendte *viridis*

Setaria glauca (L.) Beauv. Blågrønt skærmaks. 20-60cm. Bladene noget blågrønne. Dusken tæt, ikke mellembudt. VII-X. Alm. M

S. viridis (L.) Beauv. Grønt skærmaks. VI-X. Alm. M

S. verticillata (L.) Beauv. Kransskærmaks. 30-80cm. Dusken mellembudt forneden og med uregelmæssigt kransstillede grene. Børsterne kraftigt ihængende, ikke eller svagt røde. V-X. Alm. M

S. italica (L.) Beauv. Kolbehirse. VII-VIII. Forv. M

Pennisetum setaceum (Forsskål) Chiov. Smalt dungræs. 20-100cm tættueformet flerårig. Bladene indrullede. Dusken 10-30cm. smal, m.m. brunlilla af børsteknipper på 1,5-4 cm. V-VI. Palermo, Termini Im., Catania. Sj.

P. ciliare (L.) Link (Cenchrus c.) Randhåret dungræs. 25-60cm. Tættuet, ofte bestanddannende. Bladene flade, 2-6mm brede. Dusken 5-10cm. 2-3 småaks sammen, omgivne af et svøb af hvide børste på 8-15mm. V-X. Palermit., Taormina, Æoliske Øer.

Tricholaena tenerifae (L.f.) Link Hårhvene. 20-50cm. Tættuet flerårig. Hårformet skedehinde. Toppen 4-10cm, smalt ægformet. Småaksene 2-blomstrede, lilla, 2½-3½mm med 4-7 mm lange, hvide hår.