

støtteblade under sig. Ydre svøbblade mindst $\frac{1}{2}$ x de indre.

Inula methanea Hausskn. 15-30cm. Kurvene ca. 7mm, med 0-2 små og smalle støtteblade under sig. Randkronerne kortere end kurvsvøbet.

I. conyza DC. Trekløftalant. 50-120cm. Toårig. Kurvene i en top, cylindriske, ca. 1cm brede, med udpræget taglagt og ofte rødspidset svøb. Randkronerne kortere end svøbet. 0-1350m. VII-IX.

I. crithmoides L. Strandalant. 40-70cm. Glat halvbusk. Bladene 2-4 $\frac{1}{2}$ cm x 2-4mm, helrandede eller med tretandet spids. Kurvstilkene med mange, skælformede højblade. Strandplante. VII-XI.

I. viscosa (L.) Aiton Klæbrig alant. 40-130cm. Stænglerne oprette, forveddede nederst, stivhårede foroven. Bladene lancetformede, 3-7cm, spidstandede og ru. Oprette svøbblade. VIII-X.

I. graveolens (L.) Desf. Tægealant. 20-50cm. Kamferlugtende, stærktgrenet, mangelkurvet enårig. Bladene linjeformede, de nedre lancetformede, m.m. helrandede. Kurvsvøbet 4-7mm. 0-800m. VIII-X.

Pulicaria. Loppeurt.

- | | |
|---|-------------|
| 1. Flerårig. Randkronerne iøjnefaldende | 2. |
| Enårig. Randkronerne næppe meget længere end kurvsvøbet | 3. |
| 2. Med blivende bladrosen. 1-få kurve | odora |
| Ingen " " . Mange kurve | dysenterica |
| 3. Bladene linjeformede, 2-3mm brede | sicula |
| " lancetformede, bredere | vulgaris |

Pulicaria sicula (L.) Moris Smalbladet loppeurt. 20-45cm. Bladene spidse, ofte med omrullet rand, stive, ikke bølgede. Kurvstilkede fortykkede i frugt. 0-800m. VII-X.

P. vulgaris Gaertner Alm. loppeurt. 7-30cm. Stinkende og krushåret. Bladene lancetformede til elliptiske, bløde og ofte bølgede. Kurvstilkene korte, ofte bladede. 0-800m. VIII-IX.

P. dysenterica (L.) Bernh. Strandloppeurt. 30-70cm. Forekommer her sydpå i en form med mindre kurve end her i lancet. VII-X.

P. odora (L.) Rchb. Knoldloppeurt. 30-90cm. Rosetbladene æglancetformede. Nedre stengelblade ørede, gråladne nedenunder. Kurvene 2-3cm brede og halvkugleformede. 0-1000m. VI-VII.

Pallenis spinosa (L.) Cass. Tornet stjærnesvøb. 30-60cm. 1-2-årig. Grenene rager op over stænglen. Bladene spatel- til lancetformede, brodspidsede, ydre svøbblade ligeledes. V-VIII.

Asteriscus aquaticus (L.) Less. Vandstjærnesvøb. 10-40cm. Opret enårig. Halvskærmformet gaffelgrenet i øvre halvdel. Ydre svøbblade bladagtigt forlængede, længere end de citrongule randkroner. Fugtig eller sandet jord. 0-800m. IV-VII.

Bidens pilosa L. Håret brøndsel. 30-100cm. Med 3(5) savtakkede, lancet- til ægformede småblade. Ingen randkroner. Ydre svøbblade grønlig. 2-3 børster på frugten. 0-300m. VII-X. Indslæbt.

Flaveria bidentis (L.) Ktze. -1m. Bladene 3-strengede. Små, 5-6-blomstrede hoveder, samlede i større grupper for enden af grenene. Hver kurv med 2-4 svøbblade. 0-200m. VII-X. Indslæbt.

Helianthus annuus L. Solsikke. VII-X. Dyrket og forvildet.

Xanthium spinosum L. Tornet brodfrø. 20-80cm. Liggende til opstigende, ofte dunet enårig. Gule, fra grunden 3-kløvede torne i bladhjørnerne. Bladene 3-5-kløvede, hen ad Hjertespanns, mørkegrønne ovenpå, hvid-gråfildede nedenunder. 0-500m. VIII-IX.

X. strumarium L. Skræppebrodfrø. 30-120cm. Bladene bredt trekantede og håndstrengede, 8-12x7-12cm. Frugten 1 $\frac{1}{2}$ -3 $\frac{1}{2}$ cm, med pigge og 2 større torne i spidsen. 0-800m. VII-X.

ssp. cavanillesii (Schouw) Löve & Dans. har en frugt med meget