

6. Årsskuddene brunlilla og blåduggede *ulmifolius*
 " ikke brunlilla, ikke blåduggede 7.
7. Årsskuddene 4-5mm tykke midtpå, med (6)8-14 torne pr. 5cm *castellarnau*
 Årsskuddene 6-10(15)mm tykke midtpå, med 5-9(12) torne pr. 5cm 8.
8. Årsskuddene med 7-10 hår pr. cm *praecox*
 " " 0-3 " " " *vigoi*
9. Årsskuddenes torne uensartede *brigantinus*
 " " ret ensartede (der kan dog godt være kirtel-
 børster) 10.
10. Bladundersiden ikke filtet, uden stjernehaar *castroviejoi*
 " filtet, med stjernehaar 11.
11. Årsskuddene midtpå med over 25 torne pr. 5cm *vagabundus*
 " " " under 22 " " " 12.
12. Bladene mest med 3 småblade 13.
 " " " 5 " 14.
13. Årsskuddet kantet eller furet, ikke blådugget *henriquesii*
 " trindt eller trindt-kantet, med blåduggede pletter *peratticus*
14. Bladoversiden m.m. glat (0-5 hår/cm²). Savtandingen indtil
 2mm dyb *radula*
 Bladoversiden håret (over 10 hår/cm²). Savtandingen
 (1,5)2-5mm dyb 15.
15. Årsskuddenes hår mindst 2 x stilkkirtlerne. Hvid krone *pauanus*
 " " højst lig stilkkirtlerne. Blegrød krone *galloecicus*

Rubus idaeus L. Hindbær. Av Cu Gu M Sg Za

R. ulmifolius Schott Ælmebrombær. Ab Av Ba Cc CR Cu Gu M Sa Sg To Va Za

R. praecox Bertol. Gu Sg

R. vigoi Roselló & al. Av Cc Gu Sa Sg Za

R. castellarnau Pau Av Cc Gu M Sa Sg

R. canescens DC. Kilebrombær. Endesmåbladet smalt rudeformet. Cu Gu Sa
 Za

R. radula Weihe Raspebrombær. Av Cc Gu Sa Sg Za

R. galloecicus Pau Sa Sg

R. vagabundus Samp. Av Gu Sa Za

R. henriquesii Samp. Cc Sa

R. peratticus Samp. Gu

R. pauanus M.-Huelin Cu

R. castroviejoi M.-Huelin Cc Sa Za

C. brigantinus Samp. Gu (los Condemios)

C. lainzii Weber (*C. corylifolius* p.p.) Småarten har liggende, mest kantede skud med 0-få hår, lidt korte kirtelbørster og torne på 3-5mm. Mid-