

COTONEASTER BLADSKUDSNØGLE

Omfatter arterne fra Den nye Nordiske Flora, fra Lids Norske Flora samt nogle arter fundne af mig i Danmark

Uddybende beskrivelser kan findes i Stace: New Flora of the British Isles og i

Fryer og Hylmø: The Cotoneasters, der beskriver alle kendte arter af slægten.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Bladene mest under 3 cm | 2. |
| " " over 3 cm | 16. |
| 2. Bladundersiden tæthåret | 3. |
| " spredt håret til glat | 4. |
| 3. Udstrakt og krybende. Bladene 12-20 mm, elliptiske til omvendt ægformede | radicans |
| Oprette, toradede grene. Bladene 21-26 mm, ægformede | dielsianus |
| 4. Bladoversiden mat. Bladene bølgede | 5. |
| " skinnende | 6. |
| 5. Bladene 12-25mm, næsten kredsrunder | nanshan |
| " 8-15mm, mest elliptiske | adpressus |
| 6. Krybende, tæppedannende, rodslående buske | 7. |
| Ikke krybende | 8. |
| 7. Bladene 15-40mm, oversiden rynket, stilken 2-9mm | dammeri |
| " 10-23mm, " jævn, stilken 1-3mm | x suecicus |
| 8. Bladene bredt afrundede (udrandede, afskårne) fortil, evt. med brod i spidsen | 9. |
| Bladene spidse | 12. |
| 9. Bladene elliptiske. Grenene ofte udstrakte | microphyllus |
| " rundagtige | 10. |
| 10. Bladene 13-25mm. Grenene mest toradede | hjelmqvistii |
| " 7-14mm | 11. |
| 11. Bladranden lidt bølget; stilken gulligt lådden | atropurpureus |
| Bladene flade; stilken kort, tiltrykt håret | microphyllus |
| 12. Grenene udstående eller skruestillede | 13. |
| " stærkt toradede | 14. |
| 13. Bladet tydeligt udtrukket tilspidset, oversiden fåhåret. | |
| Grenene gråbrune | simonsii |
| Bladet spidst eller lidt tilspidset, oversiden snart glat. Grenene brunlilla | divaricatus |
| 14. Bladene 14-23mm, med bølget rand | ascendens |
| " 5-12mm, flade | 15. |
| 15. Bladene indtil 12mm. Blomstrende grene 8-20mm | horizontalis |
| " " 8(10)mm. Blomstrende grene 5-8mm | perpusillus |
| 16. Bladoversiden stærkt til noget skinnende | 17. |
| " mat | 25. |
| 17. Bladene lancetformede, ca. 3 x så lange som brede, 4-9cm, med omrullet rand og grågrønt filtet underside | salicifolius |
| Bladene bredere, ikke omrullede | 18. |
| 18. Bladene tydeligt bukledede mellem ribberne | 19. |
| " ej bukledede. Sorte bær | 21. |
| 19. Bladene 7-15(21)cm, undersiden spredt håret, oversiden mellemgrøn | rehderi |
| Bladundersiden lådden, oversiden mørkegrøn | 20. |
| 20. Bladene 5,5-7cm. Bærrene røde | bullatus |
| " 6,5-12cm. " sorte | moupinensis |
| 21. Bladene 8-11 cm | hummelii |
| " 3-6,5cm | 22. |
| 22. Udstrakt, krybende busk. Bladene ofte afrundede fortil | dammeri |
| Oprette buske | 23. |
| 23. Bladene friskgrønne | laetevirens |
| " mørkegrønne | 24. |
| 24. Bladene stærkt skinnende med 3-5 ribbepar | lucidus |
| " lidt " " 5-8 " | villosulus |

25. Bladundersiden snart fåhåret til glat	26.
" " filtet	27.
26. Bladoversiden mørkegrøn	calocarpus
" " lysegrøn	przewalskii
27. Bladoversiden hurtigt glat	28.
" " blivende håret	30.
28. Bladoversiden mørkegrøn	monopyrenus
" " grågrøn til mellemgrøn	29.
29. Bladstilken 2-4mm. Bladranden flad	scandinavicus
" " 3-8mm. " bølget	integerrimus
30. Ældre kviste skinnende	niger
" " matte	31.
31. Kvistene grønligbrune til mørkt rødbrune. Kronbladene	tomentosus
oprette	
Kvistene lysebrune til rødligbrune. Kronbladene udbredte	tomentellus

PHILADELPHUS

Nøgle efter Rehder: Manual of cultivated trees and shrubs.

1. Blomsterne 1-3 sammen	2.
" " i klaser	3.
2. Bæger og blomsterstilk glatte	inodorus
" " " dunede	floridus
3. Bægeret dunet udvendigt	4.
" " glat	6.
4. Barken lysegrå, ikke afskallende	pubescens
" " m.m. brunlig	5.
5. Griflen < støvdragerne	virginalis
" " = "	magnificus
6. Bladundersiden ikke håret i ribbehjørnerne	lemoinei
" " med hårduske i "	7.
7. Griflen < støvdragerne. Blomsten vellugtende	coronarius
" " " " lugtløs	lewisii