

549.

brunrød midtpå, ellers brun, kort fløjlsåret, 11,5-17,5 mm lang og 15-3 mm bred (udbredt), uden knuder. Al (S)

Ophrys incubacea Bianca (O. atrata) Langstribet flueblomst. 20-40 cm. Læben mørkt kastanjebrun til sortbrun med indtil 3,5 mm høje knuder. Mærket H-formet og gråblåt, ofte med sidestriber langs knuderne. Al Ju

O. mammosa Desf. Vorteflueblomst. 20-60 cm. Indre blosterblade ofte krusede. Læben brun til sortebrun, ofte med noget rudeformet omrids. Mærket H-formet og blågråt. Al Ju

O. bertolonii Moretti Saddelflueblomst. 10-35 cm. Blosterbladene mest lyserøde. Læben sortbrun med bredt lådden rand og et ofte lavtsiddende, mørkeblåt mærke. Ju (Istrien til Montenegro)

Corallorhiza trifida Chatel. Korallod. Al Ju

Liparis loeselii (L.) Richard Mygblomst. Ju

Malaxis monophyllos (L.) Lindley Etbladet hjærtelæbe. 10-30cm. Stängelgrunden løgagtig, herfra udgår det oftest enlige, ægformede eller elliptiske blad. 20-100 blomster i en åben klase. Blomsterne 2-2,75 mm, grønne. Ju

Hammarbya paludosa (L.) Kuntze Hjærtelæbe. Ju