

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 2. Stængelbladene m.m. linjeformede, fåtandede .....   | 3.                      |
| " " aflangt-lancetformede til elliptiske, mangetandede   | 4.                      |
| 3. Ydre svøbblade mørkegrønne med mørk hindekant .....   | <i>lithopolitanicum</i> |
| Kurvsvøbbladene bleggrønne med bleg hindekant  | <i>chloroticum</i>      |
| 4. Skivekronernes frugter med en krone øverst .....  | 5.                      |
| " " uden krone   | 6.                      |
| 5. Ydre kurvsvøbblade bleggrønne med smal (0,1-0,2mm) rand   | <i>platylepis</i>       |
| " " mørkegrønne med bredere rand   | <i>halleri</i>          |
| 6. Mellemste stængelblades grund med tænder, der er længere end brede  | 7.                      |
| " " " " " " kortere " "  | 9.                      |
| 7. Mellemste stængelblade i nedre 1/3 med tænder, der er meget kortere end midterstykkets halve bredde .....           | <i>ircutianum</i>       |
| Mellemste stængelblade i nedre 1/3 med tænder, der er mindst så lange som midterstykkets halve bredde                  | 8.                      |
| 8. Kurvsvøbbladene med mørke- til sortbrun rand .....  | <i>gaudinii</i>         |
| " " lysebrun rand  | <i>vulgare</i>          |
| 9. Grundbladene væk under blomstringen. Nederste stængelblade lancetformede, langstilkede, korttandede. 30-80cm høj .. | <i>heterophyllum</i>    |
| Grundbladene mest til stede under blomstringen. Anderledes   | 10.                     |
| 10. Kurvsvøbbladene med mørkebrun eller sort rand .....  | <i>adustum</i>          |
| " " lys rand   | <i>pallens</i>          |

*Leucanthemum vulgare* Lam. Hvidt okseøje. 30-70cm. Stænglen ofte grenet, med flere kurve. Mellemste blade ca. 5 x så lange som brede, tydeligt smallere mod grunden, med øreformet stængelomfattende afsnit.

*L. gaudinii* Dalla Torre (*L. alpicolum*) 20-30cm. Stænglen mest ugrenet med 1 kurv. Mellemste blade mindst 6 x så lange som brede, smallere mod grunden; nederste afsnit lidet øreagtige. 1400-2500m.

*L. ircutianum* (Turcz.) DC. 30-70cm. Stænglen mest grenet med flere kurve. Mellemste blade ca. 4 x så lange som brede, lidet smallere mod grunden; nederste afsnit ikke eller udstående øreformede.

*L. heterophyllum* (Willd.) DC. Forskelligbladet okseøje. 30-80cm. Stængelbladene jævnt, regelmæssigt savtakke. Kurvene 5-7cm brede; kurvsvøbet mest sortrandet. 1000-2200m.

*L. adustum* (Koch) Greml. 30-50cm. Stænglen ugrenet, m.m. bladløs foroven. Tykke og læderagtige blade; de nedre med omvendt ægformet plade.

*L. pallens* (Gay) DC. 40-80cm. Mange, ofte grenede stængler. Grundbladene ofte væk under blomstringen.

*L. halleri* (Suter) Ducomm. 10-20cm. Stænglen ugrenet. Stængelbladene småtykke, mørkegrønne, de øvre kun lidt mindre end de nedre, med 3-7 par ofte noget langt udstående tænder. Ju

● *L. platylepis* Borbas 10-50cm. Grundbladene med afskåret til afrundet spids, takkede til lappede. Stængelbladene aflangt-lancetformede, takkede til lappede. Ju (V + M)

*L. lithopolitanicum* (E.Mayer) Polatschek 10-20cm. Grundbladene linjekileformede med 3(5) tænder fortil. Stængelbladene 2mm brede uden takker. Ju (Kamniske Alpe i Nordslovenien)