SPIRAEA

Medtager arterne fra Nordens Flora, Lid, Stace og Flora Gallica. Nøglen er hovedsageligt udarbejdet ud fra Gehölzflora fra 2007, der medtager 56 arter og krydsninger.

1. Blomsterstanden med ugrenede stilke, endestillet ..... 2.
   " en top eller grenet kvast 9.
2. Blomsterstandene skærme ..... 3.
   " skærmagtige klaser 4.
3. Bladene stort set helrandede, m.m. gråfiltede ..... X CINEREA
   " skarpttakkede i øvre halvdel, friskgrønne X ARGUTA
4. Kvistene kantede ..... 5.
   " m.m. trinde 6.
5. Bladene 1,5-3 cm, let rundtakkede i den afrundede forende mørkegrønne ovenpå NIPPONICA
   Bladene 4-6 cm, dobbelt savtakkede, friskgrønne ..... CHAMAEDRYFOLIA
6. Bladene 3-5,5 cm, med 2-4 tænder yderst ..... MEDIA
   " m.m. lappede, med flere tænder 7.
7. Bladet rude-lancetformet, 3-5,5 cm, ca. 2,5 x så langt som bredt CANTONIENSIS
   Bladet 2-3,5 cm, 1-1,5 x så langt som bredt 8.
8. Bladet rundagtigt, but fortil. Bægerbladene oprette. Bladet let 3-5-lappet TRILOBATA
   Bladet æg- til omvendt ægformet, 1,5 x så langt som bredt, m.m. spidst. Bægerbladene udspærrede X VANHOUTTEI
9. Blomsterne i halvskærme, der er højst så lange som brede, ofte både ende- og sidestillede 10.
   Blomsterne i endestillede toppe, der er tydeligt længere end brede 16.
10. Kvistene kantede ..... 11.
    " trinde til stribede 13.
11. Bladundersiden næsten glat ..... X FONTENAYSII
    " håret til filtet 12.
12. Bladene 1-2 cm. Halvskærmene bredere end lange ..... CANESCENS
    " 2-5 cm. " så lange som brede BRACHYBOTRYS
13. Støvdragerne så lange som kronbladene. Liggende til opstigende busk DECUMBENS
    Støvdragerne længere end kronbladene. Oprette buske 14.
14. Kvasten glat til svagt dunet. En enkelt hvidblomstret, endestillet halvskærm BETULIFOLIA
    Kvasten vedvarende håret, oftest rødblomstret 15.
15. Bladene utydeligt fjerstrengede med to lange sideribber ved grunden X BUMALDA
    Bladene tydeligt fjerstrengede med omtrent lige lange sideribber JAPONICA
16. Bladundersiden filtet ..... 17.
    " glat til håret 19.
17. Kviste og bladundersider tæt gulligt filtede. Bladene spidse TOMENTOSA
    Kviste og bladundersider hvidt til lysegråt filtede 18.
18. Bladene butte eller med kort spids, kun savtakkede i den øvre halvdel eller næsten helrandede DOUGLASII
    Bladene spidse, savtakkede fra den nedre 1/3 af X MACROTHYRSA
19. Bladundersiden dunet til håret ..... 20.
    " glat 21.
20. Toppen smalt kegleformet. Blomsterne ofte blegrøde. Bladene ret groft tandede X BILLARDII
    Toppen næsten valseformet. Blomsterne lyserøde. Bladene tæt finttandede X PSEUDOSALICIFOLIA
21. Bladene dobbelt savtakkede. Halvskærmsgrenene glatte ..... 22.
    " enkelt " 23.
22. Topgrenene mest under 60 grader udstående ..... X RUBELLA
    " ofte over " " " LATIFOLIA

23. Toppen bredt kegleformet med lange grene forneden. Bladene ofte bredest over midten. Blomsterne ofte m.m. hvide. Støvdragerne ca. = kronbladene ..... ALBA
    Toppen m.m. valseformet. Bladene oftest bredest under midten. Støvdragerne oftest længere end kronbladene 24.
24. Topgrenene oftest hårede. Bladene oftest lancetformede. Blomsterne oftest klart lyserøde SALICIFOLIA
    Topgrenene oftest fåhårede. Bladene oftest smalt ægformede. Blomsterne oftest svagt blegrøde X ROSALBA