

Cucurbitaceae (Græskarfamilien)

Efter Flora Nordica 6. Cucurbita efter Flora of North America 6.

| | | |
|-----|--|--|
| 1. | Bladene delt næsten til midterribben med lappede flige. Skudspidser uldhårede Bladene højst 1 x delte..... | <i>Citrullus</i> 2 3 |
| 2. | Stænglen blødhåret Stænglen overvejende stivhåret | <i>C. lanatus</i> , Vandmelon <i>C. colocynthis</i> , Kolokvint |
| 3. | Ingen slyngtråde. Bladundersiden grålig af tætstillede, stive hår Normalt med slyngtråde. Bladundersiden anderledes | <i>Ecballium elaterium</i> , Æselagurk 4 |
| 4. | Bladstilken med to små skålformede kirtler i spidsen. Enårig, med mere eller mindre æg-hjerteformede, antydte trelappede blade. Kronen hvid og hjulformet Bladstilken uden kirtler | <i>Lagenaria siceraria</i> , Flaskegræskar 5 |
| 5. | Bladene bredt hjerteformede med jævnt rundede sider, tilspidsede fortil. Flerårig, med 2-3 cm store, klokkeformede gyldengule blomster Bladene mere eller kantede eller lappede, i modsat fald med afrundet spids | <i>Thladiantha dubia</i> , Guldagurk 6 |
| 6. | Slyngtrådene ugrenede Slyngtrådene grenede | 7 10 |
| 7. | Hvidgrønne blomster, slyngtrådene glatte Gule 1-3 cm store blomster. Slyngtråde ru eller hårede ved grunden..... | <i>Bryonia</i> , Galdebær 8 <i>Cucumis</i> 9 |
| 8. | Bladets endelap med (2)3-5 par spidse tænder. Hanblomster med ægformede til trekantede, antydte spidse kronflige. Modne bær sorte Bladets endeflig helrandet eller med 1(2) par butte tænder. Hanblomster med bredt tungeformede og bredt butte kronflige. Modne bær røde | <i>B. alba</i> , Enbo galdebær <i>B. dioica</i> , Tvebo galdebær |
| 9. | Bladene hele eller med butte, afrundede lapper. Frugtknuden uldhåret Bladene spidstakkede eller -lappede. Frugtknuden dækket af tornagtige vorter | <i>C. melo</i> , melon <i>C. sativus</i> , Agurk |
| 10. | Udstrakte til klatrende planter med tyk (1,5-4 cm) stængel. Kronen 7-8 cm, orangegul indvendigt Klatrende planter med tynd stængel, kronen op til 1,1 cm, af lysere farve..... | <i>Cucurbita</i> , Græskar 11 13 |
| 11. | Stænglen tæt besat med stive børster med vortet grund. Bladene ofte over halvt delte. Frugtstilken femkantet og dybt furet Højst med nogle få børster af denne slags. Bladene ikke dybt delte. Frugtstilken trind eller fem-furet | <i>C. pepo</i> , Mandelgræskar 12 |
| 12. | Stænglen tæt lodden af længere hår, desuden med et underlag af meget kortere hår. Bladene med ægformede, bredt trekantede eller bredt ægformede lapper Stængelbehåringen uden et underlag af ganske korte hår. Bladet med afrundede til butte lap- per | <i>C. moschata</i> , Moskusgræskar <i>C. maxima</i> , Mark/Centnergræskar |
| 13. | Stænglen, bladstilken og slyngtrådene med lange klæbrige kirtelhår. Blade femkantede til fem- lappede. Små grønlighvide blomster på 5-8 mm. Frugten 12- 15 mm med 5-6 mm lange børster Planten glat. Bladene stjerneformet femtakkede. Blomsterne gullighvide, 8-11 mm. Frugten ca. 3 x 2 cm med talrige 6-8 mm lange børster | <i>Sicyos angulatus</i> , Håragurk <i>Echinocystis lobata</i> , Pigagurk |