

## Elaeagnaceae (Sølvbladfamilien)

Hovedsageligt efter Fitschens Gehölzflora.

1.	Bladene modsatte Bladene spredte .....	<i>Shepherdia</i> 2 3
2.	Bladene ægformede, grønne ovenpå, spredt sølvskællede nedenunder. Uden torne . <i>S. canadensis</i> , Kanadisk bøffelbær Blade aflange, sølvskællede på begge sider. Med torne .....	<i>S. argentea</i> , Sølvgrå Bøffelbær
3.	Blade ensfarvet sølvskællede på begge side Blade tofarvede med mørkere overside .....	<i>Elaeagnus</i> 4 5
4.	Blade omkring 2x så lange som brede, tornløs Blade 3-8 X så lange som brede, oftest med tornagtige sidegrene ..	<i>E. communata</i> , Alm. Sølvblad <i>E. angustifolius</i> , Smalbladet sølvblad
5.	Blade smalle, omkring 4x så lange som brede Blade brede, omkring 2x så lange som brede .....	<i>Hippothoe rhamnoides</i> , Havtorn <i>Elaeagnus</i> 6
6.	Med torne. Læderagtige, stedsegrønne blade med bølget rand Ingen torne (unge grene kan havde det hos <i>umbellata</i> ) .....	<i>E. pungens</i> , Stikkende sølvblad 7
7.	Blade stedsegrønne og læderagtige Løvfældende .....	8 9
8.	Unge kviste og bladoversiden sølvhvid, oversiden mørkegrøn Unge kviste tæt brunskællede. Bladundersiden med enkelte brune skæl, oversiden med spredte skæl .....	<i>E. macrophylla</i> , Storbladet sølvblad <i>E. × ebbingei</i> , Hæk-sølvblad
9.	Blomsterstilke 4-6 mm. Bær 8-9 mm, rundt, ikke hængende. Bladoverside skinnende mørkegrøn, spredt skællet, håret, undersiden sølvskællet Blomsterstilke 1,5-2,5 cm. Bær 12 mm, aflangt og hængende. Bladoverside grøn, glat eller spredt skællet, undersiden sølvfarvet med spredte brune skæl .....	<i>E. umbellata</i> , Skærmsølvblad <i>E. multiflora</i> , Mangeblomstret sølvblad